

傷寒總病論卷第四

暑病論

暑病表證

素問載五種暑病

時行寒疫論

時行寒疫治法

聖散子方

班豆方論

溫病發班治法小兒證附

暑病論

龐曰冬傷於寒夏至後至三伏中變為暑病其熱重於溫也有如傷寒而三陰三陽傳者有不依次第傳如見五藏熱證者各隨證治之



北京中醫藥大學圖書館藏

傷寒總病論卷第四

暑病論

暑病表證

素問載五種暑病

時行寒疫論

時行寒疫治法

聖散子方

班豆方論

溫病發班治法小兒證附

暑病論

龐曰冬傷於寒夏至後至三伏中變為暑病其熱重於溫也有如傷寒而三陰三陽傳者有不依次第傳如見五藏熱證者各隨證治之



北京中醫藥大學圖書館藏

暑病表證

暑病代桂枝并葛根證

桂枝

芍藥

知母

生薑

各壹兩半

甘草壹兩

黃芩

壹兩半

葛根貳兩

棗

拾陸枚

呔咀水六升煮取三升通口服一盞相次取汗

暑病代麻黃證

桂枝杏仁

知母各壹兩

麻黃

參兩

甘草

黃芩

各壹兩

煎如前法

暑病代青龍湯證

麻黃貳兩

石膏

參兩

知母

桂枝

甘草

各壹兩



杏仁參拾枚 生薑壹兩半 棗拾陸个

如前煎服

暑病代葛根麻黃證

葛根貳兩 麻黃壹兩半 桂枝 甘草

知母

黃芩 芍藥各壹兩 生薑壹兩半 棗拾陸枚

如前煎服

暑病三日外至七日不歇內熱令人更相染大青消

毒湯

大青 芒消各貳兩 山梔子壹兩 石膏肆兩

豉半升 濕地黃半升



呖咀水七升煮取三升去滓下芒消化之温服一
盞以熱除爲度

暑病通用白虎一如傷寒與暍證用之

方在厥陰證中

暑病通用麦奴丸

方在雜汗證中

暑病若吐下後別見形一如傷寒門治之

暑病噦逆發斑瘡豆壞一如温病門治之

已上四條先生所論

預防熱病急黃賊風葛粉散

葛粉

貳升

生乾地黄

壹升

香豉

半升

細末食後服方寸匕牛乳蜜湯竹瀝米飲烏梅湯

任性調下日三服有病者日五服



南京中醫藥大學圖書館藏

素問載五種暑病

肝熱病者先左頰赤肺熱病者先右頰赤心熱病者

顏先赤

也顏額

腎熱病者

也頤頰

脾熱病者臍先赤

艸病雖未發見赤色刺之名曰治未病

肝熱病者先小便黃腹痛多卧身熱熱爭則狂言及


驚脅滿痛手足躁不安卧庚辛甚甲乙大汗氣逆

則庚辛死刺足厥陰少陽其逆則頭痛負負脉引

衝頭也

心熱病者先不樂數日乃熱熱爭則卒心痛煩悶喜

嘔頭痛面赤無汗壬癸甚丙丁大汗氣逆則壬癸



死刺手少陰太陽

脾熱病者先頭重頰痛心煩顏青欲嘔身熱熱爭則腰痛不可俛仰腹滿泄兩頤痛甲乙甚戊己大汗氣逆則甲乙死刺足太陰陽明

肺熱病者洗淅然厥起毫毛惡風寒舌上黃身熱熱爭則喘咳痛起走宵膺背不得太息頭痛不任汗出而惡寒丙丁甚庚辛大汗氣逆則丙丁死刺手太陰陽明出血如豆大立已

腎熱病者先腰痛胕痠苦渴數飲水身熱熱爭則項痛負負澹澹然戊己甚壬癸大汗氣逆則戊己死

刺足少陰太陽諸汗者至其所勝日汗出也

龐曰五種熱病肝腎二藏有逆證心脾肺三藏亡逆證凡五種熱病二三日逢尅未為逆忌在五六日也

時行寒疫論

病源載從立春節後其中無暴大寒又不冰雪而又有壯熱病者此屬春時陽氣發於冬時伏寒變為溫病也從春分以後至秋分節前天有暴寒皆為時行寒疫也三月四月或有暴寒其時陽氣尚弱為寒所折病熱猶輕五月六月陽氣已盛為寒所折病熱則重七月八月陽氣已衰為寒所折病熱亦微其病與



溫病暑病相似但治有殊耳其治法初用摩膏火灸
唯二日法針用崔文行解散汗出愈不解三日復發
汗若大汗而愈不解者勿復發汗也四日服藜蘆丸
微吐愈若病困藜蘆丸不吐者服赤小豆芩蒿散吐
之已解視病尚未了了者復一法針之當解不解者
六日熱已入胃乃與雞子湯下之愈無不如意但當
諦視節度與病耳食不消病亦如時行俱發熱頭痛
食病當速下之時病當待六七日時病始得一日在
皮二日在膚三日在肌四日在肉五日入胃入胃乃
可下也熱在胃外而下之熱乘虛入胃然要當復下之

不得下多致胃爛發斑微者赤斑出五死一生劇者
黑斑出十死一生人有強弱相倍也病者過日不以
時下之熱不得泄亦胃爛斑出矣若得病無熱但狂
言煩躁不安精神言語不與人相主當者治法在可
水五苓散證中

此巢氏載治時行寒疫之法焉溫病暑病
相似但治有殊者據溫病無摩膏火灸又有冬溫瘡豆更有四時藏府陰陽毒又夏至後
有五種熱病時令盛暑用藥稍寒故治有殊也

時行寒疫治法

初得時行赤色頭痛項強兼治賊風走疰寒痺趙泉
黃膏

大黃

附子

細辛

川椒

乾薑

桂枝各壹兩

巴豆伍拾粒

咬咀苦酒漬一宿以臍月猪脊一斤煎調火三下
三下去滓收之傷寒赤色執酒調服梧桐子大一
枚又以火摩身數百遍兼治賊風最良風走肌膚
追風所在摩之神効千金不傳

崔文行解散時氣不和傷寒發熱

桔梗炒

細辛各肆兩

白朮捌兩

烏頭炮壹斤

細末傷寒服一錢五銖匕不覺復小增之以知爲
度若時氣不和旦服一錢五銖匕辟惡欲省病一
服了去此時行寒疫通用之無病者預服以辟寒

爲佳皆酒調下

藜蘆散辟溫疫傷寒

藜蘆

躑躅

乾薑各肆分

牡丹皮

皂角各伍分

細辛

附子各叁分

桂枝

朱砂各壹分

末之絳囊帶一方寸匕男左女右臂上着之覺有

病之時更以粟米大肉臍中酒服一錢匕覆取汗

日再當取一汗耳

赤小豆瓜蒂散在厥陰證中

雞子湯治熱盛狂語欲走

生雞子柒枚

芒消壹兩



所有權版館書

井華水一大升同攪干遍去沫頻服之快利爲度

猪苓散即傷寒門五苓散也在可水證中

已上五方載巢氏治時行

寒疫合用之方

龐曰摩膏火灸可行於西北二方餘處難施莫若初服解散赤散之類如轉發熱而表不解乃行後四方爲佳天行壯熱煩悶無汗者麻黃葛根湯

麻黃

伍兩

葛根

四兩

麤末每服五錢水二盞梔子二箇葱白五寸豉一撮煎八分去滓沫溫溫相次四五服取汗止後服

天行一二日麻黃湯

自汗者去麻黃加葛根二兩

麻黃貳兩

石膏壹兩半

貝齒

伍箇無亦得

升麻

甘草

芍藥各壹兩

杏仁

肆拾箇

麤末每服五錢水二盞煎八分溫服取汗止後服

葛根解肌湯汗後表不解宜服此

自汗者去麻黃

葛根肆兩

麻黃

芍藥

大青

甘草

黃芩

桂枝各貳兩

石膏叁兩

煎如前法

詔書發汗白薇散治時氣二三日不解

白薇貳分

杏仁叁分

貝母叁分

麻黃柒分

細末酒調下方寸匕相次二三服溫覆汗出愈湯調亦得

聖散子方

此方蘇子瞻尚書所傳有序文

昔嘗覽千金方三建散於病無所不治而孫思邈特爲著論以謂此方用藥節度不近人情至於救急其驗特異乃知神物効靈不拘常制至理開感智不能知今予所得聖散子殆此類也歟自古論病唯傷寒至危急表裏虛實日數證候應汗應下之法差之毫釐輒至不救而用聖散子者一切不問陰陽二感或男女相易狀至危篤者連飲數劑則汗出氣通飲食漸進神宇完復更不用諸藥連服取差其餘輕者心額微汗正尔無恙藥性小熱而陽毒發狂之類入口

即覺清涼此殆不可以常理詰也時疫流行平日輒
煮一金不問老少良賤各飲一大盞則時氣不入其
門平居無病能空腹一服則飲食快美百疾不生真
濟世衛家之寶也其方不知所從來而故人巢君穀
世寶之以治此疾百不失二三余既得之謫居黃州
連歲大疫所全活至不可數巢君初甚惜此方指江
水爲盟約不傳人余竊隘之乃以傳蘄水人龐君安
常龐以醫西聞於世又善著書故以授之且使巢君之
名與此方同不朽也其用藥如右

肉豆蔻

拾箇

木猪苓

石菖蒲

茯苓

高良薑

獨活 柴胡 吳茱萸 附子炮 麻黃 厚朴 薑炙

藁本 芍藥 枳殼 麩炒 白朮 澤瀉 藿香

吳朮 蜀人謂蒼朮之白者爲白朮蓋茅朮也而謂今之白朮爲吳朮 防風 細辛

半夏 各半兩 薑汁制 甘草 壹兩

剉焙作煮散每服七銖水一盞半煎至八分去滓
熱服餘滓兩服合爲一服重煎皆空心服

治時氣傷寒頭痛身熱腰背強引頸及中風口噤治
瘧不絕婦人產中風寒經氣腹大華佗赤散方

丹砂 貳分 蜀椒 蜀漆 乾薑 細辛 黃芩

防已 桂枝 茯苓 人參 沙參 桔梗