

目 科

泗水余氏



敘

余於辛未歲患眼疾。百藥罔效。適劉君阜山以葉天士先生眼科良方一書見贈。如法治之。旬日而愈。書中繪圖取相。按症列方。精微簡要。知醫者尋經切脈。不能外此以為功。即不知醫者。執病求方。無難應手而奏效。洵濟世之仙方。活人之妙術也。余自試有驗。嗣後凡遇眼患。施之無不立應。近以求者日多。手抄難徧。爰付剞劂。用廣流傳。庶不負葉君救世之苦心。暨劉君惠余之雅意也。夫豈好行其德云乎哉。

光緒戊寅春月汝亭孫沐賢序

弁言

醫學諸書。非不甚夥。而各執其說。折中無從。驗方非不甚衆。而各鄙者。坐而言不能立。而行猝遭患難。呼籲無從。因而橫夭者。不可
以僂計。致堂朱君。濟世存心。嘗集產科及諸驗方。刊送並由。來經理
潘君枚卿。請准賢居。停捐助。巨貲廣製藥品。以救危急之症。雖值風
雨更深。莫不奔馳往救。自來吾邑。活人無算。今又搜集眼科經驗諸
方示余。謂將付梓。足見樂善不倦。用心良厚矣。余才識謏陋。醫學未
諳。曩時集有四聖心源眼科若干方。不揣冒昧。用附驥尾。以備方家
採擇。未識能補助萬一否耶。

民國八年歲在己未孟秋

余鑑藻謹識


古今侈言方藥者多矣。而確效殊不數覩。釗自幼服典業於鄂之陽新。邑之習俗。輒為細故。輕生若吞鴉片鉛粉火柴等物。躡躑哀吟。聞者酸鼻。釗慘之。乃採備良方。且及瘋犬蛇傷急痧腹痛痢疾三症。乃破跌損等藥。初僅畧事置備。以應不時之需。而求者踵至。幾無以應。顧此失彼。恒怛于心。於是更討古方。兼採新理。配置各品。廣為施贈。嗣某姓因被誣偷竊。一家七口憤而同服生烟。因得報遲緩。僅救四人。又有近鄰。因雀角細故。吞烟致命。蓋咸知典當規例。夜不出入。因是不幸。而於夜半服毒者。太丰不報不治。執事海寧潘先生仲袞。聞而傷之。謂君任勞。我負責。亦猶嫂溺而叔援以手。君子不譏。蓋從權也。典規當遵。顧人命為重。究不忍見死而不救。此詎不能從權。自是無論風雨深霄。寒冬烈暑。釗必躬親馳救。年活數百人。仲堯先生又以釗力薄。請准居停。資助藥料。迨仲堯先生告老旋制。詰嗣叔卿先

生繼理典務亦以為善不倦相勗勉。釗思囿於一隅。不若廣諸四方。謹將歷年應驗諸方。並附天士眼科。釀資彙印一冊。俾好善君子。廣佈流傳。備藥救濟。則所活必有什百千萬於釗者。斯則釗所頂祝者也。

大中華民國八年菊秋上澣皖歙朱致堂謹序

海寧潘祖仁校字






白珠屬肺。黑珠屬肝。瞳人屬腎。大角屬心。上胞屬脾。下胞屬胃。




肉輪屬脾主肉。血輪屬心主血。氣輪屬肺主氣。風輪屬肝主筋。水輪屬腎主骨。



凡眼白珠有紅絲微痛者。用清散藥。宜左荊防湯。


荊芥 八分 防風 八分 蔓荊子 八分
川芎 八分 青葙子 八分 赤芍 八分
車前子 一錢 菊花 一錢 生地 一錢
蟬退 六分 甘草 四分 姜 一片



凡眼小角淡紅。或赤痛者。心之虛火也。用養血散大湯。

生地 一錢 丹皮 八分 歸身 一錢
青葙子 八分 白芍 一錢 防風 六分
荊芥 六分 車前子 八分 川芎 八分
菊花 一錢 茯苓 一錢 草決明 八分
服此紅痛俱愈。但看物不明。

去荊防。加沙苑蒺藜一錢
兔絲子一錢熟地一錢



凡黑眼珠四圍紅者。肝
火也。或痛或微痛。用瀉
肝湯。


柴胡 八分 防風 六分 荊芥 六分

川芎 六分 歸尾 八分 赤芍 八分

菊花 八分 梔仁 酒炒 青皮 八分

車前子 八分 姜 一片

痛甚者。加黃芩 八分 服此痛
不減。口渴。加龍胆草 六分 一
切腥羶宜忌。



凡眼強作痒。及爛者。風
也。內服宜用左方。搜風
散。外點蕤仁膏。

防風 六分 蕤仁 八分 刺蒺藜 一錢

菊花 一錢 蟬退 六分 甘草 四分

穀精草 六分 赤芍 八分 車前子 一錢

姜 一片

外用洗藥


羌活 一錢 防風 一錢 胆礬 四分

桑葉 七片 水煎薰洗。或礬熟

水浸化。常在痒爛處輕擦。亦妙。

蕤仁膏


麤仁水浸一兩研爛。用水二碗。熬至一酒杯。濾去渣。頻熱再下。研細胆礬凍綠各五分。和勻。以鷄毛翎蘸眼皮上。即愈。



凡眼大角紅腫者。心火也。

用前第三頁。佐荆防湯方。加

黃芩酒炒八分木通八分淡竹葉九片



凡眼白珠盡紅。腫痛生。咳流淚羞明者。火盛也。宜涼血散火湯。

生地二錢丹皮八分赤芍八分

黃芩八分防風八分荆芥八分


歸尾八分蟬退八分柴胡八分

車前子錢姜一片

如頭痛惡風或發熱加羌活

眼痛不可忍口渴加川連酒炒八分

腫不消紅不退加紅花四分



凡眼不紅不腫。眼胞下


墮。視物不明者。氣虛也。

宜服加減補中益氣湯。

黃芪一錢炙草五分歸身一錢

川芎八分升麻三分柴胡三分

陳皮 八分 茯苓 一錢 白朮 一錢
枸杞 一錢 不用引



凡眼不紅不腫不痛。眼
胞不下墮。但視物不明
者。肝腎虛也。宜服加味

地黃湯。

熟地 二錢 山萸 一錢 丹皮 八分

茯苓 八分 山藥 一錢 菊花 一錢

歸身 一錢 川芎 八分 兔絲子 一錢

澤瀉 八分 枸杞 亦可加



右藥為丸亦可。

熟地 八兩 山萸 四兩 丹皮 三兩

茯苓 三兩 菊花 二兩 兔絲子 三兩
山藥 四兩 澤瀉 三兩 歸身 四兩

川芎 二兩


以上共為細末。煉蜜為丸。空心
開水送下。每服四錢。此方凡病
後。眼。看物不清楚。及雲翳退後。
眼。不明。夜見燈如綠珠者。可服。



凡眼黑珠有
白點。及成塊。
輕者為雲。原


者為眵。宜服加減撥雲散。
防風 六分 荆芥 六分 蟬退 八分

車前子錢木賊八分柴胡六分
 黃今八分青箱子八分赤芍一錢
 決明八分甘草四分姜一片



凡眼赤絲一條貫瞳人者心火乘腎也用加味導赤散

生地五錢木通八分甘草四分
 當歸尾八分柴胡八分防風八分
 荆芥八分車前子八分黃芩八分
 赤芍八分姜一片痛甚口渴
 生眵加 川連六分酒炒
 連翹一錢




凡大眼角長肉一塊及黑珠名弩肉板精宜服加味導赤散外點硝礬散

生地五錢木通八分甘草四分
 紅花四分防風六分荆芥六分
 歸尾八分蟬退八分赤芍八分
 姜一片痛者加黃芩八分痒者加麤仁八分刺蒺藜八分
 硝礬散
 爐甘石不拘多少煨紅童便淬七次焙乾研細水飛三次晒乾再用羌活防風蔓荊子川芎白

芷川連黃芩菊花熬濃汁。將甘石末拌透晒乾聽用。

每料用製過甘石一錢。火硝三分。冰片一分。搗勻點。



凡眼不紅不腫乾痛者。是氣鬱也。宜服開鬱湯為宜。

柴胡

六分

青皮

八分

香附

八分

車前子

八分

防風

六分

荆芥

六分

決明

八分

青箱子

八分

川芎

八分

梔仁


八分

姜

一片

黑珠夜痛者。加夏枯草一錢。若

有紅絲。加歸尾八分。生地一錢。



凡眼黑珠有雲翳。眼角紅亦有赤絲者。宜服加減撥雲散。

防風

六分

荆芥

六分

蟬退

五分

青箱子

八分

木賊

八分

歸尾

八分

黃芩

八分

車前子

八分

赤芍

八分

菊花

八分

生地

一錢

痛甚流


淚生眵。眼胞腫。

加川連

八分

姜


一片



凡眼黑珠雲翳圍滿。有腫人方可治。內用撥雲散。外點硝礬散。

木賊一兩 蟬退一兩 柴胡六錢
防風六錢 菊花八錢 黃芩六錢
青箱八錢 車前子八錢

右為末。空心開水調服二錢。晚
服一錢。或用猪肝一塊。割開。以
前藥二錢填內。用濕棉紙包好。
置灰火中煨熟食之。亦可煎藥。
用前方加減撥雲散治之。




凡眼白珠有翳。或白或
桃紅。或絳色。或凸起。用
撥雲散加減治之。不紅
腫。無赤絲。只用撥雲散。如紅腫

有赤絲。或加
生地。歸身。歸尾之類。亦
可。亦可加。



凡眼雲翳遮滿黑珠。當
瞳人處稍薄。看物不甚
清楚。尚可治。用撥雲散
加減治之。



凡眼雲翳遮黑珠。當瞳
人處色綠。不見瞳人。其
翳凸起。名綠水泛瞳人。
不治。

治腎虛眼見黑花及金星

熟地

二錢六兩

丹皮

二兩八分

茯苓

二錢一兩

山萸

三錢二兩

歸身

三錢一兩

白芍

二錢一兩

枸杞

二錢

兔絲

酒二錢五分

山藥

三錢一兩

沙苑

蒺藜

酒二錢五分

熟地

三兩

若火太盛

頭常

煉蜜為丸

煉蜜為丸

空心開水服

四錢

若火盛多夢遺者

去兔絲枸杞

加

生地

三兩

澤瀉

三兩

牡蠣

飛細二兩

熟地

痛

五心熱

口渴能飲食者

加黃柏

五錢一兩

知母

五錢一兩

俱鹽酒炒

凡小兒痘後

餘毒攻眼

生雲翳者

宜服加減撥雲散

木賊

六分

蟬退

六分

連翹

六分

車前子

八分

荊芥

五分

生地

一錢

甘草

四分

防風

去芦五分

赤芍

六分

木通

八分

不用引

若紅腫者

加川連

五分

以解其毒

不紅不腫

用兔絲丸



治迎風下淚方

防

風五分荆

芥五分麤

仁

八分蔓荊子

五分歸身

錢

白

芍一錢菊

花八分車前子

八分丹

皮八分決

明

八分

甘

草

四分姜一片

如有赤絲加

黃

芩

酒八分炒刺蒺藜

六分

治腫人散大方

熟

地二錢歸身

一錢白

芍

酒一錢

炒車前子

八分川芎

八分芫絲一錢

菊

花八分青箱子

八分北五味

九粒

不用引

口乾頭昏者加

生地一錢

麥冬一錢

口不乾頭不昏無相火者

加枸杞一錢

或用六味地黃丸加

歸身

白芍

五味

芫絲

可常服

兔屎丸方



望月砂一兩 割稻後田中木賊 七錢 蟬退 七錢 防風 五錢

黃芩 五錢 車前子 七錢

右為末用 荊芥五兩煎湯疊丸空心開水服三四錢亦可
洗眼方

右通政袁密山。景星廣西平樂人。常傳一洗眼方云。宋元豐年間有太守年七十。雙目不明。遇仙人傳此方。洗老年目力如童子。

錄之於左

每歲立冬日。採桑葉一百二十斤。懸風處。令自乾。每月用十片。水一碗。於砂罐內煎至八分。去渣溫洗。每逢洗眼之日。須清淨齋戒忌葷酒。

正月初五日 二月初一日 三月初五日 四月初八日 五月初五日

六月初七日 七月初七日 八月初八日 九月三十日 小則二九日

十月初十日 十一月初十日 十二月初一日 葉天士識



洗藥方

羌活

一錢五分

防風

一錢五分

菊花

二錢

良姜

八分

肉桂

五分

胆礬

二分

甘草

五分

水碗半

煎一碗

每用半酒盃

薰洗

洗眼珠

有雲翳方

凡眼有

此肉亦可洗

若初起

砂仁

桃仁

杏仁

各一錢

焙乾

為末

再加

銅末

胆礬

明礬

各一錢

以上共和為一處。用開水一酒杯。再加雞胆內清水三個。並和在內。調勻。再加入花針七根。貯於水內。以磁瓶或碗。將口封固。埋入土內。三晝夜取出。去渣。每日洗眼珠。半月後。即翳退矣。



眼科方

當歸六分炒山梔六分蟬退四分木通四分羌活二分草決明六分

茯苓六分甘菊六分引加車前子一株連根搗沖藥服

如眼患很加郁李仁數分

洗眼方

干石三錢明礬三錢胆礬三錢菊花二錢川連二錢銅綠二錢

酸梅七個羊胆二個杏仁七個新針七個

用河水生泡半月後可用日久更佳專治暴發火眼日久生翳

治漏神方

用蝌蚪約半飯碗囫圇吞下漏管自出

治漏二分丸

木鱉子一斤水泡淨竹刀刮去毛砂鍋香油炸存性打碎黃土拌去

