

痘疹傳心錄

12-14

痘疹傳心錄卷之十二

懷德堂

西吳朱惠明

著

婦人痘疹

婦人出痘治同小兒其所異者惟經行胎產而已蓋痘疹以氣血爲主若初發熱及痘生長時而經水應期而來應期而止是氣血循其度無足慮也其未及期而來又過期不止此乃熱迫其血血熱妄行過其常度治宜清熱解毒其血自止若初發熱生長之時經水及期而不行此雖不可輕動其血然亦宜防蓄血內攻當解血室之毒若痘正起發成漿經水及期

而來不止恐陰血虧損而陽氣虧弱不能充灌宜補托清熱爲主

蓋娠婦得氣血充足衝任榮和則胎得所如魚處淵若天行出痘恐熱毒侵損胞胎治宜清熱安胎以防墮落漏血也

又新產後而值出痘或痘生長而值產蓐其時瘀血未盡新血未足恐血虛不能任毒治當大補氣血故曰產後大補氣血如有他症以末治之此之謂也

附治驗

一婦人痘出經行余謂如期而來又痘形色來順不

治而愈有一如期不止余謂熱入血海以四物湯合導赤散愈

一婦人痘正出應期而來適斷乍寒乍熱譫妄昏潰余謂邪入血室與血相搏分爭而然也以升發解毒之劑愈

一痘正起發而經行不止余謂去血過多難治果伏陷而卒

一婦痘四朝非經期而月水適來不止余謂痘毒迫血而然以犀角地黃湯加紫草蟬蛻牛旁治之而愈
一婦人出痘非經期而月水適來聲瘖余謂曰心主

舌舌乃心之苗血去則心虛則少陰之脉不能榮於
舌以當歸麥冬生地人參甘草升麻燈心石菖蒲服
之而能言又十全大補湯愈
一婦素有崩漏之症而值出痘余謂氣血不足恐不
能任其毒以八物湯加續斷阿膠又補中益氣湯治
之愈亦有不應藥者伏陷而卒

一孕婦出痘余以安胎飲調理愈亦有痘出而胎痛
甚者以砂仁炒黑爲末每服一錢酒下愈

一娠婦痘正起發或養漿時而墮胎血去過多人事
昏潰伏陷而卒

又一婦症如前余以人參一兩黃芪一兩五錢甘草三錢當歸一兩阿膠五錢艾三錢黑姜三錢附子一錢水煎漸灌而甦

又婦痘正養漿而正產余謂痘順以保元湯加川芎當歸益母草山查荆芥治愈

一娠婦痘漿充足不易結疔面赤晡熱余謂脾虛血少以安胎飲加入參治之愈

一娠婦痘稀朗而色灰白熱盛而墮胎昏憤藥食卽嘔惟沸飲不嘔余謂胃氣虛寒以保元湯加炮姜白朮官桂治之愈

一產婦出痘不易透發熱盛煩躁狂言譫語余謂毒
盛壅遏以芎歸紫草黃連升麻蟬蛻甘草赤芍牛旁
治之愈

一產婦出痘隱隱不易透精神疲倦血去不止余謂
氣血兩虧以川芎當歸益母草炮姜人參升麻地榆
治之血止痘起又補中益氣湯愈

一產婦痘漿不足而色灰白身熱肢冷寒戰咬牙煩
渴溲泄余謂脾胃氣虛以異攻散治之愈亦有不應
藥者倒陷而卒

一產婦出痘雖稀則去血不止倒靨而歿 又產後

去血不止伏陷而卒

一產後出痘形色雖順但痰涎壅盛醫以清解藥而痰愈盛余曰陰血虧損不能制陽火以六味地黃丸料加當歸麥冬治之愈

一婦新婚後出痘雖順而腰痛不已余謂陰血虧涸以八味地黃丸間服補中益氣湯愈

一婦痘愈而夫強以房事疤痕紫黑而歿 又一婦痘後恣慾疤痕枯白漸爲勞瘵而卒

一凡孕婦出疹恐熱毒內蒸而胎受傷當以清熱安胎而兼解散之劑使胎無虞而疹易解也故曰疹與

痘不同痘宜內實若胎落而母亡疹宜內虛胎去而母存雖云胎去而母存孰若子母兩全之爲妙業是者當識此

一孕婦出疹熱甚而觸動其胎胎墮而去血過多疹雖沒而燥熱煩喘昏憤悶絕余謂血脫也當益其氣以理中湯而甦又以人參一兩當歸五錢阿膠炮姜荆芥艾葉又隨症調理愈

一孕婦出疹熱極煩悶醫以清熱安胎之劑而熱甚余謂心鑑曰凡孕婦發疹熱極不退者內實故也必下其胎胎下疹卽隨熱內解母命可存否則熱甚喘

脹子母難全不從余治如果而斃

一孕婦疹出熱盛小腹痛而漏血余謂熱盛觸動其胎以升麻葛根湯加荊芥紫蘇條芩當歸川芎阿膠白朮陳皮砂仁治之血止愈亦有不同前治胎墮而子母俱亡或子亡母存

一產婦疹不易出熱甚而去血不已余謂產後氣血不足不能拘毒盡外解以麻黃葛根湯加當歸阿膠荊芥白芷人參治之血止疹盡透調理而愈

一娠婦疹不易出熱極悶亂喘脹余謂疹勢危劇必不能兩全宜下其胎胎去而母存矣以表散而兼墮

胎藥其胎墮下疹透熱退而愈

一妊婦疹出熱盛墮胎而難產余以魚膠三寸燒灰存性麝香一分共研末好酒調下卽產若難之甚及橫生用魚膠一尺製如前法雖立產其子不能生矣一婦人疹後輕咳夜熱朝涼面白少神肌瘦唇赤咸謂氣血不足用八珍湯不效余審其疹後房勞不慎用六味地黃湯合生脉散又獨處百日愈又一婦疹後房勞不慎漸爲虛怯枯涸而斃

痘疹傳心錄卷之十二終

痘疹傳心錄卷之十三

痘疹傳心錄

西吳朱惠明

著

疹

一名痧子又名癩子又名醋子

夫疹亦胎毒也比痘稍輕然中有臟腑之分發因時

氣之擊

春溫夏熱秋涼冬寒此四時之正氣也冬宜寒而反溫則陽氣發洩太早至春必發疹也

故經曰冬居溫暖春必痘疹

又曰少陽客勝則丹疹外發症分虛實之異治有補

瀉之殊然其症之發也類于傷寒寒熱頭疼目泪汪

汪鼻流清涕嘔吐泄瀉喘嗽噴嚏譫妄渴瀝飲食不

進煩躁悶亂睡臥不寧此因陽火攻擊以致毒乘于

脾熱流于心而干于肺蓋肺主皮毛脾主肌肉疹之

出賴二臟以行其毒惟利於發得透徹則毒盡出皮膚內熱自清則無患矣所以疹之出必咳嚏衄血嘔吐泄瀉也若其初發自頭面先見而至足爲齊頭面淡紅愈多爲佳其形若芥子細密其色若桃花紅活隱見二三番三四日漸沒人事安寧飲食如常二便清調此其順也若亢熱喘急發不能出或一出卽沒或冒風沒早或雖出而紫黑無神或淡白乾枯或身肢雖見而頭面不出及加喘脹胸高肩息狂言譫語或口鼻出血搦手搖頭尋衣摸牀飲食不進噦惡便秘口出屍氣此皆不治若喘嗽煩悶睡臥不安二便

堅閉飲食不進疹雖出而紫滯乃毒火熾盛治宜清
解爲主若疹雖透而色淡白乾咳不續減食便溏精
神疲倦乃中氣不足宜固中氣而兼清肺爲主一有
正氣不足不能逐邪外出致毒伏于內喘脹而死俗
名悶疹也間有風寒外襲閉其腠理或飲食停滯而
氣道窒塞以致疹不易出治宜疎利爲主論曰微汗
而邪無蓄便清而毒無壅且如腸胃結而疎利弗緩
腠理窒而發散毋遲衄血而邪從衄解利下而毒以
利鬆咽喉腫痛降火爲急煩渴不已解毒爲先飲食
減常須救胃語言譫妄必清心時令冷兮投辛熱時

令涼兮用辛溫時令既溫辛涼無阻時方炎熱辛寒
可施故曰必先歲氣毋伐天和○然而爲治之要先
宜解散爲主解散則皮膚通暢腠理開豁則毒盡透
解則無餘邪之爲後灾若不知解散或藥悞溫寒或
坐視犯禁使邪不盡洩留蓄于中變症百出或煩躁
悶亂瀉利失血目赤口瘡不食便秘喉痛聲啞喘嗽
痰涎疔癰瘡腫等症見矣古人曰治別虛實法宜變
通所謂活潑潑地是神術也

一今人以疹爲輕不能調護乃爲風寒外束及爲生
冷內傷鬱遏毒氣而不得外達欲出不出或一出卽

沒反毒內攻噬臍何及醫者亦以爲易治孟浪用藥而不知禁徃徃誤人不爲已咎也可痛可惜

一疹之出有中腑之正疹有風寒發疹有厲毒發疹有內傷發疹不可不辨然中腑之正疹者辛涼而發之風寒發疹者辛溫而汗之厲毒發疹者辛寒而清之內傷發疹者苦平而利之也

一凡疹之出雖先以發散爲貴若表實不易透或風寒壅遏者發解可也若表虛自汗疹毒易出而妄投之豈免虛虛之禍乎臨疹當辨虛實不同一治一凡出疹首尾慎不可用燥悍之藥者蓋疹從肺始

肺屬金而西兌勝燥之方性勇悍而少柔喜清潤而畏燥烈故曰疹要清涼投清涼則升用燥烈則瘥音吉也氣急倘不得已而用麻黃桑皮等性燥之藥必蜜炒也再加性潤之藥佐之以折其悍氣則可矣若悞用之則金愈燥烈譬猶滔天之焰復添以油豈有不斃之理哉

一錢氏論疹要清涼以辛涼之藥發之當矣而味者遂以清涼作寒涼看始出便用芩連梔膏等以涼其邪熱眼見闐闐之中疹兒殞歿相繼者多矣蓋曰疹者亦穢液之氣也伏藏于人身之中初無形臭必待