

瘍醫大全目錄

卷十三

正面耳額門

耳癰門主論

耳發疽門主論

耳後疽門主論


耳疔門主論

耳疳門主論

附方

聾耳門主論

附方



北京中医药大学图书馆版权所有

震耳門主論

纏耳門主論

膿耳門主論

附方

耳風毒門主論

耳聾耳痔門主論

痛耳門主論

耳癢門主論

附方

耳爛門主方

耳衄門主論



南京中醫藥大學圖書館版權所有

黃耳類傷寒門主論

耳聾門主論

附方

耳鳴門主論

附方

耳根毒門主論

首疽門主論

杼疽門主論

月蝕疔瘡門主論

附方

髭鬚門主論

附方

龍泉疽虎鬚毒門主論



羊鬚疔門主論

獨骨瘡門主論

附方

頰癰門主論

頰車癰門主論



南京中医药大学图书馆版权所有

瘍醫大全卷十三

蕪湖顧世澄練江氏纂輯

增錢之栢東陽

男

槐燮用和

全校

正面耳頰部

自耳起至下頰髭鬚止凡一切癰疽疔毒皆彙於此部中以便檢閱參治



中國醫藥大學圖書館版權所有

耳癰



耳癰門主論

王肯堂曰耳癰寒熱間作內外紅腫疼痛日增準繩
馮魯瞻曰火壅上焦或作大痛或膿流於外或膿壅
脹痛有因縱怒縱酒濕熱相乘耳腫作痛者所生
宜平肝除熱疎風 錦囊

澄

曰耳癰之證癰者壅也與膿耳初起有間非醇酒

炙燂卽怒火遏鬱更有色慾過甚真陰耗竭相火

亢盛或肝膽火逆是以耳竅壅腫耳根焮熱脹痛

初起俱宜梔子清肝湯加味逍遙散如內膿已成

用四妙湯去黃耆加白芷丹皮已潰出膿者用
珍湯去川芎加銀花膿盡換用地黃湯加參牛
膝自愈外治內已有膿用紅昇丹少少提之耳門
不可貼膏藥遮攔閉竅耳畔紅腫用黃敷藥敷之
自消

南京中医药大学图书馆藏

耳發疽門主論

王肯堂曰耳發疽生耳輪屬手少陽三焦經風熱所致六七日漸腫如桃或如蜂房之狀或赤或紫熱如火痛徹心是也十日刺出黃白膿者生刺之無膿時出鮮血飲食不下神昏狂躁者死

準繩

申斗垣曰耳發疽乃足少陽膽經其經多氣少血其疽發於鬢下耳傍近臉懸厘主客二穴上下五六日漸長蜂窩皮紫爛熱如火灼痛十日內刺之有膿者生無膿出血精神恍惚二十四朝必死不可

救也 啟玄

心法曰耳發生耳摺間連耳輪通腫甚則膿串耳裏

耳後疽門主論

心法曰耳後疽生耳上稍之後

角孫穴

開口有空陷下

之處者是

耳疔



南京中医药大学图书馆版权所有

耳疔門主論

王肯堂曰耳疔寒熱大作痛楚難禁者是也

集編

竇漢卿曰耳疔以燒酒滴疔根上方得脫隨用苦茶

洗解去酒毒

陳實功曰黑疔生於耳竅之內黑硬腐爛破流血水

疼連腮顴宜針刺之照疔瘡門治法

正宗



中國醫藥大學圖書館版權所有

耳痛



耳疳門主論

王肯堂曰耳疳生瘡臭穢乃足少陰手少陽二經風熱上壅而成 準繩

馮魯瞻曰耳內疳臭謂之洹耳乃腎氣有餘積熱上冲或風水起 錦囊

李東垣曰小兒耳後生瘡名腎疳

耳疳門主方

耳生疳瘡

黃

連

去毛鬚蜜炙數次

兒

茶

各等分

輕

粉

半匙

冰片

麝

香

各少許

共乳細搽

耳後生瘡名腎疳

地骨皮研末粗者煎湯洗耳細者香油調搽

耳疳出膿

核桃仁研爛取油一錢入冰片三分每用少許滴

入

其

既

其

其

其

其

其

其

其

其



南京中医药大学图书馆版权所有

聒耳

