

校正瀕湖脈學

李時珍曰。宋有俗子杜撰脈訣。鄙陋紕繆。醫學習誦以為權輿。逮臻頌白。脉理竟昧。戴同父常刊其誤。先考月池翁著四診發明八卷。皆精詣奧室。達學。未能窺造。參因撮粹。擷華僭撰此書。以便習讀。為脈指南。世之醫病兩家。咸以脈為首務。不知脈乃四診之末。謂之切者爾。上士欲會其全。非備四診不可。○明嘉靖甲子上元日謹書於瀕湖邇所。

浮陽

浮脉舉之有餘。按之不足。

脉經如微風吹鳥背上毛厭厭聳聳。貌沉

輕清在上之象在卦為乾在時為

如水漂木。

崔氏如捻葱葉。

黎氏浮脉法天有輕清在上之象在卦為乾在時為

病在外言尋之如太過乃浮兼洪緊之象非浮脉也

不及則氣來毛微病在中也。○脉訣

太過則中堅旁虛如循雞羽

體狀詩。浮脉惟從肉上行。如循榆莢似毛輕。

三秋得令知無恙。久病逢之却可驚。

相類詩。浮如木在水中浮。浮大中空乃是芤。拍拍而浮似洪脉。來時雖盛去悠悠。○浮脉輕平似捻葱。虛來遲大豁然空。浮而柔細方為濡。散似楊花無定蹤。

浮而有力為洪○浮而遲大為虛○虛甚為散

浮而無力為芤○浮而柔細為濡

校正瀕湖脈學

李時珍曰。宋有俗子杜撰脈訣。鄙陋紕繆。醫學習誦以為權輿。逮臻頌白。脉理竟昧。戴同父常刊其誤。先考月池翁著四診發明八卷。皆精詣奧室。達學。未能窺造。參因撮粹。擷華僭撰此書。以便習讀。為脈指南。世之醫病兩家。咸以脈為首務。不知脈乃四診之末。謂之切者爾。上士欲會其全。非備四診不可。○明嘉靖甲子上元日謹書於瀕湖邇所。

浮陽

浮脉舉之有餘。按之不足。

脉經如微風吹鳥背上毛厭厭聳聳。貌沉

如循榆莢。

素問

如水漂木。

崔氏如捻葱葉。

黎氏浮脉法天有輕清在上之象在卦為乾在時為太過則中堅旁虛如循雞羽。

言尋之外也不及則氣來毛微病在中也。○脉訣

病在外也。如太過乃浮兼洪緊之象非浮脉也。

秋在人為肺又謂之毛太過則中堅旁虛如循雞羽。

言尋之如太過乃浮兼洪緊之象非浮脉也。

脉訣

體狀詩。浮脉惟從肉上行。如循榆莢似毛輕。

三秋得令知無恙。久病逢之却可驚。

相類詩。浮如木在水中浮。浮大中空乃是芤。拍拍而浮似洪脉。來時雖盛去悠悠。○浮脉輕平似捻葱。虛來遲大豁然空。浮而柔細方為濡。散似楊花無定蹤。

浮而有力為洪。○浮而遲大為虛。○虛甚為散。

浮而無力為芤。○浮而柔細為濡。

浮而遲大為虛。○虛甚為散。

主病詩浮脈為陽表病居。遲風數熱緊寒拘。浮而有力多風熱無力而浮是血虛。○寸浮頭痛眩生風。或有風痰聚在胸。關上土衰兼木旺。尺中溲便不流通。

浮脉主表○有力表實○無力表虛○浮遲中風○浮數風熱○浮緊風寒○浮緩風濕○浮虛暑傷○浮芤失血○浮洪虛熱○浮散勞極○

沉陰

沉脉重手按至筋骨乃得。經脉如綿裹砂。內剛外柔。楊如石投水必極其底。

沉脉法地有淵泉在下之象在卦為坎在時為冬在人為腎又謂之石亦有緩數訣言緩度三關狀如爛綿乃弱脉非沉也。況

體狀詩水行潤下脉乃沉筋骨之間更滑匀女子寸兮男子尺四時如此號為平。

相類詩

沉幫筋骨自調匀。伏則推筋著骨尋。沉細如綿真弱脉。絃長實大是牢形。

牢

沉行筋間○伏行骨上
牢大有力○弱細無力

寒。○寸沉瘦鬱水停胸。關主中寒痛不通。尺部濁遺并泄痢。腎虛腰及下元痛。主病詩沉潛水畜陰經病。數熱遲寒滑有痰。無力而沉虛與氣沉而有力積并

沉。○沉數內熱○有力裏實○無力裏虛○沉滑痰實○沉濁氣鬱○沉弱寒熱○沉緊冷痛○沉牢冷積



遲陰

遲脈一息三至去來極慢。

脈

遲為陽不勝陰故脈來不及○脈訣言重手乃得是有沉無浮

遲

一息三至甚為易見而曰隱隱曰狀且難是濇脉矣其謬可知

體狀詩。遲來一息至惟三陽不勝陰氣血寒但把浮沉分表實消陰須益火之

原

相類詩。脈來三至號為遲。小駛于遲作緩持遲細而難知是濇浮而遲大以虛

推

三至為遲○有力為緩○無力為濇○有止為弦○遲甚為敗○浮大而軟

黎氏曰

遲小而實緩大而慢遲為陰盛陽衰緩為衛盛營弱宜別之

主病詩。遲司臟病或多痰沉痼瘕瘕子細看。有力而遲為冷痛。遲而無力定虛寒。○寸遲必是上焦寒關主中寒痛不堪。尺是腎虛腰脚重溲便不禁疝牽丸。

遲

遲脉主臟

陽

寒

○有力冷痛○無力虛寒

數

陽

數脉一息六至。

經脉流薄疾，素問

數為陰不勝陽故脈來太過○浮沉遲數脉之綱領素問脉經皆為正脉訣立七表八裏而遺數脉此謂十心臟其要甚矣

體狀詩。數脉息間常六至陰微陽盛必狂煩浮沉表裏分虛實惟有兒童作吉

看。

相類詩數比平人多一至。緊來如數似彈繩。數而弦急為緊。數見關中動脈。形而有止為促。數甚為極。數而有止為促。流利為滑。

主病詩。數脉為陽熱可知。只將君相火來醫。實宜涼瀉虛溫補。肺病秋深却是之。○寸數咽喉口舌瘡。吐紅欬嗽肺生瘍。當關胃火并肝火。尺屬滋陰降火湯。

滑脈。數脉主腑。○有力實火。○無力虛大。○浮數表熱。沉數裏熱。○氣口數實肺雍。○數虛肺痿。

滑陽中陰

滑脈往來前却流利展轉。替替然如珠之應指。○脉經濶濶如欲脫。

滑為陰氣有餘故脉來流利如水脈者血之府也血盛則脉滑故腎脉宜之。○脉訣云按之即伏三關如珠不進不退是不分之滑也今正之。

體狀相類詩。滑脉如珠替替然。往來流利郤還前。莫將滑數為同類。數脉惟看至數間。○滑則如珠。六至。

主病詩。滑脈為陽元氣衰。痰生百病食生災。上為吐逆下畜血。女脉調時定有胎。○寸滑膈痰生嘔吐。吞酸舌強或咳嗽。當關宿食肝脾熱渴痢癩淋看尺部。

滑胃主瘦飲○浮滑風痰○沉滑食痰○滑數痰火○滑短宿食○脉訣言關此謬如

濇陰

濇脈細而遲。往來難短且散。或一止復來。脉經參伍不調。素問如輕刀刮竹。

如雨

體狀詩。細遲短濇往來難散止依稀應指間。如雨沾沙容易散。病蠶食葉慢而難。

相類詩。參伍不調名曰濇。輕刀刮竹短而難。微微似杪芒微而甚。浮沉不別有無間。

絕細遲短散時一止曰濇○極細而沉重按若曰微○浮而柔細而濡○沉而柔細曰弱

主病詩。濇緣血少或傷精。反胃亡陽汗雨淋寒濕入營為血痺。女人非孕即無經。○寸濇心虛痛對胸。胃虛脹察關中。尺為精血俱傷候。腸結溲淋或下紅。

濇主血少精傷之病。女人有孕為胎病。無孕為敗血。○杜光庭云。濇脉獨見尺中形脉同代為死脉。陰

虛



虛脉遲大而柔按之無力。隱指豁然空。

脈經

崔紫雲形大薄其虛可知

言浮脉

不足

止

言浮脉

見

虛狀

楊仁齊言狀似柳絮散滑而遲滑氏言散大而柔皆散脉非虛也

體狀相類詩舉之遲大之之鬆脉狀無涯類谷空莫把芤虛為一例。

芤來浮大

似慈蕙。

芤脉浮大而遲按之無力○芤脉浮大按之中空

芤為脫血○虛為血虛○浮散二脉見浮脉

主病詩脉虛身熱為傷暑自汗怔忡驚悸多發熱陰虛須早治養營益氣莫蹊蹠○血不營心寸口虛關中腹脹實難舒骨蒸痿痺曰精血却在神門兩部居。

經曰血虛脉虛日氣來虛微為不及病在內日久病脉虛者死

實陽

實脉浮沉皆得脉大微長而弦應指幅幅然。

脈經

幅幅堅實貌○脉訣言如繩應指來乃緊脉非實脉也

體狀詩浮沉皆得大而長應指無虛幅幅強熱蘊三焦成壯火通腸發汗始安康。

相類詩實脉浮沉有力強緊如彈索轉無常須知牢脉幫筋骨實大微弦更帶長。

浮沉沉有力為實○弦急彈指為緊
沉而實大微弦而長為牢

主病詩。實脈為陽火鬱成發狂譫語吐頻。或為陽毒或傷食。大便不通或氣疼。○寸實應知面熱風咽疼舌強氣填胸。當關脾熱中宮滿。尺實腰腸痛不通。

經曰血實脉貴曰脉實者水穀為病曰氣來寔強是謂太過○脉訣言尺實小便不禁與脉經尺實小腹痛小便難之說相反潔古不知其謬誤為虛寒

藥用薑附愈誤矣

長陽

長脉不大不小迢迢自若。

朱如循長竿末梢為平。如引繩如循長竿為病。

問素

體狀相類詩。過於本位脉名長。絃則非然但滿張絃脉與長爭較遠。良工尺度

自能量。

皆兼長脉

寔窄

弦緊

主病詩。長脉迢迢大小匀。反常為病似牽繩。若非陽毒癲癇病。即是陽明熱勢。

深長主有餘之病

短陰

短脉不及本位。應指而迴不能滿部。

脉訣言部經

戴同父云短脉只見尺寸若關中見短上不通寸下不通尺是陰陽絕脉必死矣故關不診短○黎居士云長短未有定體諸脉舉按之附過于本位者

死矣故關不診短○黎居士云長短未有定體諸脉舉按之附過于本位者

為長不及本位者為短○長脉屬肝宜于見

短脉屬肺宜于秋但診肝肺長短自見

體狀相類詩兩頭縮縮名為短濇短遲遲細且難。短濇而浮秋喜見。

有邪干。濇為動脈兼短脉

主病詩短脉惟于尺寸尋短而滑數酒傷神。浮為血濇沉為痞。寸主頭痛尺腹

疼。經曰短則氣病主不及之病

洪

陽

洪脉指下極大。經來盛去衰。

素來大去長。

通真子問

洪脉在卦為離在時為夏在人為心素問謂之大亦曰鈎滑氏曰來盛去衰如鈎之曲上而復下應血脉來去之象象萬物敷布下垂之狀○詹炎舉言

李發環珠者非脉訣云季夏宜之秋季冬通腸俱非洪脉所宜蓋謬矣

體狀詩脉來洪盛去還衰滿指滔滔應夏時。若在春秋冬月分升陽散火莫狐疑

相類詩洪脉來時拍拍然去衰來盛似波瀾。欲知實脉參差處。舉按絃長幅幅

堅。洪而實而無力為實

主病詩脉洪陽盛血應虛。相火炎炎熱病居。脹滿胃反須早治。陰虛洩漏可愁。如寸洪心火上焦炎肺脉洪時金不堪。肝火胃虛關內察。腎虛陰火尺中看。

洪經曰形瘦脉大。多氣者死。曰脉大則病進。

微陰

微脉極細而柔。按之如欲絕。若有若無。經細而稍長。

戴氏曰素問謂之少氣微則脉微

體狀相類詩。微脉輕微。晉晉乎。按之若絕有如無。微為陽弱。細陰弱。細比於微。

略較粗

輕診即見重按如欲絕者微也。往上來如綿而常有者細也。○仲景曰脉晉如根之肥者陽氣微。紫榮如蠶絲細者陰氣衰。常病得之死卒病得之生。

主病詩。氣血微兮脉亦微。惡寒發熱汗淋漓。男為勞極諸虛僂。女作崩中帶下。

醫。○寸為氣促或心驚。關脉微時脹滿形。尺部見之精血弱。惡寒消痺痛呻吟。

緊陽

微主久虛血弱之病。陽微惡寒陰微發熱脉訣云歲中日久為白帶漏下多時骨亦枯。

緊脉來往有力。左右彈人手。問如轉索無常。

仲景數如切繩。

脈如紐簾線。

丹溪

如急數。

謂之急。

脉訣每言寥

寥乃熱為寒來之脉。故急數如此。要有神氣歇。聞謂之急。○脉訣每言寥入尺來。崔氏言如線皆非緊狀。或以浮緊為弦。沉緊為牢。亦近似耳。

體狀詩。舉如轉索切如繩。脉象因之得緊名。總是寒邪來作寇。內為腹痛外身疼。相類詩見弦實。

主病詩。緊為諸病主於寒。喘放風癇吐冷痰。浮緊表寒須發越。緊沉溫散自然安。○寸緊人迎氣口分。當關心腹痛沉沉。尺中有緊為陰冷。定是奔豚與疝。諸緊為寒為痛人迎緊盛傷寒于氣口緊盛傷于食尺緊痛居其腹況乃疾在其腹○中惡浮緊放漱沉緊皆主死

緩陰

緩脉去來少駛于遲。一息四至。戴氏民如絲在經不卷其軸應指和緩往來甚匀。

如初春楊柳舞風之象操琴上朴而中正時而曲平正為脾陽才全尺上下同等得大而軟無有

如初春楊柳舞風之象

如微風輕拂柳枝

上同等浮大而軟無有

中相類詩見遲體狀詩緩脉阿阿四至通柳梢裊裊颸輕風欲從脉裏求神氣只在從容和緩偏勝者平脉也若非其時即為有病緩而相匀不浮不沉不疾不徐不微不弱者即為胃氣故杜光庭云欲知死期何以取細數詳古賢經推定五般土陽土須知不過陰陰土遇陰當

類詩見遲

三

主病詩。緩脉營衰衛有餘。或風或濕或脾虛。上為項強。下痺痿。分別浮沉大小區。○寸緩風邪項背拘。關為風眩胃家虛。神門濡泄或風秘。或是蹣跚足力迂。

九陽中陰

脈浮大而硬。按之中央空。兩邊實。經中空外實。狀如慈蕙。

經脉

中

空外實狀如慈蕙

紅體狀詩。芤形浮大軟如葱。按之勞有中央空。火犯陽經。血上溢熱侵陰絡。下流中戴同父云營行脉中脉以血為形。芤脉中空脫血之象也。○脉訣言。兩頭有中間無是脉。可成虧有邊無斷截矣。又言主淋瀝氣入小腸與失血之候相反誤世不小小

相類詩中空旁實乃為芤浮大而遲虛脉呼芤更帶絃名曰革血亡芤革血虛

中主病詩寸乳積血在于胸關內逢空腸胃癰。尺部見之多下血赤淋紅痢漏崩。

絃陽中陰

絃脉端直以長。問如張弓絃。按之不移綽綽如按琴瑟絃。狀如箏弦。誤從

急絃如新在卦為震其病輕死池氏曰絃緊而硬其病重而素勁為肝輕虛以時過絃緊而細為不及戴長竿者病勁同父

體狀詩絃脉迢迢端直長肝經木旺土應傷怒氣滿胸常欲叫醫家童子淚淋

相類詩絃來端直似絲絃緊則如繩左右彈緊言其力弦言象牢脉絃長沈伏
間又見長脉

主病詩絃應東方肝胆經飲痰寒熱瘧癥察左關右胃寒心腹痛尺中陰疝脚拘攣
輕○寸絃頭痛膈多痰寒熱癥瘕察左關右胃寒心腹痛尺中陰疝脚拘攣
絃為木盛之病浮絃支飲外溢○沉絃懸飲內痛○瘧脉自絃○絃數多熱
絃進多寒○絃大主虛○絆細拘急○陽絃頭痛○陰絃腹痛○絃數少寒
食者木來克土難治

革

陰

革脉絃而芤景仲如按鼓皮

溪丹

漏仲景曰絃則為寒芤則為虛虛寒相搏此曰即革男子亡血失精女人半產
下脉經曰三部脉革長病得之死卒病得之生時珍曰此即芤絃二脉相
合故均之失血之候諸家脉書皆以為牢脉故或有牢無革有革無牢混淆清
辨不辨不知革浮牢沉沉虛牢實形訛皆異也○又按甲乙經白渾渾革革至
如涌泉病進而危弊弊其去如絃絕者死謂脉來混
革變急如涌泉出而不反也王貺以為溢脉與此不同

體狀主病詩革脉形如按鼓皮芤絃相合脉寒虛女人半產并崩漏男子營虛
或夢遺相類詩

見芤

牢脉似沉似伏實大而長微絃經

牢陰中陽

扁鵲曰牢而長者肝也仲景曰寒則牢堅有牢固之象沈氏曰似沉似伏牢位也定火絃長牢之體也○脉訣不言形狀但云尋之則無按之則有云為死脉入皮膚辨息難又以牢脉皆益浪謬誤也

體狀相類詩。絃長實大脉牢堅。牢位常居沉伏間。革脉芤絃自浮起。革虛牢實要詳看。

主病詩。寒則牢堅裏有餘。腹心寒痛水乘脾。疝癩瘕瘕何愁也。失血陰虛卻忌之。

牢
牢主寒實之病木實則為痛扁鵲云牢為虛牢為實失血者脉宜沉細或浮而牢者死虛病見實脉也○脉訣言骨間疼痛氣居于表池氏以為腎傳大牢于脾皆謬妄不經

濡陰即弱字

濡脉極柔而浮。如棉在水中。輕手相得。按之無有。脉如水上浮沤。

經

帛浮水中重手按之隨手而沒之象○脉訣言之似有舉還無是微脉非濡也。

體狀詩。濡形浮細按須輕。水面浮綿力不禁。病後產中猶有藥。平人若見是無根。

相類詩。浮而柔細知為濡。沉細而柔作弱持微。則浮微如欲絕。細來沉細近于微。

浮細如棉曰濡○沉細如綿曰弱○浮而極細如絕曰微○沉而極細不斷曰細

主病詩。濡為亡血陰虛病。髓海丹田暗已虧。汗雨夜來蒸入骨。血山崩倒濕侵脾。○寸濡陽微自汗多。關中其奈氣虛何。尺傷精血虛寒甚。溫補真陰可起疴。

弱

弱脉極耎而沉。細按之乃得。舉手無有。

經脈

弱乃濡之沉者。脉訣言輕手乃得。黎氏譬之浮濡皆是濡脉非弱也。○素問曰。弱已滑是有胃氣脉弱以濡是謂久病。病後老弱見之順平人少年見逆之。

體狀詩。弱來無力按之柔。柔細而沉不見浮。

主病詩。弱脉陰虛陽氣衰。惡寒發熱骨筋萎多驚多汗精神減。益氣調陰急早醫。○寸弱陽虛命可知。關為胃弱與脾衰。欲求陽陷陰虛病。須把神門兩部推。

仲景曰。陽陷入陰故惡寒發熱又云弱主筋督主骨陽。柳氏曰。氣虛則脉弱。寸弱陽虛尺弱陰虛關弱胃虛。

散陰

散脉大而散。有表無裏。脉經漫不收。崔氏無統紀。無拘束。至數不齊。或來多去少。或去多來少。渙散不收。如楊花散漫之象。柳氏



醫

體狀詩

散似楊花散漫飛

去來無定至難齊

產為生兆胎為墮

久病逢之不必

戴同父曰心脉浮大而散肺脉短濶而散平脉也心脉與散怔忡肺脉與散臂肺與散諸病脉代散死脈也汗出肝脉與散溢飲脾脉與散脂腫病脉也腎肺與散諸病脉代散死脈也虛根本脫離之脉產婦得之生孕婦得之墮難經曰散見則危柳氏曰散為氣血俱

相類詩散脉無拘散漫然濡來浮細水中綿浮而遲大為虛脉芤脉中空有兩邊主病詩左寸怔忡右寸汗溢飲左關應與散右關與散附腫附散居兩尺魂應斷

細陰

細脉小於微而常有細直而更若絲綿之應指

經脉

脉素問謂之小王故玄然如秀蓬然其柔何也言往來極微是微反大于細矣與經相背

體狀詩細來纍纍細如絲應指沉沉無絕期春夏少年俱不利秋冬老弱郤相

宜相類詩

濡見微

主病詩細脉營營血氣衰諸虛勞損七情乖若非濕侵傷腰腎即是傷精汙洩來○寸細應知嘔吐頻入關腹脹胃虛形尺逢定是丹田冷洩痢遺精號脫陰

校正涉湖脉學

卷一

脉經曰細為血少氣衰有此證則順否則逆
故吐衄得沉細者生憂勞過度者脈亦細逆

伏陰

伏脈重按着骨指下裁動脈行筋下。

誤刊

脉訣言尋之似有定息全無殊為舛謬

體狀詩。伏脈推筋着骨尋指間裁動隱然深傷寒欲汗陽將解厥逆臍疼證屬陰相類詩

見沉脈

主病詩。伏為霍亂吐頻頻腹痛多緣宿食停畜飲老瘦成積聚散寒溫裏莫因循○食鬱胸中雙寸伏欲吐不吐常兀兀當關腹痛困沉沉關後疝疼還破腹

傷寒一一手脈伏極似單伏兩手脈伏日雙伏不可陽證見陰為證乃火邪內外復感寒先有伏陰在內外復出也若太溪衝陽皆無脉者必死也

死後庶物皆蘇之義又有夾陰傷寒先有伏陰在內外復出也若太溪衝陽皆無脉者必死也

死後庶物皆蘇之義又有夾陰傷寒先有伏陰在內外復出也若太溪衝陽皆無脉者必死也

死後庶物皆蘇之義又有夾陰傷寒先有伏陰在內外復出也若太溪衝陽皆無脉者必死也

死後庶物皆蘇之義又有夾陰傷寒先有伏陰在內外復出也若太溪衝陽皆無脉者必死也

死後庶物皆蘇之義又有夾陰傷寒先有伏陰在內外復出也若太溪衝陽皆無脉者必死也

死後庶物皆蘇之義又有夾陰傷寒先有伏陰在內外復出也若太溪衝陽皆無脉者必死也

死後庶物皆蘇之義又有夾陰傷寒先有伏陰在內外復出也若太溪衝陽皆無脉者必死也

死後庶物皆蘇之義又有夾陰傷寒先有伏陰在內外復出也若太溪衝陽皆無脉者必死也

死後庶物皆蘇之義又有夾陰傷寒先有伏陰在內外復出也若太溪衝陽皆無脉者必死也

動陽

動乃數脉見于關上下無頭尾如豆大厥厥動搖

仲景曰陰陽相轉名曰動陽動則汗出陰動三分为陽後三分為陰關位半陰半陽故陽虛則陽動隨虛見○脉訣言尋之似有定息全無殊為動脉詹氏言其形鼓舉