

增輯

醫學實在易

廣益書局
石印

卷六

龍骨白濁湯

治遺精滑失

白龍骨

蓋于砂一

古為末空心飲酒調服三錢

小兒石蓮丸

治女婦夜夢遺精白濁崩中帶下諸症

免餘子

石蓮肉

白茯苓

古

為細末山藥糊為丸桐子大每服五十大加至一百大或酒或茶清空心送下如脚無力水煎湯晚食前服

龍骨火管丸

治精氣虛滑遺不舉

龍骨

蓮肉

艾香

烏梅肉

各等分酒末同山藥丸如小兒大每服

三十丸空心水飲下

龍骨白濁湯

治白濁

新羅藥根一把白酒浸軟服

滑石

寒水石

葵子

以水一斗煮五升

肥轉方

治丈夫女人肥轉不得小便八九日者

滑石

葵子

以水一斗煮五升

牛膝膏

治死血作淋

桃仁

牛膝

白芍

生地

水十鐘微火煎至二瓶入

四君子湯

六味丸 封髓丹 杜附八味丸

四君子湯

六味丸 封髓丹 杜附八味丸

二陳湯

加生薑四錢為主更時法為神奇其效無比

連草摘及湯針

治傷寒胃氣嘔逆

連草

橘皮

梗木

生薑

水煎熱服

去連草

橘皮加竹茹生薑汁千金石

治傷寒後嘔噦反胃乾嘔

丹溪云凡嘔家禁服瓜薑寒桃仁

萊菔子

山梔一切

有酒之物皆犯胃作嘔要云云嘔家本忌食水以其味不純而動嘔也

瓜腹

五金丸

起動肝火逆於中焦其症口苦腹脹脇及小腹脹滿或嘔

症則身熱氣逆是也

五金丸

起動肝火逆於中焦其症口苦腹脹脇及小腹脹滿或嘔

症則身熱氣逆是也

黃連

吳茱萸

一兩

粥為丸

日大每服三十丸白湯下

連理湯

小兒

平胃散

人參

白虎湯

調胃承氣湯

腎氣丸

八桂附

三消

上海文華書局印行

上海文華書局印行

上海文華書局印行

上海文華書局印行

不味地黃湯銀用一斤加五味子肉桂各一兩水煎冷服

腎症諸方

參氣湯 大柴胡湯 防風通聖散 逐塊湯

四順消涼散 通大便而不傷元氣 當歸 大黃 黃芩 甘草 水煎服

積聚痞氣奔豚方

如味平胃散 治積氣痞塊腹等症 蒼朮 陳皮 厚朴 甘草 枳實 川芎 芍藥 沉香 木香

物為度 加減詳本論 大黃 共為末每服三錢薑湯下忌油膩動氣之物及房事一 腹脹者吞服如食晚飯

金匱奔豚湯 治奔豚往來腹氣上衝胸腹滿 炙草 川芎 當歸 芍藥 白芍 半夏 生薑

生葛 李根白皮 水三升煎八分服 上升下降無論邪正之氣未有不由于陽以少陽為陰陽之

路也陰陽相搏則腹痛方中有芍藥以和陰生薑以通陽又有半夏黃芩甘草並脾分理陰陽之

金氣并則熱方中有李根白皮以降之氣降則寒方中有生葛以升之升降得宜而寒熱可愈

少陽過為相傷寒論大小柴胡等湯皆用此味可知平受為化中按定六經之法不逾一泰也

理中湯

癰疽癰

癰疽癰及耳鳴耳聾如神 又治口內瘡及神水散大等症為開胃第一品方 磁石 礞石 珠砂

神效紅梅散 煉蜜丸每服三錢以開水送下 接磁石宜生用珠砂若煅炒則散人 礞石宜色入腎則色赤

入心水龍鑒火龍燭水大相濟則光華四射矣然口受五臟之精精傳於後神越能清正後則精易致安故為明目之

方其治耳鳴耳聾者亦以鎮墮之功功能制虛陽之上奔耳相聞伯謂治癰癰之聖劑也取二石安磁水大神捷推陳

新從中意以轉運其氣於上下也

金匱風引湯

行動得肝散

治左癱右瘓筋脉拘攣身體不遂脚腿少力乾濕脚氣及濕帶經絡久不能去宜厚諸氣

木瓜 五兩

萸解

五靈脂 牛膝酒浸

續斷 白殭蠶

松節 芍藥

烏藥 天麻

威靈仙 黃芩

當歸 防風

虎骨

右用無灰酒一斗浸上藥二七日

緊封瓶口足取藥指乾搗為細末每服二錢用浸藥酒調下酒盡

用酒調下

喻嘉言曰此治風濕搏結於筋脉之間凝滯不散阻遏正氣不得通行之方

傷食

平胃散 治脾胃不調心腹痞滿吞酸噯腐瀉痢瘧瘧不服水土等症

蒼朮 厚朴

陳皮 枳實

炙甘草 一兩

加生薑五片水煎服

瓜蒂散 治食在上脘用此吐之所謂在上者因而逆之也

瓜蒂

赤豆 擘開

右為細末以豉七合煮汁和散

一之服 一法溫漿水調服一錢七服吐為度

三一冰氣湯

傷酒

葛花解醒湯 治酒病嘔逆心煩胸滿不食小便不利

青皮 三分

木香 五分

橘紅 人參

猪苓 茯苓 各一兩

神麴 澤瀉

乳蘆 白朮 二錢

白蔻仁 砂仁

葛花 三錢

右為細末每服三錢白湯調服但得微汗則

酒病去矣 羅謙甫云夫酒者大熱有毒氣味俱陽乃無形之物也若傷之正當於散使汗出則愈最妙法也其法莫

如利小便二者乃上下分消其濕何酒病之有今之治此者乃用酒藏大熱之劑下之又用牽牛大瀉下之是無形

元氣病及傷有形陰血亦誤甚矣

五苓散

久服地黃暴脫

通脈四逆湯

求附湯

室女閉經

貼脾湯

富路龍膏

上海大學書局印行

崇病

却邪湯

痼症

虛症諸方

傷寒

理中湯 附子湯

虛勞

理中湯 甘草乾薑湯

甘木湯

黃耆建中湯

入胎糖四錢詳服

二如龍骨湯

炙甘草

復脈湯

凡厥見結悸者

曰此仲景治陽寒脈結代心動悸

為千金方也

其法以人快然真聖法也

後復原津液復生乃致榮衛盛而諸虛復宜小補哉

虧胃一月得大富從時醫養胃除諸法葉天士云太陰濕土得陽始運陽明陽土得陰自安以脾胃剛燥胃喜柔潤也

生白芍

大棗

炙甘草

生薑

小桂枝

炙者

水煎去滓

桂附八味丸

小建中湯

桂枝

生白芍

生薑

生龍骨

生牡蠣

炙甘草

大棗

水煎服

治諸虛不足汗出而悶脈結悸行動如常不出百日危急者十一日死

凡厥見結悸者雖行動如常不出百日必死若復危急不能行動則過十日必死語極明白從前解者多誤

俞嘉言

葉氏養胃方 治胃虛少納 穀土不生 金音低氣饒 麥冬 生扁豆 玉竹 甘草 桑葉 沙參 此方生穀芽

生扁豆 玉竹 甘草 桑葉 沙參 北方生薑

葉氏方 治陰虛盜汗不用當歸大黃湯以其味苦不宜於胃也此方用酸甘化陰法合前加減大建中湯意甘人

此方用酸甘化陰法合前加減大建中湯意甘人

又方 經云形不足者溫之以氣精不足者補之以味納穀如常而脈肉日削當以血肉充養 牛骨髓 羊骨髓

牛骨髓 羊骨髓

又方 治南消脂酒吸氣喘促欲咳不能出聲必鋸腰季脇方積有痰凝咽喉中乾消直至胸膈此五液俱竭法在不治

搜引人身骨髓為煙燼之計
鮮河草按此味不可用
人乳汁
真秋石
血餘炭
陰虛陽浮宜用介以潛陽之法

六味丸或丹澤加秋石龜膠仁瑤湖蓮之屬如有用海參膠淡菜膠及燕窩之類皆是此意

非無清草木所能補如肉劑之証必須諸髓及羊肉膠之類陰中之陰虛極必須龜膠人乳粉牡蠣秋石塵耳之類陰

中之陽虛極必須鹿角膠鹿茸黃犬外腎之類一隅三反

黑地黃丸 治陽虛陰衰脾胃不足虛室虛損形瘦無力面多青黃而無赤色此補腎益胃之劑也 卷下

五味子半斤 蛇薑錢冬一兩夏五錢 右為末粟四煉丸梧子大用米湯送下百丸 治血虛久痔甚妙

正仲業
同序
台使

都氣丸

歸脾湯 治心脾氣虛怔忡健忘汗多食少大便泄瀉或利不寐吐血下血婦人經水不調等症 人參 白朮 炙

黃耆
 漢中
 高陽
 酸棗仁
 炒
 龍眼肉
 絡二
 炙草
 木香
 遠志
 各五分
 水煎服

小兒疳積
茯苓桂枝甘草大棗湯
桂枝加桂湯
真武湯
奔豚湯

瘰癧

虎潛丸 治痿神方及結症不足腰腿疼痛行步無力等症 黃柏 知母 熟地 龜板 白芍 當歸

牛膝 虎脛骨 項陽 陳皮 乾薑 研末酒煮燂羊肉一斤切片微火焙研末和上諸的

煉蜜為丸梧子大每服五十九薑湯煮酒隨意送下

金精

封製丹 黃柏 炙甘草 砂仁 研碎煉蜜大如梧子大每服三錢淡鹽湯送下一本內從者五

錢去甲酒浸一宿次日以水煎三四沸送下 此方用黃柏為君以其味性苦寒苦能堅腎腎堅則陰水不虛其

之滋寒能清肅秋令一至則龍火不至於當湯水大交媾精有不妄其位者乎佐以甘草以七草能煖急濕活火與肝

火之內項且能使水土合為一家以妙封藏之固尤妙以砂仁為引導內經云腎苦燥急食辛以潤之今用砂仁之辛

通三焦達津液能納五臟六腑之精而歸於腎腎家之氣納腎中之氣自藏矣

溫脾湯 黃連 生地 甘草 當歸 人參 茯苓 桑仁 連志 蓮子 水煎服

水煎服 黃連 生地 甘草 當歸 人參 茯苓 桑仁 連志 蓮子 水煎服

黃連清心飲 黃連 生地 甘草 當歸 人參 茯苓 桑仁 連志 蓮子 水煎服

養神湯 黃連 生地 甘草 當歸 人參 茯苓 桑仁 連志 蓮子 水煎服

文蛤津液膏 黃連 生地 甘草 當歸 人參 茯苓 桑仁 連志 蓮子 水煎服

思仙丹 黃連 生地 甘草 當歸 人參 茯苓 桑仁 連志 蓮子 水煎服

去毛子水淘淨入大鍋內水煎濾過再煎如胎糖和勻煎藥大如桐子大每服七八十丸

桂枝龍骨牡蠣湯 治男子失精女人夢交 按多夢者神氣外浮龍為天地之神故龍骨最能補神而

治夢夢合之牡蠣之鹹寒便能引火歸原以此湯主之如陽虛而洩者加蓮子心一錢生薑仁二錢能補腎攝精故為

神妙

溫膽湯 即二陳湯加竹茹三錢枳實八分

二加龍骨湯

四君子湯

遺精

補中益氣湯

勞傷傷寒

通脈四逆湯

黃連阿膠雞子黃湯

竹皮湯

鮮刺竹皮

右一味以水二盞煎一盞服

素藏諸方

九製蒼朮散

治肥人多濕痰盛久服成地仙

茅山蒼朮

古為末每服二

三錢東湯下一日兩服

防風通聖散

二陳湯

乾坤得一丸

素藏諸方

人參養榮湯

治氣血兩虛生出諸病不可名狀不論其脈但服此湯諸症俱愈

生白芍

人參

白朮

炙黃耆

茯苓

炙草

肉桂

陳皮

遠志

五味子

熟地

加生薑三

片棗三枚水煎服

歸脾湯

蓮少丹

治虛弱百病為時常調養之良劑也

熟地

山茱肉

山藥

茯苓

枸杞

肉蓯蓉

杜仲

蓮志

牛膝

枳實

巴戟天

小茴香

五味子

石菖蒲

大棗

先以薑煮大棗

去皮核搗碎

蜜丸梧子大每服三錢淡鹽湯送下日二服

六味丸

十味補心湯

茯神

人參

遠志

石菖蒲

龍眼肉

茯苓

人參

參冬

熟地

遠志

石菖蒲

龍眼肉

茯苓

人參

熟地

遠志

石菖蒲

龍眼肉

茯苓

人參

錢氏湯下日二服輕曰主明則下安以此爲神則毒所謂主者心也主爲一身之主耳目口鼻四肢通體無一不恃其使令心如海內之大君四職如四方之侯伯氣順則天下皆安其大彰明較著者也諸家所傳之方或偏重四職之一不專顧心久服增氣而致病若能一於補心則有利而無弊補方書准天王補心丹以補心名而用則必謀不此方補一臟而五臟受其方中專補心者收神一味餘則同四臟以補如四方諸侯皆出所屬以天子以補心爲補藥之三果病在他臟則他臟之補藥已具方中便可藉心臟之精氣相助不患其偏絕使心君安穩有援四方上下安和太子之象可坐致也尤妙在香通十二經八脈氣分爲之轉輸不使滯於一處而偏勝且能益六腑也

聖藥寶鑑卷八

補遺並外備諸方

桂枝芍藥如母湯

治諸肢節疼痛身體羸弱脚腫如脫頭眩氣短嘔吐

附子 芍藥

甘草

麻黃

桂枝 白朮

如母 防風

生薑

古丸味以水二杯半煎八分服日夜三服

用桂枝湯去棗加麻

黃以助其通陽加白朮防風以伸其脾氣加附子如母以調其陰陽多用生薑以平其逆逆

黃解毒湯

治中風脾緩舌強不搭半身不遂與地黃飲子同意但彼重在腎此重在脾

羌活

防風

子 羚羊角

天麻

酸棗仁

肉桂

炙甘草

水二杯煎八分入竹瀝五錢生薑汁二錢

附

喻嘉言治疔氣不榮於古本加枸杞首烏天冬前花石蒲元參

清暑益氣湯

治暑熱口渴舌乾身熱如瘧疾

黃耆

蒼朮

升麻

人參

澤瀉

橘皮

神麝

白朮

麥冬

當歸

甘草

黃柏

五味子

青

皮

水二杯煎八分食後服

進食白水湯

治風虛或重或輕苦極不知食味收斂補中益精氣

白朮

附子

甘草

加生薑二

片紅棗二枚水煎

喻嘉言曰此方治腎氣虛之人外風入腎治似烏洞中陰風搖搖者夜不覺風換腎中濁陰之

欲飲逆上攻其頭面重眩之治至極難治原以胃氣亦虛不知食味故方中全不用風藥但用附子暖其水藏白朮

甘草暖其土藏水之一道則濁陰之氣盡趨於下而頭苦重眩及不知食味之証除矣其方在精氣者以脾知食味自

加味黃連湯 治婦人難產交骨不開

川芎三錢

當歸身二錢

龜板紅燉

婦人生過男女頭門髮如華

水三杯煎八分服如人行五里路即生

此方委庭板頭髮名佛手散要生胎去死胎

香薷丸 治水腫

麝香一分

白朮二兩

先將白朮為末後麝香為汁為膏和丸如梧子大每服十九日夜

四五服利小便

又外臺香薷丸以香薷五十斤水煎膏令可丸如梧子大每服五十丸日三加之以小便利為度

無所忌

金匱防已茯苓湯

治皮水此症因肺閉則水不下而泛溢皮膚故魚風水相似但不惡寒為度

防已

黃耆桂

枝三

茯苓六兩

甘草二兩

水六升煮取三升分溫服

桂枝湯大腹水腫土氣小便赤澀煩脈動不卧方

苦草煎

杏仁二兩

大棗四十枚

分搗合治為丸

如粟核大空心服八丸日夜食消再服五丸未飲下三日遂平且服五丸晚服三丸時法治氣喘咳嗽不已可代十

泉湯

金匱雲吐血不止將本人血破竭結為末每一錢二分以麥冬湯調下即止

金匱其云凡吐粉紅色痰涎是肺絡損傷而血溢也治以鮮藕白藕末紅棗三物煎湯頻服之久自愈此方係正白旗

通經新法投用之最良

腸痔下血方

木耳紅

空心生食禁茶湯半日三服必愈但不除除根耳

磁石丸 治腎虛滑精者小便濁

磁石

肉蓯蓉

澤瀉

清石

右為末蜜丸梧子大每服三十丸溫

酒下不拘時服如淋下妨悶如沈者一錢以行滯氣

鹿茸丸 治下元虛德小便頻數日夜不止

鹿茸

生地黄

當歸

補黃

右為末

右為末

右為細末每服三錢已空心溫酒調服日一

方燥藥為丸如梧子大每服二十丸食前炒鹽湯下

柴胡梅連散 治青熱苦熱久而不愈三服除根

柴胡

人參

黃芩

甘草

黃連

未每服三錢重使一盞烏梅一個搗碎五匙諸升能一條並根半錢水一鍾同煎至七分去滓溫服無時原方有前調無人參者於甘草蜜湯為丸余蓋從柴胡飲子增入以備清溫為熱之用去前所書不錄也

涼膈散 治上焦積熱煩躁面赤頭昏咽喉痛口瘡煩腫便閉赤黃舌腫下不安

梔子 甘草 芒硝 大黃 右末每服二三錢如竹葉七片雲三片煎食後服與四物各半服龍蓋五

洩熱若雙和散本方加赤芍乾薑治諸熱病瘧疾 玉機云桂香宜結投湯水方去積黃加桂梗并搗之品浮而上之

去胸中無形之熱且不犯中下二焦也

大棗湯 治水飲作渴峻利不可輕用 大戟 芫花 甘遂 用大棗十枚水二杯煎七分去滓入藥方

寸已約有七分服次早當下未再一服服後體虛以稀粥調養

括基蘆白白酒湯 治胸痹喘急咳嗽胸背痛寸沈過關上小緊括基蘆白白酒三杯煎八

分服 加半瓦二錢名括基蘆白白酒湯治胸痹不得臥心痛微背

暑濕天 治虛勞諸不足風氣百疾 薯蕷 茯苓 柴胡 桔梗 白朮 防風 黃芩 麥冬 杏仁

阿膠 人參 乾薑 甘草 白朮 乾地黃 當歸 桂枝 神麴 豆黃卷 右

右二十一味末之煉蜜和丸如彈子大空腹酒服一丸一百丸為劑 魏念辰曰人之元氣在肺人之元

陽在腎既剝則難於透復矣全賴後天之氣氣資其生是榮衛非脾胃不能通宣而氣血非飲食無由平復也仲

景故為虛勞諸不足而兼風氣百疾立此薯蕷丸之法方中以薯蕷為主為理脾胃上指下指至可以持持以人參

白朮茯苓乾薑豆黃卷大棗神麴甘草助之除濕益氣而中土之令得行矣以當歸黃芩為地黃麥冬阿膠養血滋

陰以榮胡桂枝防風去邪散熱以杏仁桔梗白朮下氣開鬱阻惡虛而有熱之人滋補之藥上指下指不受致為散其邪熱

開其逆將而氣血平順補益得助為至當不易之道也

大黃虛羸丸 治五勞七傷虛羸瘦弱腹滿不能飲食食傷憂傷房室傷飢傷勞傷經絡榮衛傷內有氣血肌肉甲錯口黯

棗中清散 大黃 黃芩 二兩 甘草 三兩 桃仁 杏仁 蟲蟲 各一兩 乾漆 一兩 乾地黃

水蛭 蟅蟲 各一兩 厚朴 半斤 右十二味末之煉蜜和丸小豆大酒服五丸日三服 尤氏曰風氣不去則

足以賊正氣而長生不榮故著芫丸為要方乾血不去則足以留新血而滲灌不周此丸為上劑愚按此丸從內經四

烏劑一蘆茹丸悟出但不知四烏劑一蘆茹丸之平易近人也

上海大華書局印行

防已黃耆湯 治風水脈浮身重汗出惡風

防已 黃耆 三錢

炙甘草 二錢

白朮 二錢

生薑 四片

大棗 一棗

二杯煎八分服服後如蟲行皮中從腰下如水後坐被上又以一被絞腰下溫令微汗症喘者加麻黃 胃中不和者加芍藥氣上衝者加桂枝

附子梗米湯

治腹中寒氣雷鳴初痛胸脇逆滿嘔吐

附子 二錢

半夏 四錢

炙甘草 一錢

梗米 五錢

大棗 一棗

水三杯煎八分溫服日夜作三服

大黃附子湯

治下偏痛發熱脈弦者

大黃 三錢

附子 二錢

細辛 二錢

水二杯煎八分服

桂枝新加湯

治發汗後身疼痛脈沉遲者

桂枝 八錢

芍藥 三錢

甘草 二錢

大棗 十二枚

生薑 四片

右

六味以水一斗二升微火煮取三升去滓分溫服一升餘如桂枝湯法

大柴胡湯

治太陽病不解便傳入陽明大便不通無心煩或寒熱往來其脈沉實者以此方下之

芍藥 黃芩

枳實 三錢

柴胡 八錢

半夏 五錢

生薑 五錢

大棗 四枚

右七味以水三杯煮取一杯半去滓再煎八分溫服日三

服一方用大黃二錢若不大黃恐不為大柴胡湯也

桃仁承氣湯

治太陽病不解發熱結胸其人如狂血自下者愈其外不解者向水可攻當先解外外已解但小腹急結者乃可以之

桃仁 二十枚

大黃 四錢

甘草 二錢

厚朴 二錢

枳實 二錢

芒硝 二錢

右五味以水二杯半煮取一杯去

滓納芒硝更上微火至八分溫服日三服當微利

小承氣湯

治陽明病潮熱大便秘結沉而滑乃內實腹痛者

大黃 四錢

厚朴 二錢

枳實 二錢

右三味以

水二杯煎八分溫服日二服初服湯當更衣不爾者再飲之若更衣者勿服之

大承氣湯

治陽明病大便秘結不通腹脹大熱其脈沉實者此方主之

芒硝 三錢

大黃 四錢

枳實 二錢

厚朴 二錢

右四味以水一斗先煮枳實取五升去滓納大黃煮取二升去滓納芒硝更上微火一兩沸

分溫再服得下勿服

調胃承氣湯

治汗後發熱煩渴心煩中滿脈浮者主之

大黃 四錢

甘草 二錢

芒硝 二錢

右三味以水

三升煮取一升去滓納芒硝更上火微煮令沸少少溫服之

按張氏公云承者以卑承尊而無尊成之義天尊地

卑一形氣也形統於氣故地統於天形以承氣故地以承天胃土也坤之類也氣陽也乾之屬也胃為十二經之長化糟粕運精微而成傳化之所豈專以塊然之形亦惟承此氣行不息之氣耳湯若承氣確有此義非取順氣之義也憲公此解超前人惜其所著者陽寒類疏未刊行世憲公諱孝錫古吳人也

半夏瀉心湯

治傷寒五六日嘔而外熱者柴胡證俱在而以他藥下之柴胡証仍在者復與柴胡湯此雖以下之而不為逆必蒸蒸而振却發熱汗出而解若心下滿而鞭者此為痞柴胡不當與之宜此方主之

乾薑甘草

三服

大黃連瀉心湯

治傷寒大下後復發汗心下痞按之濡其脈關上浮者此方主之若有惡寒者表未解也宜先解表然後攻痞

附子瀉心湯

治心下痞而復惡寒

湯二升清之須臾絞去滓納附子汁分溫再服

生薑瀉心湯

治傷寒解後胃中不和心下痞乾噦食臭腸下有水氣腹中雷鳴下利者

甘草瀉心湯

治傷寒中風醫反下之其人下利日數十行穀不化腹中雷鳴心下痞硬而滿乾噦心煩不得安寧見人

心下痞謂病不盡復下之其痞益甚此非結熱但以胃中虛客氣上逆故也

溫經湯

吳茱萸三錢

冬三錢

不來方中當歸芍藥阿膠干白也丹皮桂枝心藥也吳茱萸肝藥亦胃藥也半夏胃藥也麥門冬甘草

胃藥也人參補五臟生薑利諸氣也病在經血以血生於心藏於肝也衝為血海也胃屬陽明厥陰衝脈之也然細釋方意以陽明為主矣藥更用至三錢驅陽明中土之寒即以參門冬用至五錢驅陽明中土之燥一寒一熱不使偶偏所以謂之溫也半夏用至二錢半生薑用至三錢者以薑能去穢而胃氣安矣能降逆而胃氣順也其餘皆相輔而成其溫之之用絕無逆療之品故過期不來者能通之月來過多者能止之少腹寒而不受胎者並能治之神妙不可言矣

除痰方 秘授此方治婦人鳩蟻瘰癧名不虛古名除痰今人呼為痰血瘰癧也 飛蟻六兩 銅絲知

五味 雄黃五錢 批仁一兩 共研末煉蜜丸每丸重四錢以方內雄黃為末 按婦人有得此症者不肯服依以

致毒攻臟府經脈不調經閉水不生育面黃肌瘦四肢無力腰腹疼痛不思飲食咳嗽痰喘作寒作熱自汗盜汗如一月至一年之症不知道者或用刀割患處命在旦夕如遇此症只用此丹一丸重者二丸坐入下卸即愈

駐車丸 治大冷洞痢腸滑下赤白如魚腦日夜無度腹痛不可忍者方 黃連六兩 乾薑一兩 當歸 阿膠各

兩 右四味為末以大酢八合煉膠和之并手丸如大豆候乾大人服三十丸小兒以意量減日三 按依路王云

人身有車皆附脊而行以司精氣神之運度羊車屬肺分當在上以職司化味歸神故位反在下鹿車屬腎分當在下以職司化大益氣故位反在中牛車屬脾分當在中以職司化味歸神故位反在上皆此平人之常度也修其家焉其順行之性起滅無常乃修逆行之道以為兩丹之基千金又以平人失其常度而患下痢崩脫良由鹿車過駛趨動羊車過動以致精血不藏牛車過疲不能隨鹿車之馳驟以致水穀不化故用乾薑以助牛車之健運黃連以提鹿車之傾危阿膠以救羊車之奔走當歸以理血氣之散亂鹿精氣神各歸其經而無崩脫之虞且冷痢得乾薑可燥熱痢得黃連可瘥冷熱交錯得黃連可解阿膠可滋乾薑之燥當歸可和黃連之寒不特為久痢神丹尤為休息之專藥

