

王
氏
五
種
溫
熱
緯^經
卷
五



溫熱經緯卷五

定州楊照黎素園評 海甯王士雄孟英纂

錢塘任 源殿華參 烏程汪曰楨謝城評

方論

(二)甘草湯 甘草_{二兩} 水三升煮取一升半去滓溫服七合日二服 王晉三曰一藥治病是曰奇方徐河漢

曰大甘為土之正味能制腎水越上之火 王樸莊曰自靈素至漢晉宋齊諸古方凡云一兩者以今之七

分六釐準之凡云一升者以今之六勺七抄準之 王按唐人之方則一兩當古之三兩雄按鞠通凡

按傷寒類要治傷寒心悸脈結代聖濟總錄治古腫塞口外科精要治一切癰疽諸發及丹石烟火藥發

部手集治懸癰直指方治疽瘡煩渴及蟲毒藥毒金匱玉函治小兒撮口及小兒羸瘦得效方治小兒遺溺

皆以一味甘草為方妙用良多總不外乎養陰緩急清熱化毒也 王按亦兼服 和中利水

(三)桔梗湯 桔梗_兩 甘草_兩 水三升煮取一升去滓分溫再服 鄒潤安曰腎家邪熱循經而上肺不任受

遂相爭競二三日邪熱未盛故可以甘草瀉火而愈若不愈是肺竅不利氣不宣泄也以桔梗開之肺竅既

通氣遂宣泄熱自透達矣 雄按雖以桔梗名湯而倍用甘草以為駕馭後人改稱甘桔湯是矣但須審證

而投不可泥為通治咽痛之方也 黃錦芳醫素求真嘗論及之醫者不可不知

(三)豬膚湯 豬膚_{一斤} 雄按以豬皮去其肉肥剉如紙 水一斗煮取五升去滓加白蜜一升白粉五合 柳

熬香和令相得溫分六服 王晉三曰腎應癢而肺主膚腎腋下泄不能上蒸於肺致絡燥而為咽痛者又

非甘草所能治矣當以豬膚潤肺腎之燥解虛煩之熱白粉白蜜緩中俾豬膚比類而致津液從腎上入肺

中循喉嚨復從肺出絡心注肺中而上中下燥邪解矣

(四)黃連阿膠湯 黃連_兩 黃芩_兩 芍藥_兩 阿膠_兩 雞子黃_枚 水五升先煮三物取二升去滓內膠烱盡小冷

內雞子黃攪令相得溫服七合日三服 鄒潤安曰尤氏云陽經之寒變為熱則歸於氣陰經之寒變為熱



則歸於血。陽經或有歸於血者。惟陰經之熱。則必不歸於氣。故三陰有熱結證。不用調胃。承氣小承氣而獨用大承氣。諸下利證不己。則便膿血。是其驗也。心中煩不得臥。臥者為陰虛。陰虛則不得瀉火。今至二三日以上。乃心中煩不得臥。則非始即屬熱矣。始即屬熱。心中煩不得臥者。為陰虛。陰虛則不得瀉火。今至二三日以上。始見則為陽盛。陽盛則宜瀉火。然致此陽盛。亦必其陰本虛。故阿膠芍藥雞子黃無非救陰之品。瀉火則惟恃苓連而苓止一兩。連乃四兩。此黃連之任獨冠一方。而為補劑中瀉藥也。

五豬苓湯

豬苓 茯苓 澤瀉

滑石

阿膠

略一

水四升。先煮四味。取二升去滓。內阿膠。厚朴。溫服七

合。日二。周禹載曰。熱盛膀胱。非水能解。何者。水有止渴之功。而無祛熱之力也。故用豬苓。茯苓。澤瀉。滑石。之鹹寒。與五苓不異。而此易尤以膠者。彼屬氣。此屬血也。易桂以滑石者。彼有表而此為消熱也。然則所蓋之水。去則熱消矣。潤液之味。投則渴除矣。鄒潤安曰。松之概。挺拔勁正。楓之概。柔弱易搖。松之理。麤疏。楓之理。堅細。松之葉。至冬益蒼翠。而不凋。楓之葉。至冬遂鮮赤。而即落。是具一柔一剛。顯然殊致。茯苓屬陽。治停蓄之水。不從陽化者。豬苓屬陰。治鼓盪之水。不從陰化者。是故仲景以豬苓名方者。其所治之證。曰少陰病。下利。欬而嘔。渴心煩不得眠者。豬苓湯主之。若五苓散。則其治有渴者。有不渴者。至茯苓。入他方所治之病。則不渴者居多。蓋渴者。水氣被陽逼迫。欲得陰和而不能也。與之豬苓。使起陰氣。以和陽化水。譬之楓葉。已丹。遂能即落也。

六承氣湯

厚朴

八兩

枳實

五

大黃

酒洗

芒硝

三

水一斗

先煎二物。取五升去滓。內大黃。煮取二升

去滓。內硝。更上微火。一二沸。溫再服。得下。餘勿服。鄒潤安曰。柯氏云。厚朴倍大黃。為大承氣。大黃倍朴。厚為小承氣。是承氣者。在枳朴。應不在大黃矣。但調胃承氣湯。不用枳朴。亦名承氣何也。且三承氣湯中。有用枳朴者。有不用枳朴者。有用芒硝者。有不用芒硝者。有用甘草者。有不用甘草者。惟大黃則無不用。是承氣之名。固當屬之大黃。况厚朴三物湯。即小承氣湯。厚朴分數。且倍於大黃。而命名反不加承氣字。猶不可見承氣不在枳朴乎。自金元人以順釋承。而大黃之功。不顯考本經。首推大黃通血。再以六微旨大論。元則害

承乃制之義參之則承氣者非血而何。夫氣者血之師故血隨氣行亦隨氣滯氣滯血不隨之滯者是氣之不足非氣之有餘惟氣滯併波及於血於是氣以血為屈宅血以氣為禦侮遂連衡宿食蒸逼津液悉化為火此時惟大黃能直擣其巢傾其窟穴氣之結於血者散則枳朴遂能效其通氣之職此大黃所以為承氣

雄按此余風論如此鄭氏先得我心汪按大黃本血分之藥故如此說確不可易

白虎湯 石膏一斤知母六兩甘草二兩粳米一斗水一斗煮米熟湯成去滓溫服一升日三服方中行曰白

虎者西方之金神司秋之陰獸虎嘯谷風冷涼風酷暑消神於解熱莫如白虎石膏知母辛甘而寒辛者金之味寒者金之性辛甘體寒得白虎之體焉甘草粳米甘平而溫甘取其緩溫取其和緩而且和得伏虎之用焉飲四物之成湯來白虎之嘯嘯陽氣者以天地之疾風名也風行而虎嘯者同氣相求也虎嘯而風生者同聲相應也風生而熱解者物理必至也抑嘗以此合大小青龍真武而論之四物者四方之通神也而以命名蓋謂化裁此時神妙萬世名義兩符實自然而然者也方而若此可謂至矣然不明言其神而神卒莫之掩者君子慎德此其道之所以大也汪按飲四物之成湯以下數行語多支離牽強必宜刪去夫白虎

白虎加人參湯 原方加人參三兩煮服同前法 鄒潤安曰傷寒脈浮發熱無汗其表不解者不可與白

虎湯字最為白虎湯所忌渴欲飲水無表證者白虎加人參湯主之可見白虎加人參湯之治重在渴也

其時時惡風則非常惡風矣背微惡寒則非偏身惡寒矣常常惡風偏身惡寒者謂之表證時時惡風背

微惡寒者表邪已經化熱特尚未盡耳謂之無表證可也然熱邪充斥津液消亡用栝蒌根生津止渴可也

何以必用人參靈樞決氣篇腰理發泄出汗溱溱是謂津津津為水陰屬也能外達上通則陽矣夫是之謂陰

中之陽人參亦陰中之陽惟其入陰故能補陰惟其為陰中之陽故能入陰使入陰中之氣化為津不化為

火是非栝蒌根可為力矣 雄按朱奉議云再三汗下熱不退者以此湯加蒼朮一錢如神

元黃芩湯 黃芩二兩甘草二兩芍藥二兩大棗十二枚水一斗煮取三升去滓溫服日一升再夜一服 鄒潤安

曰或問黃芩湯治何等診其診腹痛與否若腹痛何以用黃芩若腹不痛何以用芍藥注按腹痛因於熱者甚多謂腹痛必因寒
滯前人拘曰其證身熱不惡風亦不惡熱或下利或嘔腹則不痛蓋芍藥甘草大棗桂枝湯裏藥也以不寒
風故不用薑桂黃芩甘草黃芩大棗小柴胡裏藥也以不往來寒熱故不用柴胡以其常熱故不用人參
不嘔則併不用半夏生薑至芍藥則並不因腹痛而用以桂枝湯證原無腹痛也亦不心下痞鞭故不夫
棗也又厥陰篇云傷寒脈遲與黃芩湯除其熱腹中則冷不能食可知黃芩湯證之脈必數黃芩所治之熱
必自裏達外不治但在表分之熱矣然仲景用黃芩有三耦焉氣分熱結者與柴胡為耦血分熱結者與芍
藥為耦濕熱阻中者與黃連為耦以柴胡能開氣分之結不能泄氣分之熱芍藥能開血分之結不能清
血之熱黃連能治濕生之熱不能治熱生之濕譬之解關但去其關者未平其致關之怒關終未已也故黃
芩協柴胡能清氣分之熱協芍藥能泄迫血之熱協黃連能解熱生之濕也按注前上方解不過望云生義必如鄭氏諸條始覺有味可咀

干黃芩加半夏生薑湯 原方加半夏半升生薑三兩煮服法同前 鄒潤安曰嘔而脈數口渴者為火氣犯

胃不宜加此 雄按章虛谷云生薑性熱僅能治寒不可泛施於諸感也注按傷寒百十三方用薑者五

最宜慎用用之不當或致殺人洵溪謂雖與今連同用亦尚有害是也又古時未有炮製之法凡方用半夏

無不兼用薑者義取製半夏之毒其所以治病者功不半夏不在薑也今所用半夏必先已薑製可不必兼

用薑矣後人不察但見古方用薑者不少遂不為之

何證隨手妄施其中必有誤而不自覺者戒之

干二梔子豉湯 梔子枚十四香豉絲四合水四升先煮梔子得二升半內豉煮取升半去滓分為二服溫進一

服得吐止後服 徐洄溪曰此劑分兩最小凡治上焦之藥皆然按此方加減七方既不注意何經亦不專

治何證總由汗吐下之後正氣已虛尚有痰涎滯氣凝結上焦非汗下之所能除雄按溫暑濕熱之證每有

在汗吐下後也既非汗經所云在上者因而越之則不動經氣而正不重傷此為最便乃不易之法也古方

下可除无忌妄投補劑梔子皆生用故入口即吐後人作湯以梔子炒黑不復作吐全失用梔子之意然服之於虛煩證亦有驗想

其清肺除煩之性仍在也注按欲吐者宜生用

十二一物瓜蒂湯

瓜蒂二个

水一升煮取五合去滓頓服

尤在涇曰暑之中人也陰虛而多火者暑即

寓於火之中為汗出而煩渴宜白虎加人參以清熱生陰陽虛多濕者暑即伏於濕之內為身熱而疲重故暑病恒以濕為病而治濕即所以治暑瓜蒂苦寒能吐能下去身面四肢水氣水去而暑無所依將不治而自解矣此治中暑兼濕者之法也

十三炙甘草湯

一名復脈湯

甘草四兩

生地黄一斤

麥冬各半

桂枝

生薑各三

人參

阿膠二

大棗三十

枚方寸半切生地黄

清酒七升水八升先煮八味取三升去滓內膠烊消盡溫服一升日三服沈亮震曰此

湯為千古養陰之祖方也鄒潤安曰地黃分數獨甲於炙甘草湯者蓋地黃之用在其脂液能榮養筋脈經脈乾者枯者皆能使之潤澤也功能復脈故名復脈湯脈者原於腎而主於心心血枯枯則脈道之滯此傷寒論所以脈結代與心動悸並稱金匱要略又以脈結悸與汗出而悶並述至肺痿之心中溫溫液液涎唾多則陰皆將盡之孤注陽僅膏覆之殘燭惟此湯可增其殼內絡外之脂液也

十四瓜蒂散

瓜蒂熬

赤小豆各一分

俗名米赤者是也勿誤用想思子各別搗篩為散已合治之取一錢七以香豉

一合用熱湯七合煮作稀糜去滓取汁和散溫頓服之不吐者少少加得快吐為止諸亡血虛家不可與之

盧子繇曰瓜象實在鬚蔓間也帶瓜之綴蔓處也性蔓偏延未繁於本故少延輒腐爾雅云其紹綫疏云繼

本曰紹形小曰綫故近本之瓜常小近末之瓜轉大也凡實之吮抽津液惟瓜稱最而吮抽津液之樞惟帶

是以瓜蒂具撒下炎上之用乃帶味苦而瓜本甘以見中樞之所以別於上下內外誠涌泄之宣劑通劑也

十五麻黃連軹赤小豆湯

麻黃

連軹

甘草

生薑

赤小豆

生梓白皮

杏仁

大棗

枳實

芍藥

黃芩

潦水一斗先煮麻黃再沸去上沫內諸藥煮取三升分溫三服半日服盡鄒潤安曰本經臚列連軹之功

以寒熱起以熱結中此條瘕熱在裏句適與連軹功用不異郭景純爾雅注一名連苞苞軹聲同字異耳而

今本傷寒論注曰連軹即連翹根遂以本經有名未用翹根當之陶隱居云方藥不用人無識者故唐本草

去之豈仲景書有此六朝人皆不及見至王海藏忽見之耶意亦必無之事矣

十六 梔子柏皮湯 梔子^{十五}黃柏^二甘草^一 水四升。煮取升半。去滓分溫再服。鄒潤安曰：梔子大黃湯

茵陳蒿湯大黃硝石湯。梔子柏皮湯證。其標皆見於陽明陽明者。有在經在腑之分。發熱汗出懊憹。皆經證

也。腹滿小便不利。皆腑證也。梔子大黃湯證。經多而腑少。茵陳蒿湯證。有腑而無經。梔子柏皮湯證。有經而

無腑。大黃硝石湯證。經少而腑多。雄按金鑑云：此方之甘草。當是茵陳蒿。必傳寫之謬也。

十七 茵陳蒿湯 茵陳^六梔子^一大黃^二 水一斗。先煮茵陳減六升。內二味煮取三升。去滓分溫三服。

小便當利。溺如皂角汁。狀色正赤。一宿腹減。病從小便去也。徐洄溪曰：先煮茵陳則大黃從小便出。此秘法也。鄒潤安曰：新感之

邪。為素有之熱。結成黃疸。此證已。所謂茵陳矣。故傷寒金匱二書。幾若無疸。不茵陳者。然梔子柏皮湯證。有

外熱而無裏熱。麻黃連軀赤小豆湯證。有裏熱而無外熱。小建中湯證。小便自利。小柴胡湯證。腹痛而嘔

小半夏湯證。小便色不變而噦。桂子加黃耆湯證。脈浮。梔子大黃湯證。心中懊憹。硝石礬石散證。額上黑。日

晡發熱。則內外有熱。但頭汗出。齊頸而還。腹滿。小便不利。口渴。為茵陳湯證矣。第腹滿之治。在大黃內熱之

治。在梔子。惟外復有熱。但頭汗出。小便不利。始為茵陳的治。其所以能治此者。以其新葉因陳幹而生。清芬

可以解鬱熱。苦寒可以泄停濕也。蓋陳幹本能降熱利水。復加以葉之如絲如縷。挺然於暑蒸濕逼之時。先

草本木而生。後草木而彫。不必能發散。而清芳揚溢。氣暢不斂。則新感者遂不得不解。自是汗出。不止於頭

故曰發熱汗出。此為越熱不能發黃也。

十八 抵當湯 水蛭^熬蠪^{去足}蟲^{去足}桃仁^三 大黃^三 右為末。以水五升。煮取三升。去滓溫服一升。不

下再服。徐洄溪曰：凡人身瘀血方阻。尚有生氣者。易治阻之久。則無生氣而難治。蓋血既離經。與正氣全

不相屬。投以輕藥。則拒而不納。藥過峻。又能傷未敗之血。故治之極難。水蛭最喜食人之血。而性又遲緩。善

入遲則生血不傷。善入則堅積易破。借其力以攻積久之滯。自有有利而無害也。徐洄溪曰：王叔和云：人章虛

谷曰：經言陽絡傷則血外溢。陰絡傷則血內溢。外溢則吐衄。內溢則便血。蓋陰陽手足十二經。交接皆由絡貫通。接連細絡分布周身。而血隨氣行。必由經絡流注表裏循環。是故絡傷則血不能循行。隨陰陽之部而

溢出其傷處即瘀阻久而蓄積無陽氣以化之乃成死血矣故仲景用飛走藥引桃仁專攻絡結之血大黃本入血分再用酒浸使其氣浮隨蟲藥循行表裏以導死血歸腸腑而出豈非為至妙至當之法哉由是類推失血諸證要必以化瘀調經絡為主矣余每見有初治即用呆補之法使瘀結絡閉不能開通終至於死良可慨也雄按王清任論虛癆亦主瘀血蓋本大黃蟄蟲丸之義而化之也

千九文蛤散 文蛤五為散以沸湯和一錢七服湯用五合

三士文蛤湯 文蛤 石膏五麻黃 甘草 生薑各三杏仁五十大棗十二水六升煮取三升溫服一

升汗出即愈 鄉潤安曰文蛤即海蛤之有文理者吳人謂之花蛤雄按王晉三云若點色無夏小正季秋之月省入於海為蛤安氏云雀羽蟲也羽蟲屬火火炎上故鳥上飛曷為入海而為蛤蓋九月火伏於戌十月純陰金水之令故羽蟲感之而化也蛤屬水水性下故下潛交秋水勝火雀為蛤象火之伏於水也又離為火為雉為蚌雀雉之類蛤蚌之類外剛內柔皆離之變化也因思傷寒論反以冷水濕濯之證非火厄於水而何金匱要略吐後渴欲得水之條非火之溺於水而何惟其火在水中而病故以火入水中而生者治之然厄於水者惡水惡水則火與水未相決也故直以是使水中之火仍暢茂得生而可已溺於水者喜水喜水則火與水漸相決矣故必合麻杏甘草加薑棗以清發之乃能已也

三干二五苓散 澤瀉六錢豬苓 茯苓 白朮各十八錢方中行曰朮上不當有白字雄按二十四錢為一兩

分桂枝半為末以白飲和服方寸匕日三服服水汗出愈 沈果之曰中風發熱六七日不解而煩有表裏證渴欲飲水水入即吐者名曰水逆五苓散主之蓋表證為太陽不足故用桂以宣陽氣通津液於周身即內經水精四布五經並行之旨非用之以通水道下出也裏證為三焦之氣化不宣故用瀉朮二苓以通三焦之閉塞非開膀胱之溺竅也夫下焦之氣化不宣則腹膨而小便不利水蓄膀胱是為胞痺此乃水蓄於膀胱之外不能化入膀胱故用五苓以化之至小便不利汗出而渴者亦主以是方而不渴者茯苓甘草湯主之蓋渴為陽氣不足水不上升也不升則不降故用桂以升之二苓澤瀉以降之而用朮以為中樞

乃注者莫不以渴為熱入膀胱津液被劫所致如果熱入而復用桂尤以溫液耗津又加芩澤以參之是熱之又熱耗之又耗速之斃矣且不渴者反不用五苓而用茯苓甘草湯可知不渴則無須桂尤之蒸騰津液而桂尤之非治太陽而治三焦更不待言矣

三十三小陷胸湯

桔萸實大者一枚黃連一兩半夏半

水六升先煮桔萸取三升去滓內諸藥煮取二升去滓

三服。鄒潤安曰觀仲景之用桔萸實在此湯曰小結胸正在心下按之則痛在桔萸薤白白酒湯曰喘滿欬唾胸背痛短氣而其脈一則曰浮滑一則曰寸口沈遲關上下緊數是皆陰中有陽且踞於陽位者也夫胸背痛較按之方痛則甚痺則較結為輕欬唾喘息是其勢為上衝而居於心下按之繼痛似在靜而不動此其機總緣氣與飲相阻寒與熱相糾執甚於寒者其束縛反急而為結寒甚於熱者其蔽塞自盛而為痞是故結胸之病伏胸痺之病散伏者宜開散者宜行故一則佐以連夏之逐飲泄熱一則佐以薤酒之滑利通陽桔萸實之裏無形攢聚有形使之滑潤而下則同能使之下似是治實之方僅能使之下不能使其必通又非純乎治實之道矣何以知不能使之必通蓋有停飲痛甚至不得卧即當如半夏若兼胸滿脅下逆搶心則仍加枳朴桂枝倘竟能通又何必如是是知桔萸實之治大旨在火與痰結於陽位不純乎虛亦不純乎實者皆能裏之而下此其擅長矣

三十三白散

桔梗

貝母各三

巴豆一分去皮心膜熬黑研如脂

以白飲和服強人半錢羸者減之病在膈上必吐在膈下必利不利進熱粥一杯利過不止進冷粥一杯

為末內巴豆更於臼中杵之

半錢者以銅錢取藥末僅沒錢文之半即半錢也而省七字非若今人以五分為半錢也鄒潤安曰寒實結胸無熱證者治以白散散中用桔梗為疏通氣分之主夫開導胸中之氣仲景於大承氣湯梔子厚朴等湯莫不用枳朴此偏不用何哉蓋病有上下治有操縱結在上者宿痰停飲也故凡結胸無論熱實寒實常用甘遂葶巴豆不用枳朴如大陷胸湯丸白散是也結在中下始熱過實決氣隨熱化則於湯滌邪穢中流利其與邪為伍之氣大小承氣諸湯是也况桔梗之用使氣上越而不使氣下泄今病在至高固宜操上而縱下不使中下無過之地橫被侵陵故曰

病在膈上必吐在膈下必利也。或邪與停飲結治以栝實而佐之者反用半夏。或邪與停飲結治以白豆而佐之者反用桔梗貝母。於寒因熱用熱因寒用之中反佐以取之可謂精義入神以致用者矣。

二十四調胃承氣湯 大黃四兩去皮 甘草二兩 芒硝半斤 水三升。先煮大黃甘草取一升去滓。內芒硝更煮微煮令沸。少少溫服之。徐河溪曰：芒硝善解結熱之邪。大承氣用之以解已結之熱邪。此方用之以解將結之熱邪。其能調胃則全賴甘草也。

二十五升麻鼈甲湯 升麻 當歸 甘草各二兩 蜀椒炒去汗 鼈甲一手指大雄黃半兩 水四升。煮取一升頓服之。老小再服。取汗。金匱要略陽毒用此方。陰毒去雄黃蜀椒。肘後千金方陽毒用升麻湯。無鼈甲有桂陰毒用甘草湯。即本方無雄黃。活人書陽毒升麻湯用犀角射干黃芩人參。無當歸蜀椒鼈甲雄黃。徐河溪曰：蜀椒辛熱之品。陽毒用而陰毒反去之。疑誤活人書加犀角等四味頗切當。

二十六百合知母湯 百合欸知母三 先以水洗百合。漬一宿。當白沫出。去其水。別以泉水二升煎取一升。去滓。別以泉水二升煎知母取一升。後合煎一升五合。分溫再服。王樸莊曰：百合入藥以野生極小者為勝。

二十七百合雞子黃湯 百合欸雞子黃欸 先煎百合如前法。了內雞子黃攪勻煎五分溫服。

二十八百合滑石代赭湯 百合欸 滑石三兩 代赭石九兩 先煎百合如前法。別泉以水二升煎滑石代赭取一升。去滓。後合和重煎取一升五合。分溫再服。

二十九百合地黃湯 百合欸 生地黄汁一升 先煎百合如前法。了內地黃汁煎取一升五合。分溫再服。中病勿更服。大便當如漆。

三十百合滑石散 百合一兩 滑石三兩 為散飲方寸匕。日三服。當微利者止。服熱則除。鄒潤安曰：玩百合知母湯。可以見汗則傷氣。邪搏於氣分。為消渴熱中也。玩百合雞子黃湯。可以見吐則傷上。邪擾於心。為煩。

懊不寐也。玩百合代赭湯。可以見下則傷血。邪搏於血分。為血脈中熱也。玩百合地黃湯。可以見不經吐下發汗。則係百脈一宗。悉致其病。無氣血上下之偏矣。所謂百脈一宗。何平人氣象論曰：胃之大絡。名曰虛里。

出於左乳下其動應衣為脈宗氣是最近於心乃著邪焉是以見證行卧不安如有神靈皆心中轉轉不道之狀口苦小便數身形如和其脈微數皆熱鬱氣悅之徵以此例之本經百合主邪氣腹滿心痛蓋有百合符節者而治法始終不外百合則以心本不任受邪心而竟為邪擾則不責將之謀慮不審即責相之過節不行今邪阻於上而不下行為肺之不主肅降無能通矣故欲徵其愈期極宜驗其小便凡溺時必肺氣下導小便乃出今氣柱於頭即欲下行上先有故則肺形之軒舉不隨氣之支結不降亦又何疑乃頭中之不適復分三等其最甚者至氣上柱而為痛其次則不痛而欲折折然又其次則因小便痛而快然即此驗其軒舉支結之淺深微甚既瞭如指掌矣况合之以百合地黃湯下云大便當如漆百合滑石散下云微利者止服熱則除則百合之利大小便又與本經膠合矣

三十一 栝蒌牡蠣散

栝蒌根

牡蠣熬等

為細末飲服方寸匕日三服

鄒潤安曰百合病至一月不解而

變成渴以百合湯洗之而仍不差則病為傷中上之陰無疑雖然僅曰渴不曰欲飲水且不煩不熱究竟病無駐足之所僅渴之一端為得所依藉耳於此見昔之百脈一宗悉致其病者今則上焦已化而在下者尚未化也上焦已化百脈之病已蠲其半百合遂無所用之而下焦之未化者不得不選用牡蠣使之召陽歸陰而其主腦尤在治上焦之已化者故方中配以從陽化陰之栝蒌根兩物等分標名則升栝蒌於牡蠣之上為一方之統攝也

三十二 甘草瀉心湯

甘草四兩 黃芩

人參

乾薑略三

半夏詳黃連

大棗

十二枚傷寒論無人參

水一斗煮取六

升去滓再煎取三升溫服一升日三王晉三曰甘草瀉心非瀉結熱因胃虛不能調劑上下水寒上逆火熱不得下降結為痞故君以甘草大棗和胃之陰乾薑半夏啟胃之陽坐鎮下焦客氣使不上逆仍用芩連將已逆為痞之氣輕輕瀉卻而痞乃成泰矣

三十三 赤豆當歸散

赤小豆

三升洗令當歸分

杵為散漿水服方寸匕日三

汪按赤小豆乃赤豆之小種合藥肆以赤紅半黑之相是子為

赤小豆醫者以多誤用然相思子不能出芽即北方可識其謬

三十四二妙散 茅山蒼朮勝川黃柏炒 為未搏生薑煎沸湯調服 王晉三曰此偶方之小制也蒼朮生用入陽明經能發二陽之汗黃柏炒黑入太陽經能除至陰之濕一生一熟相為表裏治陰分之濕熱有如鼓應桴之妙

三十五生薑瀉心湯 生薑四兩 甘草炙 人參 黃芩各三兩 半夏半斤 黃連 乾薑各一兩 大棗十二枚 水一斗煮取六升去渣煎取三升溫服一升日三 徐洄溪曰汗後而邪未盡必有留飲在心下其證甚雜而方中諸藥一

一對證內中又有一藥治兩證者亦有二藥合治一證者錯綜變化攻補兼施寒熱互用皆本內經立方諸法其藥性又皆與神農本草所載無處不合學者能於此等方講求其理而推廣之則操縱在我矣

三十六半夏瀉心湯 半夏半斤 黃芩 乾薑 甘草炙 人參各二兩 黃連 大棗十二枚 水一斗煮取六升去渣

再煎三升溫服一升日三 方中行曰半夏乾薑辛以散虛滿之痞黃芩黃連苦以泄心膈之熱人參甘草甘以益下後之虛大棗甘溫潤以滋脾胃之液曰瀉心者言滿在心膈而不在胃也

三十七大黃黃連瀉心湯 大黃二兩 黃連兩 麻沸湯二升漬之須臾絞去滓分溫再服 尤在涇曰成氏云

此導虛熱之方也按所謂虛熱者對燥矢而言也蓋邪熱入裏與糟粕相結則為實熱不與糟粕相結則為虛

熱非陰虛陽虛之為本方以大黃黃連為劑而不用枳朴等藥者蓋以泄虛熱非以瀉實熱也用枳朴等藥

也二味僅以麻沸湯須臾即絞其味甚薄乃可泄虛熱若久清米厚雖無枳朴亦能下走腸胃也汪按尤氏解釋極精妙藥應更以煎法釋之亦妙

三十八附子瀉心湯 大黃二兩 黃連兩 黃芩各三兩 附子一枚 以麻沸湯二升漬三味須臾絞去渣內附

子汁分溫再服 徐洄溪曰前方乃法之最奇者不取煎而取泡欲其輕揚清淡以滌上焦之邪此法更精

附子用煎三味用泡扶陽欲其熱而性重開痞欲其生而性輕也雄按觀此可知用藥之道 鄭潤安曰心之為體於卦

象離今被邪逼則外陽內伐內陰沸騰故半夏甘草生薑三瀉心治陰邪之未化者也大黃黃連附子二瀉

心治陰邪之已化者也陰邪已化不逼心陽則在內之沸亂略定惟在外之邪氣尚阻則取二黃之泄熱瀉

去其邪邪去正自安矣惡寒汗出者在上之陰邪變化在下之陰氣復逆故輕取二黃之氣以瀉熱除微重

任附子之威以追逐逆陰使之異趨同歸相成而不相背也其未化者陽餒胸於陽位而志肆於陰分邪盤踞於清道而潰泄於下焦非乾薑半夏生薑之振散陰霾不足以廓清心之外郭非人參黃連之養陰也熟不足以安擾心之內訌也 又曰余治瘧發時先吐者用半夏瀉心吐瀉交作者用生薑瀉心胸痞下利者用甘草瀉心皆應如桴鼓

三九小承氣湯 大黃^{四兩}厚朴^{二兩}枳實^枚 水四升煮取一升二合去滓分溫二服初服湯當重下不爾者更飲之若更衣勿服 雄按於大承氣湯既去芒硝而減枳朴復以大黃同煎而緩其蕩滌之性古人謂之和胃之劑故曰小承湯

四十牛黃清心丸 陝西牛黃^{五分}鏡面硃砂^{五分}生黃連^{五錢}黃芩^{三錢}山梔^{各三錢}鬱金^錢 為末蒸餅為糊如黍米大每服七八丸 王晉三曰此丸古有數方其義各別若治溫邪內陷包絡神昏者惟萬氏此方為妙蓋溫熱入於心包絡邪在裏矣草木之香僅能達表不能透裏必藉牛黃幽香物性乃能內透包絡與神明相合然尤在佐使之品配合咸宜萬氏用芩連山梔以瀉心火鬱金以通心氣辰砂以鎮心神合之牛黃相使之妙是丸調入犀角羚羊角金汁甘草人中黃連翹薄荷等湯劑中頗建奇功 雄按周公謹云局方牛黃清心丸止是前八味至蒲黃而止自山藥以後凡二十一味乃補虛中山芋丸當時不知何以誤併為一因循不曾改正貽誤後人匪細凡此之類讀書者不可不知也一方用牛黃雄黃連黃芩梔子犀角鬱金硃砂各一兩真珠五錢冰片麝香各二錢五分研煉蜜丸每重一錢金箔為衣蠟燭功效較萬方為勝

太輕此方較有力

四十二至寶丹 生烏犀角 生瑤瑁 琥珀 鏡面硃砂 雄黃 西牛黃 龜龍腦 麝香 安息香 一兩五錢為末酒研飛淨 兩熱膏用水安息尤妙 金箔 銀箔 硃砂 為衣 先將犀瑁為細末入餘藥研勻將安息香膏重湯煮凝

成後入諸藥中和搜成劑丸如梧子大蠟護臨服剖用人參湯化下三九至五丸本事方有人參南星天竺黃 王晉三曰此治心臟神昏從表透裏之方也黃犀瑁珀以有靈之物內通心竅硃雄二箔以重墜之品

安鎮心神。佐以膠麝。安息搜剔幽隱。諸竅東垣云。冰雄牛麝入骨髓。透肌膚。抱朴子言。金箔雄黃合餌。為地仙。若與丹砂同用。為聖金餌。餌之可以飛。故熱入心包絡。古絳神昏者。以此丹入寒涼湯藥中用之。能解陰起陽。之展神明。有非他藥所可及。徐氏云。安神定魄。必備之方。真神丹也。若病因頭痛。而即神昏不語者。此肝虛魂升於頂。當用牡蠣救逆以降之。又非至寶丹所宜輕試。

早涼散

連翹
兩四
大黃

甘草 兩各二

黃芩酒炒薄荷

梔子各一兩

為粗末

母服二五錢加

竹葉七片水一椀半前一椀去滓入生白蜜一匙微煎溫服與四物各半服能和營泄熱名雙和散本方加赤芍乾葛治諸熱累效玉機云輕者宜桔梗湯汪按此方與第二方同實異即本方去硝黃加桔梗枳實之品等而上之去隔中無形之熱且不犯中下二焦也雄按此方加減法詳宣明論徐洄溪曰此瀉中上二焦之火即調胃承

徐洄溪曰。此瀉中上一焦之火。即調胃承

氣加疏風清火之品也

治以鹹寒佐

以苦甘。

故以連翹黃芩竹葉薄荷升散於上

黃芒硝推蕩其中使上升下行而膈自清矣余謂疫疹乃無形之熱投以硝黃之猛烈必致內潰因去硝黃
加生石膏桔梗使熱降清升而疹自透亦上升下行之義也雄按法本宣明齋裁甚善

四三犀角地黃湯

各三錢生地

錢五生甘草分五

水二鍾武

火煎三物至八分。去滓入犀汁和

服王晉三曰。溫熱入絡。古絳煩熱八九日不解。醫反治經寒之散之攻之。熱勢益熾。得此湯立效者。非解陽明熱邪解心經之絡熱也。按本草犀角地黃能走心經。專解營熱。連翹入心散客熱。甘草入心和絡血。以

治溫熱證邪入絡功勝局方

四十四導赤散

木通

甘草梢

各等不分旗
木通不應

等按分生地

水煎

服或加淡

竹葉

竹按古竹方淡

耳竹葉即竹葉也
今藥肆所售

淡竹葉草是小毒之別種性能涼胃不能清心醫人每多誤用雄按本方去甘草加黃芩蜜丸名火府丹亦治心熱弱澀淋渴等證本方加升麻黃連丹皮名升麻清胃湯輕清涼血乃秦皇士透化斑疹之良劑

四十五理中丸

甘草

乾

薑各三兩

擣篩

未蜜和

為丸如雞

子黃太。

以沸湯數人

答和一丸研碎

溫服之日三四服夜二服腹中未熟雄按未熟二字須著眼然不及湯湯法以四味依兩數切益至三四丸腹中不冷者其可服乎

用水八升。煮取三升。去滓。溫服一升。日三。
徐洄溪曰。此仲景治寒多霍亂之方也。蓋亦傷寒之類。後人以

暑月之吐利當之而亦此方更造為大順散者皆無稽之論也

四六四君子湯

人參

白朮

炒茯苓

甘草

生薑

大棗

水煎溫服

徐洄溪曰此補脾之主

方

四七五玉女煎

生石膏

熟地

麥冬

知母

牛膝

水一鍾半煎七分服

雄按陳修園

力闢此方之謬然用治陰虛胃火熾盛之齒痛頗有捷效若治溫熱病地黃宜生牛膝宜刪葉氏引用決不

泥守成方近讀景岳發揮果與陳氏之論印合

四八四物湯

生地

當歸

芍藥

四物為陰血受病之專藥非調補真陰之藥也汪按調補真陰宜集靈膏一百十二不宜四物而人多誤

會

四九小柴胡湯

柴胡

甘草

生薑

半夏

大棗

水一斗二升煮取六升去滓

再煎取三升溫服一升日三

尤拙吾曰熱入血室三條其旨不同第一條是血全空而熱乃入者空則熱

不得聚而游其部故脅滿痛第二條是熱邪與血俱結於血室者血結亦能作寒熱柴胡亦能去血結不獨

和解之謂矣第三條是熱邪入而結經尚行者經行則熱亦行而不得留故必自愈無犯胃氣及上二焦病

在血而不在氣在下而不在上也若誅伐無過變證隨出焉能自愈也沈再平曰今人治瘧必用此湯若

非此湯即不足以為治者故治輟轉淹滯變生不測竟能殞命則知瘧本非死證惟概以柴胡治瘧者殺之

也夫柴胡為少陽表藥若其瘧果發於少陽而以柴胡治之無不立愈若係他經用之則必使他經之邪輟

轉而入少陽遷延以斃乃既死猶曰柴胡為治瘧主藥吾開手即用之不知其何以死病家亦以柴胡治瘧

而竟不效真其命之當死也彼此昏迷不得一悟良可浩歎

柴半各八兩準今得六錢零八釐參草各二兩準今得二錢二分八釐棗十二枚以水一斗二升準今

得八合零四抄煮至減半去滓再煎至減半夫煎而又煎祇取四分之一其湯之濃郁甘柔可知喻氏謂和

雄按本方

雄按陳修園

力闢此方之謬然用治陰虛胃火熾盛之齒痛頗有捷效若治溫熱病地黃宜生牛膝宜刪葉氏引用決不

泥守成方近讀景岳發揮果與陳氏之論印合

四八四物湯

生地

當歸

芍藥

四物為陰血受病之專藥非調補真陰之藥也汪按調補真陰宜集靈膏一百十二不宜四物而人多誤

會

四九小柴胡湯

柴胡

甘草

生薑

半夏

大棗

水一斗二升煮取六升去滓

再煎取三升溫服一升日三

尤拙吾曰熱入血室三條其旨不同第一條是血全空而熱乃入者空則熱

不得聚而游其部故脅滿痛第二條是熱邪與血俱結於血室者血結亦能作寒熱柴胡亦能去血結不獨

和解之謂矣第三條是熱邪入而結經尚行者經行則熱亦行而不得留故必自愈無犯胃氣及上二焦病

在血而不在氣在下而不在上也若誅伐無過變證隨出焉能自愈也沈再平曰今人治瘧必用此湯若

非此湯即不足以為治者故治輟轉淹滯變生不測竟能殞命則知瘧本非死證惟概以柴胡治瘧者殺之

也夫柴胡為少陽表藥若其瘧果發於少陽而以柴胡治之無不立愈若係他經用之則必使他經之邪輟

轉而入少陽遷延以斃乃既死猶曰柴胡為治瘧主藥吾開手即用之不知其何以死病家亦以柴胡治瘧

而竟不效真其命之當死也彼此昏迷不得一悟良可浩歎

柴半各八兩準今得六錢零八釐參草各二兩準今得二錢二分八釐棗十二枚以水一斗二升準今

得八合零四抄煮至減半去滓再煎至減半夫煎而又煎祇取四分之一其湯之濃郁甘柔可知喻氏謂和

雄按本方

雄按陳修園

力闢此方之謬然用治陰虛胃火熾盛之齒痛頗有捷效若治溫熱病地黃宜生牛膝宜刪葉氏引用決不

泥守成方近讀景岳發揮果與陳氏之論印合

四八四物湯

生地

當歸

芍藥

四物為陰血受病之專藥非調補真陰之藥也汪按調補真陰宜集靈膏一百十二不宜四物而人多誤

會

四九小柴胡湯

柴胡

甘草

生薑

半夏

大棗

水一斗二升煮取六升去滓

再煎取三升溫服一升日三

尤拙吾曰熱入血室三條其旨不同第一條是血全空而熱乃入者空則熱

不得聚而游其部故脅滿痛第二條是熱邪與血俱結於血室者血結亦能作寒熱柴胡亦能去血結不獨

和解之謂矣第三條是熱邪入而結經尚行者經行則熱亦行而不得留故必自愈無犯胃氣及上二焦病

在血而不在氣在下而不在上也若誅伐無過變證隨出焉能自愈也沈再平曰今人治瘧必用此湯若

非此湯即不足以為治者故治輟轉淹滯變生不測竟能殞命則知瘧本非死證惟概以柴胡治瘧者殺之

也夫柴胡為少陽表藥若其瘧果發於少陽而以柴胡治之無不立愈若係他經用之則必使他經之邪輟

轉而入少陽遷延以斃乃既死猶曰柴胡為治瘧主藥吾開手即用之不知其何以死病家亦以柴胡治瘧

而竟不效真其命之當死也彼此昏迷不得一悟良可浩歎

柴半各八兩準今得六錢零八釐參草各二兩準今得二錢二分八釐棗十二枚以水一斗二升準今

得八合零四抄煮至減半去滓再煎至減半夫煎而又煎祇取四分之一其湯之濃郁甘柔可知喻氏謂和

雄按本方

雄按陳修園

力闢此方之謬然用治陰虛胃火熾盛之齒痛頗有捷效若治溫熱病地黃宜生牛膝宜刪葉氏引用決不

泥守成方近讀景岳發揮果與陳氏之論印合

四八四物湯

生地

當歸

芍藥

四物為陰血受病之專藥非調補真陰之藥也汪按調補真陰宜集靈膏一百十二不宜四物而人多誤

會

四九小柴胡湯

柴胡

甘草

生薑

半夏

大棗

水一斗二升煮取六升去滓

再煎取三升溫服一升日三

尤拙吾曰熱入血室三條其旨不同第一條是血全空而熱乃入者空則熱

不得聚而游其部故脅滿痛第二條是熱邪與血俱結於血室者血結亦能作寒熱柴胡亦能去血結不獨

和解之謂矣第三條是熱邪入而結經尚行者經行則熱亦行而不得留故必自愈無犯胃氣及上二焦病

在血而不在氣在下而不在上也若誅伐無過變證隨出焉能自愈也沈再平曰今人治瘧必用此湯若

非此湯即不足以為治者故治輟轉淹滯變生不測竟能殞命則知瘧本非死證惟概以柴胡治瘧者殺之

也夫柴胡為少陽表藥若其瘧果發於少陽而以柴胡治之無不立愈若係他經用之則必使他經之邪輟

轉而入少陽遷延以斃乃既死猶曰柴胡為治瘧主藥吾開手即用之不知其何以死病家亦以柴胡治瘧

而竟不效真其命之當死也彼此昏迷不得一悟良可浩歎

柴半各八兩準今得六錢零八釐參草各二兩準今得二錢二分八釐棗十二枚以水一斗二升準今

得八合零四抄煮至減半去滓再煎至減半夫煎而又煎祇取四分之一其湯之濃郁甘柔可知喻氏謂和

雄按本方

雄按陳修園

力闢此方之謬然用治陰虛胃火熾盛之齒痛頗有捷效若治溫熱病地黃宜生牛膝宜刪葉氏引用決不

泥守成方近讀景岳發揮果與陳氏之論印合

四八四物湯

生地

當歸

芍藥

四物為陰血受病之專藥非調補真陰之藥也汪按調補真陰宜集靈膏一百十二不宜四物而人多誤

會

四九小柴胡湯

柴胡

甘草

生薑

半夏

大棗

水一斗二升煮取六升去滓

再煎取三升溫服一升日三

尤拙吾曰熱入血室三條其旨不同第一條是血全空而熱乃入者空則熱

不得聚而游其部故脅滿痛第二條是熱邪與血俱結於血室者血結亦能作寒熱柴胡亦能去血結不獨

和解之謂矣第三條是熱邪入而結經尚行者經行則熱亦行而不得留故必自愈無犯胃氣及上二焦病

在血而不在氣在下而不在上也若誅伐無過變證隨出焉能自愈也沈再平曰今人治瘧必用此湯若

非此湯即不足以為治者故治輟轉淹滯變生不測竟能殞命則知瘧本非死證惟概以柴胡治瘧者殺之

也夫柴胡為少陽表藥若其瘧果發於少陽而以柴胡治之無不立愈若係他經用之則必使他經之邪輟

轉而入少陽遷延以斃乃既死猶曰柴胡為治瘧主藥吾開手即用之不知其何以死病家亦以柴胡治瘧

而竟不效真其命之當死也彼此昏迷不得一悟良可浩歎

柴半各八兩準今得六錢零八釐參草各二兩準今得二錢二分八釐棗十二枚以水一斗二升準今

得八合零四抄煮至減半去滓再煎至減半夫煎而又煎祇取四分之一其湯之濃郁甘柔可知喻氏謂和

雄按本方

雄按陳修園

力闢此方之謬然用治陰虛胃火熾盛之齒痛頗有捷效若治溫熱病地黃宜生牛膝宜刪葉氏引用決不

泥守成方近讀景岳發揮果與陳氏之論印合

四八四物湯

生地

當歸

芍藥

四物為陰血受病之專藥非調補真陰之藥也汪按調補真陰宜集靈膏一百十二不宜四物而人多誤

會

四九小柴胡湯

柴胡

甘草

生薑

半夏

大棗

水一斗二升煮取六升去滓

再煎取三升溫服一升日三

尤拙吾曰熱入血室三條其旨不同第一條是血全空而熱乃入者空則熱

不得聚而游其部故脅滿痛第二條是熱邪與血俱結於血室者血結亦能作寒熱柴胡亦能去血結不獨

和解之謂矣第三條是熱邪入而結經尚行者經行則熱亦行而不得留故必自愈無犯胃氣及上二焦病

在血而不在氣在下而不在上也若誅伐無過變證隨出焉能自愈也沈再平曰今人治瘧必用此湯若

非此湯即不足以為治者故治輟轉淹滯變生不測竟能殞命則知瘧本非死證惟概以柴胡治瘧者殺之

也夫柴胡為少陽表藥若其瘧果發於少陽而以柴胡治之無不立愈若係他經用之則必使他經之邪輟

轉而入少陽遷延以斃乃既死猶曰柴胡為治瘧主藥吾開手即用之不知其何以死病家亦以柴胡治瘧

而竟不效真其命之當死也彼此昏迷不得一悟良可浩歎

柴半各八兩準今得六錢零八釐參草各二兩準今得二錢二分八釐棗十二枚以水一斗二升準今

得八合零四抄煮至減半去滓再煎至減半夫煎而又煎祇取四分之一其湯之濃郁甘柔可知喻氏謂和

雄按本方

雄按陳修園

力闢此方之謬然用治陰虛胃火熾盛之齒痛頗有捷效若治溫熱病地黃宜生牛膝宜刪葉氏引用決不

泥守成方近讀景岳發揮果與陳氏之論印合

四八四物湯

生地

當歸

芍藥

四物為陰血受病之專藥非調補真陰之藥也汪按調補真陰宜集靈膏一百十二不宜四物而人多誤

會

四九小柴胡湯

柴胡

甘草

生薑

半夏

大棗

水一斗二升煮取六升去滓

再煎取三升溫服一升日三

尤拙吾曰熱入血室三條其旨不同第一條是血全空而熱乃入者空則熱

不得聚而游其部故脅滿痛第二條是熱邪與血俱結於血室者血結亦能作寒熱柴胡亦能去血結不獨

和解之謂矣第三條是熱邪入而結經尚行者經行則熱亦行而不得留故必自愈無犯胃氣及上二焦病

在血而不在氣在下而不在上也若誅伐無過變證隨出焉能自愈也沈再平曰今人治瘧必用此湯若

非此湯即不足以為治者故治輟轉淹滯變生不測竟能殞命則知瘧本非死證惟概以柴胡治瘧者殺之

也夫柴胡為少陽表藥若其瘧果發於少陽而以柴胡治之無不立愈若係他經用之則必使他經之邪輟

轉而入少陽遷延以斃乃既死猶曰柴胡為治瘧主藥吾開手即用之不知其何以死病家亦以柴胡治瘧

而竟不效真其命之當死也彼此昏迷不得一悟良可浩歎

柴半各八兩準今得六錢零八釐參草各二兩準今得二錢二分八釐棗十二枚以水一斗二升準今

得八合零四抄煮至減半去滓再煎至減半夫煎而又煎祇取四分之一其湯之濃郁甘柔可知喻氏謂和

雄按本方

雄按陳修園

力闢此方之謬然用治陰虛胃火熾盛之齒痛頗有捷效若治溫熱病地黃宜生牛膝宜刪葉氏引用決不

泥守成方近讀景岳發揮果與陳氏之論印合

四八四物湯

生地

當歸

芍藥

四物為陰血受病之專藥非調補真陰之藥也汪按調補真陰宜集靈膏一百十二不宜四物而人多誤

會

四九小柴胡湯

柴胡

甘草

生薑

半夏

大棗

水一斗二升煮取六升去滓

再煎取三升溫服一升日三

尤拙吾曰熱入血室三條其旨不同第一條是血全空而熱乃入者空則熱

不得聚而游其部故脅滿痛第二條是熱邪與血俱結於血室者血結亦能作寒熱柴胡亦能去血結不獨

和解之謂矣第三條是熱邪入而結經尚行者經行則熱亦行而不得留故必自愈無犯胃氣及上二焦病

在血而不在氣在下而不在上也若誅伐無過變證隨出焉能自愈也沈再平曰今人治瘧必用此湯若

非此湯即不足以為治者故治輟轉淹滯變生不測竟能殞命則知瘧本非死證惟概以柴胡治瘧者殺之

也夫柴胡為少陽表藥若其瘧果發於少陽而以柴胡治之無不立愈若係他經用之則必使他經之邪輟

轉而入少陽遷延以斃乃既死猶曰柴胡為治瘧主藥吾開手即用之不知其何以死病家亦以柴胡治瘧

而竟不效真其命之當死也彼此昏迷不得一悟良可浩歎

藥取其各藥氣味之相合和。余謂和者取其氣緩味厚。斯為補正託邪之劑。故惟風寒正瘧邪在少陽者可
以按法而投。則參甘薑棗補胃充營。半夏利其樞。柴苓解其熱。病無不愈矣。猶之今人於瘧發之先。飽飲
肉酒飯亦能取效。汪按瘧疾寒來之時。強食過飽。往往一蓋風寒自表而受。胃腑空虛。自能安穩。治必先
寒不能復熱而反。吾見甚多。不可不戒。蓋風寒自表而受。胃腑空虛。自能安穩。治必先
中氣託邪外出。即禦外邪杜其內入。誠一舉兩全之策也。若溫熱暑濕諸瘧。邪從口鼻而受。肺胃之氣先
窒滯。病發即不飢。忌穀脫悶苔黃。苟不分別。但執此湯奉為聖法。則參甘薑棗溫助助邪。驟則夜困神昏。緩
則邪留結痞。且有耗傷陰血而成瘧勞者。即不用全方。而專以柴胡為瘧瘧主藥。亦為營陰充。或溫熱暑
淫之邪。本不甚重。及兼感風寒之表邪者。始可見功。汪按治正瘧必宜此湯。溫暑亦有正瘧。不獨風寒可用。
裏藥亦非以治表邪。但常辨其是否正瘧耳。若以瘧非瘧。妄用平見之藥。矣。故倪涵初所定三方。亦愈病者
長熱不退。或兩耳大痛。甚至神昏更或引動肝風。痲瘋立至。生用柴胡。必提成。故倪涵初所定三方。亦愈病者
稀。而加病者多也。汪按瘧疾強止。變成痲瘋者。終身誤人。而不自知其誤。告之不信也。世人凡患瘧不究病因
輒以薑棗湯灌之。其弊類此。羊肉亦然。凡屬時瘧。雖愈後亦忌食。食則必復。此時瘧之所以異於正瘧也。可
不察哉。

五十桂枝紅花湯

傷寒桂枝湯加紅花

原方桂枝芍藥生薑各三兩
甘草炙二兩大棗十二枚

五十二葱豉湯

葱白欸香豉合

水煎入童子小便一合。日三服。

雄按葱根桑葉骨石炭
變之類皆可隨證佐用

張路玉曰。本方藥

味雖輕。功效最著。凡虛人風熱伏氣發溫及產後感冒。靡不隨手獲效。尤拙吾曰。溫邪之發。陰必先傷。設

有當行解散者。必兼滋陰之品於其中。昔人於葱豉湯內加童便。於梔豉湯中加地黃麥冬。亦此意也。雄按

法減古

華岫雲曰。在內之溫邪欲發。在外之新邪又加。葱豉湯最為捷徑。表分可以肅清。

鄭潤安曰。梔

子與葱白

一係泄熱。一係通陽。泄熱者縱通陽者橫縱。則能通上下之道。此所以宜於汗吐下後。表邪已解

之時。橫則能達外內之情。此所以宜於病初起。卒難辨識之際。而豆豉擅開發上焦鬱抑。宣導陰濁逗留。故

在先。在後。咸藉以奏功也。雄按葉氏春溫篇。於新邪引動伏邪。亦主是方。蓋此湯為溫熱初病。開手必用

之劑。鞠通不察。舍近而圖遠。遂為喻氏臆說所惑。以桂枝湯為初感之治。仍不能跳出傷寒圈子矣。意欲紹

之劑。鞠通不察。舍近而圖遠。遂為喻氏臆說所惑。以桂枝湯為初感之治。仍不能跳出傷寒圈子矣。意欲紹

之劑。鞠通不察。舍近而圖遠。遂為喻氏臆說所惑。以桂枝湯為初感之治。仍不能跳出傷寒圈子矣。意欲紹

述仲聖乎。則祖上之門楣不可誇為自己之閥閱也。拘守其迹。豈是心傳。尤氏云。桂枝湯為傷寒表病而裏和者設。溫病伏寒變熱。少陰之精已被剗奪。雖有新舊合邪。不可更用辛溫助熱而絕其本也。吳氏殆未之聞耶。

五十二清心涼膈散一名桔梗 即涼膈散三 去硝黃加桔梗。余氏又加生石膏。為治疫疹初起之良劑。

五十三葶藶湯 葶藶仁 薏苡仁 瓜瓣各半 桃仁五十 水一斗。先煮葶藶得五升。去滓。內諸藥煮取二升。服

一升。再服。雄按鄒氏續疏云。葶藶形如肺管。甘涼清肺。且有節之物。生於水中。能不為津液閹隔者。於津液之閹隔而生患者。尤能使之通行。薏苡色白味淡。氣涼性降。秉秋金之全體。養肺氣以肅清。凡濕熱之邪。客於肺者。非此不為功也。瓜瓣即東瓜子。東瓜子依於瓢內。瓢易潰爛。子不能絕。則其能於腐敗之中。自全生氣。即善於氣血凝敗之中。全人生氣。故善於腹內結聚諸癰。而滌膿血濁痰也。桃仁入血分而通氣。含而成劑。不僅為肺癰之妙藥。竟可療肺痺之危疴。

五十四瀉白散 桑白皮 地骨皮各一 甘草五 為粗末。每服一二錢。入粳米百粒水煎。徐回漢曰。此方能

治肺中之飲。雄按此瀉去肺熱而保定肺氣之方也。若肺不傷於熱。而傷於風寒者。誠有如鞠通所謂必將邪氣戀定。而漸成勞怯矣。故用藥必先議病也。

五十五葶藶大棗瀉肺湯 葶藶熟令黃色 大棗十二 水三升。煮棗取二升。去棗內葶藶煮取一升。頓服。

雄按外臺用葶藶杏仁各一升。大棗六十枚。合杵如膏。加蜜作丸。桐子大。桑白皮湯下。六七十丸。以大便通利為度。本事方無杏仁。有陳皮。桔梗。棗肉。九。梧子。大。每服五七丸。飲下。名棗膏丸。元戎於本方加麻黃五味子。注按此一味並用似嫌繁雜 並治痰實飲閉。而為喘脹者。余治虛弱人患實痰哮喘者。用葶藶炒黃煎湯去滓。以湯

煮大棗食之。亦變峻劑。為緩劑之一法也。

五十六竹葉石膏湯 竹葉生 石膏一斤 半夏半斤 人參三 甘草二 麥門冬各一斤 粳米半升 雄按陳修園云。傷寒

汗吐下之後。亡其津液。故取甘涼以救其陰也。水一斗。先煮六味。取六升。去滓。內粳米煮米熟湯成。去米溫服一升。日三。服此