

瘍醫大全



湯醫人全目錄

卷三十二

痘疹部

論發熱三朝生死訣

論報痘三朝生死訣

論起脹三朝生死訣

論灌漿三朝生死訣

論結靨三朝生死訣

邵公治痘秘訣



順險逆三法說

榮衛論

馮氏誠求心法

論時日氣血循行畧

七日五傳

五臟胎毒所發

五善七惡

論瘡不可妄汗妄下及宜微汗微下症

形質拘



南京中醫藥大學圖書館藏

禁忌

雜症勿治

忌食毒物

論避穢氣

論痘觸變歌

樣痘辨

論痘疹癰子膿泡先後順逆

賊痘門主論



悶痘門主論

痘瘡夾癰門主論

痘瘡發泡門主論

痘症瘡啞作瘡門主論

痘症寒戰咬牙門主論

痘瘡驚搐門主論

痘瘡癢痛門主論

痘瘡倒靨門主論

痘瘡外靨門主論



蘇

論服藥法

看水痘法



南京中醫藥大學圖書館藏

瘍醫大全卷三十一

燕湖顧世澄練江氏纂輯

增錢之栢東陽

男

櫟燮用和

全校

痘疹部

自痘疹發熱報痘起脹灌漿結靨諸症秘法皆彙於
此部中以便檢閱衆治





南京中医药大学图书馆版权所有

論發熱三朝生死訣

聶九吾曰發熱之初若身熱和緩或熱或退神清氣爽飲食如常則不必用藥發汗但戒暈禁風調護而已蓋痘有順而不必治者不輕治即所以調治之也

其或增寒壯熱頭疼發熱頭痛欬嗽鼻流清涕者多

因於外感不可不發散也當視兒強弱而用藥發

汗兒體氣素壯實者加味升麻葛根湯汗之白葛根升

麻赤芍甘草桔梗防風蘇葉小川芎山查淨肉牛蒡子煎服此方即是傷感而非痘疹服之發汗亦



無妨體氣素怯弱者用加味參蘇飲汗之

人參蘇葉
桔梗前胡

小川芎山查肉粉葛陳皮然皆不可出汗太多惡

製半夏牛蒡子甘草煎服發虛其表後難起脹灌漿也既經發汗而身熱漸

緩兒頗安靜者其痘出必稀少此為順候且勿服

藥以待之亦有發熱和緩後痘多者血氣虛也

發汗之後或身熱不退而煩躁者且勿峻攻姑少待

之其或煩悶躁渴而妄語者用敗毒和中散清之

連翹陳枳殼防風升麻前胡小川芎麥門冬桔梗

蟬蛻牛蒡子荆芥木通甘草紫草茸酒炒黃連大

便秘澁者加酒炒大黃一錢二分微利之不秘者
勿加入服此覺煩悶少解即止勿服聽其痘出外

則中自
安也

或有腹痛腰痛而煩悶者此其毒氣誠重然以蒿明
敗毒和中散主之大便秘則加酒炒大黃微利之
聽其痘毒出外則內痛自止

然後看其痘或稠密或紅紫帶黑又議解毒可也切
不可純用寒涼以阻遏其毒出之勢立致內攻告
變涼藥要製過則性純而有效世人不知此理多純用寒涼解
毒或用硝黃峻下因而速斃而卒不悟者多矣

當時令衆姓出痘時小兒或有發熱稍緩其熱或作



或止其紅點或未見或微見而未明或是出痘或
非出痘正在疑似之間當此之時不如且勿服藥
以待其自定但禁風寒葷調護之而已所謂不輕
治正所以深治之者此也有等富貴之家矜愛女
過見其如此屢投以清涼解毒之劑不知若是痘
症則其毒氣發動於五臟勃勃欲出外其勢決不
可阻遏屢用清涼阻遏其勢卽所以迫之內攻而
禍速矣故犯此者多有報痘數日卽煩悶驚搐而
死此解毒之劑殺之也正如寇在宮牆之內不逐



之出外反遇其出路圍而攻之宮中之人有不遭
殘害者乎然醫曰吾用解毒藥何至於殺人既不
自任其咎病家亦曰彼用解毒藥何至於殺吾人
亦不歸咎於醫殺人於冥冥之中而已不悟也人
不知也噫亦可悲也已予故表而出之以戒世之
愛而反害者語曰久暗者毒必厚痘毒稟於胎元
伏於五臟其輕者無論已其重者深藏久蓄不爲
不厚矣一旦觸發於倏然忽然之頃其勢猛銳欲
出斷不可禦是以必藉氣血載毒出外成漿結痂

然後毒散而功成此病機亦化機也此豈若諸瘡
之毒可以驟然而解散者故解之於既出之後是
順其欲散之勢猶爲近理解之於未出之先是遏
其猛銳欲出之勢其禍甚速如初決之堤水勢排
山而欲捧土塞之有是理乎奈何自古治痘之家
其卑者固不足道其高者亦未深悟此理每每於
痘瘡發熱之初欲出未出之際輒以解毒爲主且
曰服某藥則毒可解而痘必出稀不知痘之稀由
其初受毒之輕耳豈將出之時所能驟解乎致啟



後之庸醫訛以承訛見痘瘡欲出未出之間
熾盛則多用寒涼以解之或妄下以解之
爲對症之妙劑而不知反致內攻之奇禍
至於殺人而終不悟前覆而後不鑒其禍
又無窮也予親近時庸醫治痘多犯此失
以致童幼數日而死者甚多則皆茫然委
於症惡難救而舉世莫覺其致死之由殊
可矜惻也故不得不再三發明其理以
救將來

發熱之際有偶感風寒飲食停滯而腹痛者
用升消

平胃散 小川芎香附蒼朮紫蘗陳皮麥芽砂仁炒厚朴查肉白芷炙甘草藿香姜引煎服

劑其痛立止 然停食作腹痛與毒氣作腹痛其症不同停食痛者其痛多急疾而痛者痛稍延緩而有作有止多在臍以下或連腹

必甚多在臍以上痛而必青白唇淡手足冷毒氣而痛面或紅色而唇紫手足不冷此兩者必分辨明白方可用藥

發熱之際有嘔吐者有泄瀉者有吐瀉交作者全要

辨虛實寒熱而用藥 如吐瀉交作而胸腹痛甚

者此感寒而停食也 仍用升消平胃散主之一服立效 如胃氣弱

而有寒嘔吐不思飲食或食下即吐其吐多順快

而無聲面青白唇淡精神倦怠宜用參砂和胃散

而無聲面青白唇淡精神倦怠宜用參砂和胃散



主之

人參砂仁半夏白朮白茯苓藿香陳皮炙草去皮煨姜三片煎服

如

弱飲食不化而泄瀉者其泄滑利而色帶白宜用

木苓調脾散主之

白朮白茯苓神曲炙草扁豆砂仁香附厚朴或加木參

姜大棗全煎服

如有毒氣作吐瀉者其吐必酸刺而有

神氣不甚困倦其泄必黃色臭穢或吐泄交作

胸腹多不痛此則毒氣由吐泄而發洩所謂吐泄

為順候而不必止者惟此一症耳若虛寒吐泄與

此迥異者亦多矣

張潔古等乃一槩謂痘前吐瀉慎勿亂治而多吉並不分虛實

寒熱何其孟浪之甚耶

