

S2942/46-2

1760

1P12

大字
足本
陳修園醫書四十八種

三星書店發行

有中醫藥學委會書簽

新編 11-187 $\frac{12}{24}$



南京中醫藥大學圖書館版權所有

附方

外臺防己黃耆湯

方見風濕

治風水脈浮為在表其人或頭汗出表無他病病者但下重從腰以

上為和以下當腫及陰難以屈伸

金匱方歌括卷五

黃痺病方

茵陳蒿湯

歌見傷寒

治穀瘴寒熱不食食即頭眩心胸不安久久發黃此湯主之

男

元厚按本

陰濕土也陽明燥土也經云穀入於胃游溢精氣其上輸下轉藉脾氣之能也穀瘴者穀入胃脾氣不輸濕與熱併久則薰蒸成黃黃成則榮衛流行之機為之阻而不利故有寒熱不食之病經云食入於陰長氣於陽食即頭眩心胸不安者穀入於胃挾濁氣以上干也主以茵陳蒿湯者茵陳稟冬令寒水之氣寒能勝熱佐以枝子味苦瀉火色黃入胃挾大黃以滌胃腸之鬱熱使之屈曲下行則穀瘴之邪悉從二便而解矣

硝石礬石散

治黃家日晡所發熱而反惡寒此為女勞得之膀胱急少腹滿身盡黃額上黑

主之

硝石

熱黃

礬石

燒等分

右二味為散大麥粥汁和服方寸匕日三服病隨大小便

去小便正黃大便正黑是其候也

身黃額黑

漸及一身之黃俱黑

足如烘腹脹

如水

便澹

晡熱

晡熱以中屬時昡西屬腎也

等分凡硝和麥汁女勞瘴病奪天工

徐忠可云硝能散虛鬱之熱

為體輕脫而寒不傷脾。養能却水而所到之處邪不復侵如紙既蒸即不受水滲也以大麥粥調服益土以勝水合而用之則散鬱熱解腎毒其於氣血陰陽汗下補瀉等法毫不相涉所以為佳

梔子大黃湯

治酒瘴心中懊懣或熱痛者此湯主之

梔子

十四枚

大黃

二兩

枳實

五枚

豉

一升

右四味以水六升煮取二升分溫三服

歌酒瘴懊懣鬱熱蒸大黃二兩豉盈升梔

子十四枳枝五上下分消要順承

元犀按梔子豉徹熱於上枳實大黃除寔去滿於下

此所謂上下分消順承熱氣也徐忠可云因酒徒陰分大傷故不用燥藥以耗其津亦不

用滲藥以竭其液謂熱散則濕不能留也凡治濕熱而煎燥者於可此悟

桂枝加黃耆湯

歌見水氣病中

治黃瘴病但當利其小便假令脈浮者當以汗解之宜此湯主之

男元犀

按黃瘴病多由濕熱內鬱而成為病在內也鬱在內者宜內解故曰但當利其小便

小便通則所鬱皆去矣假令脈浮者病在肌表也當外解故曰當以汗解之桂枝湯解肌發

表加黃芪助之以黃芪有發汗退黃之專長也

猪膏髮煎

治諸黃瘴病

猪膏

半斤

亂髮

如雞子大三枚

右二味和膏中煎之髮消藥成分再

服病從小便出

千金云太醫拔尉史脫家婢黃病服此胃中燥糞下便差神驗

歌諸黃腹鼓大便堅古有猪膏八兩傳亂

髮三枚雞子大髮消藥熟始停煎

男元犀

按猪膏主潤燥髮灰主通小便故神農本草經

有自還神化句最妙謂髮為血餘乃水精奉心化血所生今取以煉服仍能入至陰之臟助

水精以上奉心藏之神以化其血也沈自南謂寒濕入於血分久而生熱鬱蒸氣血不利証顯津枯血燥皮膚黃而暗晦即為陰黃當以此治之且熱鬱既久陰血無有不傷治者皆宜兼滋其陰故曰諸黃主之又按時醫惑於以人補人之說每遇虛証輒以紫河車配藥金幼時隨侍聞家君與客常談及紫河車一物曰某也服此今反肌肉羸瘦某也服此病反增劇吾行道數十年見有用紫河車者未嘗一效余默識之今省中行道輩遇病人家有餘貴或病症虛弱火熾等証即曰非紫河車不能成功也嗚呼是醫也而能活人乎

茵陳五苓散

治黃瘴病

茵陳 十分

五苓散

五分

右二味和先食飲服方寸匕日三服

瘴病傳來兩解方

表裏二解

茵陳末八五苓散五苓五分專行水十分茵陳却退黃

男元犀

按五苓散功專發汗利水助脾轉輸茵陳蒿功專治濕退黃合五苓散為解鬱利濕之用也蓋黃瘴病由濕熱瘀鬱薰蒸成黃非茵陳蒿推陳致新不足以除熱退黃非五苓散轉輸利濕不足以發汗行水二者之用取其表裏兩解為治黃之良劑也

大黃硝石湯

治黃瘴腹滿小便不利而赤自汗出此為表和裏實當下之宜此湯

大黃

黃蘗

硝石

各四兩

梔子

十五枚

右四味以水六升煮取二升去滓內硝更煮取一升頓服

男元犀

瘴病

表裏

尿難

大便

腹滿時表和裏實貴隨宜硝黃四兩藥同數十五枚梔任指麾

男元犀

元犀

按黃瘴病濕熱交鬱不得外通今自汗出者外已通也腹滿小便不利而赤者濕熱仍

寔於裏也寔者當下故用大黃除滿去寔硝石領熱氣下趨二便又以黃蘗除濕退黃梔子散熱解鬱濕熱散二便調則裏氣亦和矣

小半夏湯

歌見痰飲

治黃痺病小便色不變欲自利腹滿而喘不可除熱熱除必噦噦者此湯主

之

元犀

按傷寒論云痰熱在裏身必發黃此云小便色不變欲自利者可知內無痰熱矣

蓋喘滿屬中氣虛弱故曰不可除熱師恐後人誤投寒劑傷中故立小半夏湯以救誤治也

用半夏和胃以鎮逆生姜溫理中臟中溫則升降自如而喘滿嘔逆自愈又按若中虛發

黃者余每用理中湯真武湯等加茵陳蒿多效

小柴胡湯

歌見傷寒

治諸黃腹滿而嘔者宜此湯主之

男

元犀

按嘔者胃氣不和也腹痛者木

邪犯胃也小柴胡湯達木鬱和胃氣使中樞運則嘔痛止而黃退矣非小柴胡湯可概治諸

黃也

小建中湯

歌見傷寒

治男子黃小便自利當與虛勞小建中湯

男

蔚按此言土虛而現出黃

色也虛極者宜補土之母四逆輩可與間服然單言男子謂婦人血瘀發黃尚有桃仁承氣

湯法也苟屬虛黃亦宜以此湯加當歸益母葉之類也

附方

瓜蒂散

歌見傷寒

治諸黃

男

元犀

按瓜蒂散傷寒論三見俱主胸中之病金匱取之附治諸黃

何也蓋黃乃濕熱相併鬱蒸不得外越用瓜蒂散吐而越之使上膈開而下竅達濕熱之邪

自有出路矣故曰治諸黃

千金麻黃醇酒湯

治黃瘡

麻黃三兩

石一味以美酒五升煮取二升半頓服盡之

用酒春日用水煮之

歌黃瘡病由鬱熱成驅邪解表仗雄兵五升酒煮麻三兩春換水兮

去酒烹

男元犀

按麻黃輕清走表乃氣分之藥主無汗表實症黃瘡病不離濕熱之邪用

麻黃醇酒湯者以黃在肌表榮衛之間非麻黃不能走肌表非美酒不能通榮衛故用酒煮

以助麻黃發汗汗出則榮衛通內而蘊之邪悉從外解耳

驚悸吐衄下血方

桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯

歌見傷寒

治火邪者此湯主之

孫男心典稟按舉火邪

冠於方首示人治血先治火也又恐治火專主寒滯之品故拈出此方不寒不滯以立榜樣

意深哉傷寒論註解甚詳不必再釋

半夏麻黃丸

治心下悸者此丸主之

半夏

麻黃各等分

右二味末之煉蜜為丸小豆

大飲服三丸日三服

歌心下悸都緣飲氣維夏麻等分蜜丸醫一升一降存其意神化原

來不可知尤在淫云半夏蠲飲氣麻黃發陽氣妙在作丸與服緩以圖之則麻黃之辛甘

不能發越津氣而但能引引陽氣即半夏之苦辛亦不特觸除飲氣而並和養中氣非仲景

神明善變者其孰能與於此哉

栝葉湯治吐血不止者此湯主之

栝葉

乾姜

各三兩艾三把

右三味以水五升取馬

通汁一升合煮取一升分溫再服千金加阿膠三兩亦佳歌吐血頻頻不肯休久吐不止

切寒溫補瀉之藥服之殆盡矣馬通升許溯源流熱氣伏藏於陰分通血妄行不止乾姜三兩艾三把溫之

宣發其熱使行陽分則陰分拍業行陰三兩求拍業抑之使降合馬通導之前方歌括之

之血無所逼而守其經矣小註頗詳毋庸再釋但愚每用前方病家皆驚疑不能聽今擬加減法用生側柏五錢乾姜

炮透一錢五分生艾葉三錢水一杯半馬通一杯煎八分服如無馬通以童便代之馬驚

用水化開以布濾汁澄清為馬通水

黃土湯 治下血先便後血此遠血也亦主吐衄 甘草 乾地黄 白朮 附子 炮阿膠

黃芩各三兩竈中黃土半斤 右七味水八升煮取三升分溫二服歌遠血先便血續來半

斤黃土莫徘徊朮膠附地芩甘草三兩同行血證該不惟治下血而吐血衄血與婦人血崩等症俱該在內王晉三

云金匱以下血先血後便為近血明指脾絡受傷日滲腸間瘀積於下故大便未行而血先

下主之以赤小豆利水散瘀當歸和脾止血若先血後便為遠血明指肝經別絡之血因脾

虛陽陷生濕血亦就濕而下行主之以竈心黃土溫燥而去寒濕佐以生地阿膠黃芩入肝

以治血熱白朮甘草附子扶陽補脾以治本虛近血內瘀專力精利遠血因虛故兼溫補治

出天淵須明辨 按此方以竈心黃土易赤石脂一斤附子易炮姜二兩炮紫更妙或加側

柏葉四兩絡熱加鮮竹茹半斤

赤小豆散歌見 治下血先血後便此近血也此主之 男元犀 按肝為血海氣通胞中主宣

布之權虛則失其權矣曰先血後便者肝失其統不能下宣致胞中之血滲入肛門也近血者胃接二腸胞與腸前後此之最近也若胃腸受濕熱致傷其氣必通於胞中而迫血妄行赤小豆入心清熱解臟毒當歸入肝補虛散鬱能宣其血入於經隧也

瀉心湯 治心氣不足吐血衄血者此湯主之 大黃二兩 黃連 黃芩各一

水三升煮取一升頓服之 嘔火熱上攻心氣傷 即心氣不足 清濁二道血洋洋 火迫血從清濁道出則為衄血

清道出則為衄血 大黃二兩 芩連一釜下抽薪請細詳 蔚 按火邪盛而迫血則錯經妄行血為心

液血傷無以養心致心陰之氣不足也故曰心氣不足非心陽之氣不足也用芩連苦寒之

品入心清火以培心氣大黃去瘀生新此一補一瀉之法也

嘔吐噦下利方

吳茱萸湯 歌見傷寒 治嘔而胸滿者 又主乾嘔吐涎沫頭痛者 受業林 禮豐 按胸為陽位曠

若太空嘔而胸滿者陰邪佔居陽位也故重用生姜吳萸之大辛大溫以通胸中之陽以破

陰霾之氣佐以人參大棗之一陰一陽以建脾胃之氣以鎮逆上之陰使陽光普照而陰翳

自消有何乾嘔胸滿吐涎沫之患哉

半夏瀉心湯 歌見傷寒 治嘔而腸鳴心下痞者此湯主之 長男 蔚 按嘔而腸鳴並無下利心

下痞不因誤下何以上下之阻隔若是蓋因飲停心下上逆為嘔下干為腸鳴飲不除則痞

不消欲蠲飲必資中氣方中參棗草以培中氣藉半夏之降逆佐芩連以消痞復得乾姜之



溫散使痞者通逆者降矣妙在去滓再煎取其輕清上浮以成化痞降逆之用耳

黃芩加半夏生薑湯

歌見傷寒

治乾嘔而利者此湯主之

男

元犀

按太陽主開少陽主振乾嘔

者少陽之邪欲從太陽之開而外出也下利者太陽之邪不能從樞外出而反從樞內陷也
用黃芩加半夏生薑湯者轉少陽之樞達太陽之氣交上下清裏熱而姜夏又能止嘔降逆
也此即小柴胡湯去柴胡人參加芍藥去之者恐其助飲而增嘔加之者取其和胃而降逆
伊聖之方鬼神莫測也

小半夏湯

治諸嘔吐穀不得下者此湯主之

犀

按胃主納穀穀不得下者胃氣虛寒也嘔

吐者飲隨寒氣上逆也胃虛飲逆非溫不能散其寒非辛不能降其逆用半夏滌飲降逆生
姜溫中散寒使胃氣溫和而嘔吐自平

豬苓散

治嘔吐而病在膈上後思水者解急與之思水者此散主之

豬苓

茯苓

白

分各等

右三味杵為散飲服方寸匕日三服

歌嘔餘思水與之佳

少與之餘以救其夜

過與須防

飲氣乘

恐舊飲方去新飲復來

豬朮茯苓等分搗

藥土以逢水不使支飲阻其正津則不渴

飲調寸匕和自諧

四逆湯

歌見傷寒

治嘔而脈弱小便復利身有微熱見厥者難治此湯主之

男

元犀

按嘔與熱

為陰邪所迫小便利與見厥証屬無陽脈弱者真臟虛寒也用四逆湯徹上下之陰邪招欲
散之殘陽引氣血接回其厥外溫經內溫臟面面俱到

小柴胡湯

歌見傷寒

治嘔而發熱者此湯主之

男

蔚

按嘔而發熱者少陽表症也表未解則內

不和故作嘔也。陽明主肌肉。木邪忤土。故作肌熱而嘔。用小柴胡湯轉樞以出其邪。邪散則熱退而嘔止矣。

大半夏湯 治胃反嘔吐者。此湯主之。

半夏二升 人參三兩 白蜜一升

右三味水六斗

二升。和蜜揚之二百四十遍。煮藥取二升半。溫服一升餘。分再服。

歌從來胃反責之衝止

乘半夏二升。蜜一升。三兩人參。勞水煮。

水揚二百四十遍名勞水又名甘瀾水

納衝養液有奇能

元犀按此

方用水之多。取其多煮。白蜜去其寒。而用其潤。俾粘膩之性流連於胃。不速下行。而半夏參之力。可以徐徐斡旋於中。非參透造化之理者。不能悟及。余遇醫輩偶談及於此。不能再三問難。便知其庸陋欺人。則不復與談矣。膈咽之間。交通之氣。不得降者。皆衝脈上行逆氣所作也。師以半夏降衝脈之逆。即以白蜜潤陽明之燥。加人參以生既亡之津液。用甘瀾水以降逆上之水液。古聖之經方。惟師能用之。

大黃甘草湯 治食已即吐者。此湯主之。

大黃四兩 甘草二兩

右二味以水三升煮取

一升。分溫再服。

歌食方未久吐相隨

即食已兩熱衝來自不支

胃素有熱食復入之兩熱相衝不停片刻而吐出 四

兩。大黃二兩。草上從下取法神奇。

蔚

按師云。欲吐者不可下之。又云。食已即吐者。大黃甘草

湯下之。二說相反。何也。曰。病在上而欲吐。宜因而越之。若逆之使下。則憤亂矣。若既吐矣。吐

而不已。是有升無降。當逆折之。尤在湮云。雲霧出於地。而雨露降於天地。不承則天不降

矣。可見天地陰陽。同此氣機。和則俱和。乖則並乖。人與天地相參。故肺氣象天。病則多及二

陰脾胃大小腸象地病則多及上竅丹溪治小便不通吐法而開提肺氣使上竅通而下
竅亦通與大黃甘草湯之治嘔吐法雖異而理可通也

茯苓澤瀉湯 治胃反吐而渴欲飲水者此湯主之 茯苓 半升 澤瀉 四兩 甘草 桂枝各

兩 白朮 三兩 生姜 四兩 右六味以水一斗煮取三升內澤瀉再煮取二升半溫服八合日

三服 外臺治消渴脈絕胃反者有小麥一升 嘔吐方未已渴頻加 與吐後渴為欲愈者不同亦與猪苓散症

未吐而先 苓八兩 生姜四兩 誇二兩 桂甘三兩 朮澤須四兩後煎嘉 後煮澤瀉取其性補陰而利水不宜煮之太過

也 徐忠可云此方於五苓散中去猪苓者以胃反證水從吐出中無水氣而渴也加生姜

甘草者合苓朮等藥以解表裏之虛邪更能和中而止嘔也

文蛤湯 治吐後渴欲得水而貪飲者此湯主之 兼主微風脈緊頭痛 文蛤 石膏 各五兩

麻黃 甘草 生姜 各三兩 杏仁 五十粒 大棗 十二枚 右七味以水六升煮取二升溫服一升汗

出即愈 嘔吐而貪飲証宜詳文蛤石膏五兩量十二棗枚杏五十麻甘三兩等生姜 元

犀按水雖隨吐而去而熱不與水俱去故貪飲不休與思水者不同方中麻黃與石膏並用

能深入伏熱之中頃刻透出於外從汗而解熱解則渴亦解故不用止渴之品並主微風脈

緊頭痛者以風為陽邪得此涼散之劑而恰對也

半夏乾姜湯 治乾嘔吐逆吐涎沫者此散主之 半夏 乾姜 各等分 右二味杵為散取

方寸七漿水一升半煮取七合頓服之 嘔吐而乾嘔涎多 唯不胸滿不頭痛與吳茱萸湯證不同以虛有微邪邪有

高下之胃腑不責於厥陰虛寒氣不和薑夏等分磨漿水煮數方小半夏湯生相類頗分科

漿水甘酸能調中引氣止嘔

生薑半夏湯 治病入胸中似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦微心中憤憤無奈者此湯主之

半夏半升生薑汁一升右二味以水三升煮半夏取二升內生薑汁取一升半小冷分四服

日三夜一嘔止停後服歌嘔噦都非喘又非似嘔之狀不似嘔之有物似噦之有聲不徹

心情憤莫從違慎微之甚無可余何皆飲邪與寒邪搏結於胸一升薑汁半升夏分煮同煎妙入微參與吳茱萸

之降濁乾薑之溫中不同蓋彼乃虛寒上逆此乃客邪搏飲也方即小半夏湯不用生薑而

用汁者以降逆之力少散結之力多也

橘皮湯 治乾嘔噦若手足厥者此湯主之 橘皮四兩生薑半斤右二味以水七升煮

取三升溫服一升下咽即愈歌噦而乾嘔厥相隨氣逆於胸阻四肢乾嘔非胃反厥非無陽乃氣逆於胸不行

於四末故也初病未虛一服驗生薑八兩四陳皮元犀按金匱論噦與方書不同專指呃逆而

言也

橘皮竹茹湯 治噦逆者此湯主之 橘皮二斤竹茹二升大棗三十枚生薑半斤甘草五兩

人參一兩右六味以水一斗煮取三升溫服一升日三服歌噦逆因虛熱氣乘一參五

草八薑勝棗枚三十二觔橘生竹青皮即竹刮也二升元犀按淺註已詳方義不再釋金匱以

呃為噦凡呃逆證皆是寒熱錯亂二氣相搏使然故方中用生薑竹茹一寒一熱以祛之人

參橘皮。一開一闔以分之。甘草大棗。奠安中土。使中土有權。而噦逆自平矣。此伊聖經方。扁

鵲丁香柿蒂散。即從此方套出也。

四逆湯 歌解見 治下利後腹脹滿身體疼痛者。先溫其裏。乃攻其表。溫裏宜四逆湯。攻表宜

桂枝湯 傷寒 桂枝湯 歌解見

大承氣湯 歌解見 治下利三部脈皆平。按之心下堅者宜之。治下利脈遲而滑者。實也。利

未欲止。急下之。宜此湯。治下利脈反滑者。當有所去。下乃愈。宜此湯。治下利已差。至其

年月日時復發者。以病不盡故也。宜此湯。

小承氣湯 歌解見 治下利譫語者。有燥屎也。宜此湯。

桃花湯 傷寒 治下利便膿血者。宜此湯。

白頭翁湯 歌解見 治熱利下重者。宜之。

梔子豉湯 歌解見 治下利後更煩。按之心下濡者。為虛煩也。此主之。

通脈四逆湯 傷寒 治下利清穀裏寒外熱。汗出而厥。此主之。

紫參湯 治下利肺痛者。此湯主之。紫參 半斤 甘草 三兩 右二味以水五升。先煮紫參

取二升。內甘草煮取一升半。分溫三服。歌利而肺痛是何傷。濁氣上干。責胃腸。肺與大腸

八兩紫參三兩草。通因通用細推詳。腸中積聚是肺。男。按肺為華蓋諸臟之氣。皆上熏

之。推胃腸之氣下降。而不上干於肺。故肺為清肅之臟。而不受濁氣者也。夫肺與腸相表裏。



腸胃相連下利肺痛者腸胃之濁氣上干於肺也故主以紫參湯本經云紫參主治心腹寒熱積聚邪氣甘草解百毒奠中土使中土有權而肺金受益腸胃通暢而肺氣自安肺氣安則清肅之令行矣何有肺痛下利之病哉

訶黎勒散 治氣利者此散主之 訶黎勒 十枚 右一味為散粥飲和頓服 日訶黎勒

散瀉腸便氣利還須固後天十個訶黎勒煨研末調和米飲不須煎 男 元犀 按氣利者肺氣

下脫胃腸俱虛氣陷屎下急用訶黎勒瀉腸胃以固脫又用粥飲扶中以轉氣氣轉而瀉自

止耳

附方

千金翼小承氣湯 歌解見傷寒 治大便不通噦數譟語

外臺黃芩湯 治乾嘔下利者 黃芩 人參 乾姜 各三兩 桂枝 一兩 大棗 十二枚 半夏 半升

右六味以水七升煮取三升溫分三服 日乾嘔利分責二陽 太陽陽明 參苓三兩等乾姜

桂枝一兩半升夏棗十二枚轉運良男 元犀 按此即小柴胡湯變法方中以桂枝易柴胡以

乾姜易生姜去甘草是也太陽病不解併入陽明陰陽錯錯而為嘔吐下利也方用黃芩乾

姜寒溫併進使之入胃以分陰陽又以參棗安胃桂枝祛邪半夏降逆且半夏生當夏半正

陰陽交界之門取之以和陰陽和則中樞轉上下交而嘔利止矣

瘡癰腸癰浸淫病方



薏苡附子敗醬散 治腸癰之為病其身甲錯腹皮急按之濡如腫狀腹無積聚身無熱脈數

此為腸內有癰膿此散主之

薏苡仁 一錢 附子 二分 敗醬 五分

右三味杵為散取方

寸七以水二升煎減半頓服小便當下

歌氣血凝內癰阻外膚

氣血為內癰所奪不榮於外其身甲錯如蟬之

也交錯腹皮雖急按之濡附宜二分苡仁十敗醬還須五分驅 王晉三云心氣抑鬱不舒則

氣結於小腸之頭但傳道之去路而為癰腫即內經所謂臟不容邪則還之於腑也故仲景

重用薏苡開通心氣榮養心境佐以敗醬化膿為水使以附子一開手太陽小腸之結一化

足太陽膀胱之氣務令所化之毒仍從水道而出精微之與豈庸淺者所能推測耶

大黃牡丹湯 治腫癰者少腹腫痞按之即痛如淋小便自調時時發熱自汗出復惡寒其脈

遲緊者膿未成可下之脈洪數者膿已成不可下也此湯主之

大黃 四兩 牡丹 一兩 桃

仁 五十個 冬瓜仁 半升 芒硝 三合

右五味以水六升煮取一升去滓內芒硝再煎數沸頓服

之有膿當下如無膿當下血

歌腫居少腹

按之即痛如淋小便自調時時發熱自汗出復惡寒

下腸癰黃四牡丹一

兩從冬瓜子仁半升桃五十芒硝三合泄腸膿 王晉三云肺與大腸相表裏大腸癰者肺

氣下結於大腸之頭其道遠於上其位近於下治在下者因而奪之也故重用大黃芒硝開

大腸之結桃仁丹皮下將敗之血至於清肺潤腸不過瓜子一味而已服之當下血下未化

膿之血也若膿已成形肉已壞又當先用排膿散及湯故原文云膿已成不可下也

王不留行散 治金瘡病

王不留行

十分八月

胡蘆細葉

十分七月

甘草

十八桑東南根

右九味王不留行胡藿

十分明芩朴芍姜均二分三分

弛治之者必使經脈復行營衛

按金刃傷處封固不密中於風

則倉卒無汁。中於水則出青黃汁。風則發瘰。水則濕爛成瘡。王不留行疾行脈絡之血。灌漑

周身不使其湍激於傷處。桑根皮泄肌肉之風水。蒴藋葉釋名接骨草。滲筋骨之風水。三者

皆燒灰。欲其入血去邪止血也。川椒祛瘡口之風。厚樸燥刀痕之濕。黃連退肌熱。芍藥散惡

血乾姜和陽甘草和陰用以為君者欲其入血退腫生肌也風濕去陰陽和瘡口收肌肉生

此治金瘡之大要

右三味杵為散取雞子黃一枚以藥散與雞黃

枳實為君十六

按枳桔行氣滯芍藥通血滯從氣血以排之

人所易知也。妙在揉入雞子黃一抔。取有情之物。以養心脾之陰。則排之之法。獨得其本也。

右四味以水三升煮取一升溫服五

排膿湯與散懸殊一兩生姜二草俱大棗十枚桔三兩通行營衛是良圖

元犀按方中取桔梗生薑之辛又取大棗甘草之甘辛甘發散為陽令毒從化而出排之之妙也

黃連粉

方未見

治浸淫瘡從口起流向四肢者可治從四肢流來入口者不可治浸淫瘡此粉

主之

歌

浸淫瘡約未黃連從口流肢順自然若起四肢流入口半生常苦毒牽纏元犀

按浸淫瘡係傳染之疾也從口起流向四肢者毒氣外出也故曰可治從四肢起流入來口者毒氣由外入內固結於臟腑之間故曰不可治黃連粉方未見疑即黃連一味為末或敷或服隨宜擇用

金匱方歌括卷六

跌蹶手指臂腫轉筋狐疝蛇蟲方

藜蘆甘草湯

方未見

治病人常以手指臂腫動此人身體瞶瞶此湯主之

歌體瞶臂腫主藜

蘆癰瘰癧風痰俱可驅

蘆性提升甘草甘緩症詳跌蹶遍尋無

男元犀

按痰涎為濕氣所生留

滯胸膈之間久則變生無定云病人常以手指臂腫動身體瞶瞶者是氣被痰阻濕無去路

或加邪風風行氣亦行引動積痰毒氣此所以羣動併發擾亂心君不甯也手足項背牽引

痛掣走易不定者心君之令不行肺無以傳其治節也藜蘆性毒以毒攻毒吐久積風痰殺

蟲通支節除癰也助瘳用甘草者取甘潤之意以其能解百毒也方雖未見其意不過是耳

雞屎白散

治轉筋病其人臂脚直脈上下行微弦轉入筋腹者此散主之

雞屎白為散取