

胎產心法卷之中

脈訣歌

欲產之婦脈離經。一息六至一息三至皆曰離經。沉細而滑也。同者。無脈。又云。脈如歇止亦謂之離經。晚來朝日午定當生。身重體熱寒又頻舌下見脈黑且青。捲舌流涎腹覺冷。腹中子女已歸陰面赤舌青細尋看。母活子死是定斷。唇口俱青沫又出。母子雙雙入鬼案。面青舌赤沫又頻。母死子活定知真。新產婦脈緩滑吉。實大弦急死相侵。若得沉而小者昌。忽若堅牢命不長。寸口溢疾不調死。沉細附骨不絕生。吉凶生死全憑脈。胎者須教指下明。

啟蒙曰。欲產之婦脈離經。離經之脈認分明。其來大小不調勻。或如雀啄屋漏應。腰疼腹痛眼生花。產在須臾却非病。脈經云。脈勻細易產。大浮緩氣散難產。

保產論

凡妊娠之於分娩。母子性命懸於頃刻。調理失宜。安反成危。將養有方。逆可使順。故凡胎前諸證。當隨證加減。保護調理。甫及臨月。若婦女初產。原未慣經。不免驚畏失錯。雖慣產之婦。然氣血亦傷。又安得恃為無虞也。是以保產之方。斷不可廢。故達生散宜用於八九月之時。而養胎神寢等藥。當用於臨月之際。倘遇過月不產。則補血行氣之方。不可稍緩。至於居處失宜。頻摸動胎。及身居安逸。食物不節。憂樂不常。致胎氣難轉。或胞漿先破。惡水來多。胎乾不下。則保生千金不換萬全保氣滑胎等劑。尤宜按證選方。製服于家傳胎產金丹。不特治胎前產後為第一奇藥。即臨產服之。保生易產。且勝催生諸藥。更無產後諸患。若製此藥。備用。較勝諸藥萬萬矣。至於神效符咒。亦難謂盡妄。如受胎之後。胎殺所在。不惟損胎。甚至損母。俱宜謹慎。而臨月安產。產下藏衣。尤為緊要。不可不知。至所謂雷公招搖運兒力士。天狗等神方向。及生氣方之

宜向禍害月絕命方入床方之宜避昔人填入產圖使人知所趨避似屬太瑣若拘拘於圖又不免避此觸彼之疑不若體元子之借地法既可以避神煞又可以消俗疑因並錄之於後

達生散 孕婦八九個月時宜服數劑

人參 陳皮 紫蘇各五分 白芍酒洗 白朮土炒 當歸酒洗各一錢 炙草三分 大腹皮一錢五分

黃楊腦三個即黃楊樹葉指也 葱白三根 夏加酒炒黃芩 酒炒黃連 五味子十粒 秋加澤瀉五分

水煎服 春加防風五分 川芎五分 冬加砂仁五分 或通加炒枳殼砂仁 胎動不安加金銀箔些 野苧根錢 生地黃錢 氣

上通心加柴胡紫蘇 多怒人加炒黃芩佐之 食少者加砂仁炒神曲 口渴加去心麥

冬酒炒黃芩 能食倍加黃楊腦此味瘦胎若 有痰加薑製半夏炒黃芩 予按達生散

即紫蘇飲方去川芎加黃楊腦白朮 又一方無當歸白芍白朮

審傳達生散 孕至八九個月服之易產奇效

大腹皮三錢 黑豆洗淨 人參 紫蘇連莖 陳皮 炙草 砂仁各五分 白朮土炒 白芍酒洗 當

歸酒洗各一錢 枳殼七分 青蔥五根水煎食前服至十餘劑甚得力 予謂前達生散不及此方穩要有效但大腹皮

體輕此方用三錢似乎太過不若依前方一錢五分或加至二錢則此方更覺全美矣

養胎飲 宜與和寢丸兼用

當歸酒洗 川芎 黃芩 陳皮 白朮土炒 製香附各一錢 白芷 甘草各三分 人參七分 虛

水煎去渣調益元散服 臨產小便多者不宜加益元散

神寢丸 臨月服之易產氣盛者可服素虛者忌用

乳香一兩 透明 枳殼二兩

為末煉蜜成丸如梧子大每早溫酒送下三木丸

保生無憂散 臨產服之補其血順其氣自然易產

當歸酒

川芎

白芍

枳殼

乳香

木香

血餘

右等分每服二三錢水煎日二服神效為末服三錢亦可

其易產 又治小產瘀血腹痛 如臨產胞衣既破其血已涸或元氣困憊非此藥可治急

用八珍湯酌許水數碗煎熟時飲之亦有得生

千金不換方 一名保產無憂散

當歸酒

川芎

兔絲子

黃耆

白芍

生草

川貝母

枳殼

厚樸

生薑

熟艾

羌活

加生薑二片水二碗煎八分空心服臨產不拘時服製度分兩不可加減如臨產一二日

前覺動履不安服一劑可保無憂此方屢經試效

保氣丸 治孕婦居處失宜頻撲動胎服此寬氣進食瘦胎易產

製香附

木香

山藥

益智仁

砂仁

粉草

紫蘇葉

為末蜜煉成丸如梧子大每服二錢滾水送下

滑胎煎

胎氣臨月宜常服數劑以便易生

當歸酒 熟地 杜仲 山藥 川芎 枳殼

水二鍾煎八分食前溫服如氣體虛弱者加人參土炒白木隨宜用之如便實多滯者

加牛膝一二錢

滑胎散 臨月服之易產

人參 黃芩 紫蘇 大腹皮 白芍

陳皮 川芎 製香附 黃耆 紫蘇 大腹皮 白芍

人參 黃芩 紫蘇 大腹皮 白芍

陳皮 川芎 製香附 黃耆 紫蘇 大腹皮 白芍

黃耆 紫蘇 大腹皮 白芍

黃耆 紫蘇 大腹皮 白芍

黃耆 紫蘇 大腹皮 白芍

黃耆 紫蘇 大腹皮 白芍

黃耆 紫蘇 大腹皮 白芍

黃耆 紫蘇 大腹皮 白芍

黃耆 紫蘇 大腹皮 白芍

黃耆 紫蘇 大腹皮 白芍

黃耆 紫蘇 大腹皮 白芍

黃耆 紫蘇 大腹皮 白芍

白朮

當歸

砂仁

炙草

加薑三片。蔥頭三個。水二鍾煎八分溫服。如冬月加鉄炒枳殼一錢。尊生書云。孕婦月足臨產。八珍湯預服十數劑。最易生育。再無難產之慮。

家傳胎產金丹

治婦人經水不調諸虛百損種子安胎及胎前產後諸證應效如神。

當歸

丹皮

新艾

延胡索

川芎

益母草

白朮

青蒿

酒洗

勿見火

人參

赤石脂

白茯苓

用藥本

白朮

土炒

內熱者

白薇

香附

酒重便

桂心

沒藥

粉草

酒炒

生地

北五味

沉香

酒重便

桂心

沒藥

粉草

酒炒

錢

北五味

沉香

酒重便

桂心

沒藥

粉草

酒炒

錢

北五味

沉香

酒重便

桂心

沒藥

粉草

酒炒

錢

北五味

沉香

酒重便

桂心

沒藥

粉草

酒炒

錢

北五味

沉香

酒重便

桂心

沒藥

粉草

酒炒

錢

北五味

沉香

酒重便

桂心

沒藥

粉草

酒炒

錢

北五味

沉香

酒重便

桂心

沒藥

粉草

酒炒

錢

北五味

沉香

酒重便

桂心

沒藥

粉草

酒炒

錢

北五味

沉香

酒重便

桂心

沒藥

粉草

酒炒

錢

北五味

沉香

酒重便

桂心

沒藥

粉草

酒炒

錢

北五味

沉香

酒重便

桂心

沒藥

粉草

酒炒

錢

北五味

沉香

酒重便

桂心

沒藥

粉草

酒炒

錢

北五味

沉香

酒重便

桂心

沒藥

粉草

酒炒

錢

北五味

沉香

酒重便

桂心

沒藥

粉草

酒炒

錢

北五味

沉香

酒重便

桂心

沒藥

粉草

酒炒

一產後血暈者當歸川芎湯服一丸即醒

一產後驚風防風湯服一丸即解

一兒枕痛者山查黑砂糖服一丸即止

一胞衣不下乾薑炒黑煎湯服一丸即下

一產後虛怯者川芎當歸每日服一丸十九全愈

一凡產後諸證俱加好酒童便服皆保命護身回生起死其功不能盡述家有孕婦者宜

早備之

催生萬全湯見本卷催生門

益元散見下卷淋證門

八珍湯見上卷諸痛門

胎殺方法

正月在房床

二月在窗戶

三月在門堂

四月在竈

五月在身床

六月在床倉

七月在磨碓

八月在側戶

九月在門房

十月在床房

十一月在爐竈

十二月在房床

子丑日在中堂

寅卯辰酉日在竈

巳午日在門

戌亥日在房

未申日在籬下

房中遊神方位忌安床換帳

甲辰乙巳丙午丁未日在房內東

庚子辛丑壬寅日在房內南

癸卯日在房內北

生子宜向方

子午卯酉日宜西南

寅申巳亥日宜西北

辰戌丑未日宜東南

安產藏衣宜向方

正三五七九十一月。士日安產。丙位藏衣。其餘皆雙月甲位安產。庚位藏衣。又云藏衣忌太歲方。三殺方。宜用稍大平穩磁瓶。將衣胞內安入五種果子。如棗兒、蓮子之類。每樣數枚。宜單取再生兒之意。並將胞埋深土。以防畜類刨挖。安放平穩。令兒不驚。瓶器稍大。兒不吐乳。至於遊年白虎殺神。安產藏衣俱忌。太歲退一位即是也。如子年在亥丑年在子。餘以類推。

體元子借地法

凡孕婦臨月。擇天月二德吉日。令善書者先期齋戒三日。至日汲新水研硃於黃紙上。焚香書曰。東借十步。西借十步。南借十步。北借十步。上借十步。下借十步。壁方之中。四十餘步。安產借地。或有污穢。或有東海神王。或有西海神王。或有南海神王。或有北海神王。或有日遊將軍。白虎夫人。遠去十丈。軒轅招搖。舉高十丈。天符地軸。入地十丈。令地空闊。產婦某氏安居無所妨礙。無所畏忌。諸神擁護。百邪遠去。急急如律令。書畢貼孕婦牆壁上。則不須避忌矣。

臨產須知十四則

一孕婦似產未產。須知凡胎孕臨月。胎忽亂動而腹痛不甚。或作或止。或一二日。或三五日之後方生。名曰弄胎。不可孟浪坐草。須靜以待時。或胎水已來。腰不痠痛而不生者。亦曰弄胎。所以有瀝漿生。其漿流一二日不產。俟流漿漸少方生。倘漿來過多。恐胞乾難產。亦非所宜。須八珍時服。助其血氣。可望無慮。又有一月前忽然腹痛。狀如即產。却不產者。名曰試月。又有腹雖

痛而腰不痠痛。脈未離經而不產者。又有腹雖痛而未下。胎雖轉而兒身未正。亦非當產時也。要知腹中痛陣。乃兒破衣轉身也。氣壯者轉身自易。氣弱者轉身較難。衣薄則破速。衣厚則破遲。所以有腹痛一二日方生。凡孕婦須當覺心以待其自然之勢。切不可亂用氣力。強產以致枉命。至於自然當產之時。必有緊陣。如臍腹痛急。腰痠重痛。眼中如火。肛門逆急等類。齊至待兒身已正。頭到產門。用力一送即下。然亦有腹覺微痛。或腹竟不痛。止覺腰痠下墜而產者。蓋腎候於腰。胞繫於腎故也。古人云。時至自然分娩。譬如登廁。未急不能催。時急不能止。此理雖俗。知此免患。

一臨產自有先兆。須知凡孕婦臨產。或半月數日前。胎腹必下垂。小便多頻數。至欲產時。脈先離經。拭捏產婦手中。指中節或本節跳動。方是臨盆時候。

一轉胎調攝須知。凡孕婦兒身轉動。其腹必痛。雖遲日不生。切勿驚怕。且令人扶持在房中行。走或倚物而立。直其體腹。倘精神稍困。則以被褥壅欬脊背。仰卧少頃。又令行立。聽腹中慢慢轉身。雖遲無害。且宜稍寬裙帶。以便兒在腹中轉舒有餘地也。若不禁痛苦。或偃屈曲斜倚側靠胎中。不免為之擁擠。迷其出路。穩婆不解。此理但見生遲頻頻試水。悞傷胎破。或風入產戶而成腫脹。或胎未至而胎水先乾。分娩愈難矣。遇此者。惟令產婦勉強飲食。調其氣息。或用活血滑胎之藥佐之。活見血滑胎藥方候子逼門戶。方儘力一努。胎隨漿下矣。此乃瓜熟蒂落之理。切不可預使氣力。令精神失倦。臨期反致疲困。此產家最要緊處。曾見一婦臨產。畏痛。曲身坐卧。以致胎元轉動不順。兒出胞時。尋到產門。被母曲身遮閉。因不得出。少頃再轉。母又護痛再閉。如此兩三遭。則子無力而不能動。至於難生。人又見子不動。則謂死胎。其實子無力非死也。隨令產母正其體腹。不時行動坐立。心安氣和。勉強飲食。俟兒少停氣。復再轉至產門。果順易生下。

一穩婆宜加選擇須知凡孕婦臨產當選年高有經驗穩婆及純謹婦女一二人扶持倘誤用無知孟浪婦女收生不審察是正產與轉胎一見腹痛亂將雙手摸孕婦腹上夾腹兩邊重按欲其直下以免橫生此第一誤人性命者夫腹初痛則胞衣未破而欲破之時也兜將分娩心中亦有靈性矣見腹外揣摩兜不知為何物遽生驚恐則縮不敢動胞衣又何時而得破乎更有穩婆無知害人私用手指搗破水衣者極須防範夫胞漿乃胞內養兒之水兒既折破自隨水而下若遇時不得分娩是胞元無力轉頭較遲恐致漿盡血來閉塞道路令子無路可通胎溢不行用保生無憂散以固其血如血已耗八珍湯加益母草濃煎湯飲之倘元氣困憊急用上好人參兩許當歸二錢煎飲飲盡再煎服助其氣血最為得力捨此而用催生耗氣諸藥總無一效也或先服八珍補養氣血次煎濃葱湯令穩婆洗產戶使氣上下通暢更用酥油滑石塗產門次服催生萬全湯亦妙

一臨產避忌須知凡孕婦臨產之月不可洗頭濯足犯者胎多難產若至臨盆之際凡係門窗箱籠瓶甕之屬俱宜鬆開以及一切外來親戚並孀婦閨女喪孝尼姑與污穢不潔或月經適至或原有體氣婦女皆足以觸胎致殃俱宜防備避忌俗忌多人知覺蓋多一人入房則多一時遲延此雖俗論却有至理恐產婦心煩以致難產也

一臨產宜肅靜須知凡孕婦臨盆房中不得喧鬧即有意外緊事戶外不得叫喊倘令產母恐懼驚心則胎滯氣結不行而難產經云驚則神散憂則氣結恐則氣怯怯則上焦閉則氣還還則下焦脹氣乃不行矣此氣結不行以致難產更有產母兩尺脈絕他脈平和此乃下焦脹氣閉不行難產之脈急用紫蘇散散結行氣而產矣

一臨產飲湯須知凡孕婦分娩之時心下煩悶口渴用白蜜半盞溫湯化開飲之如欲飲水但可與清米湯飲之蓋蜜能潤燥滑胎米飲能助中氣也

後仍進飲食服藥。使其人不乏力。不乾澀。亦自立下。不必慮其吐出也。是以產母不可令其飢餓。飢則中氣虛乏。無力送胎。須少用梗白米稀粥。或飲以母雞煮汁。但不可食肉。及堅硬食物。恐礙於上焦。氣不得下。不惟難產。須防內傷。又不可太飽。常令稍飢為佳。蓋飢則氣下。氣下則產速也。予謂口渴。不能食。及吐須飲以獨參湯最妙。且能催生。

一孕婦產異。須知凡婦人常產之外。有異產者。八曰橫產。逆產。坐產。碍產。偏產。脹後產。盤腸產。浪膈產。等名。皆由孕婦氣血虧虛。或坐草擦水。用力太早所致。凡遇此等異產。須令產母仰臥。勿得驚懼。選擇歷練有經驗穩婆料理。各產治法列之於後。

如橫產。手先露者。世傳為覓鹽生。令產母安心仰臥。以鹽塗兒手心。再以香油抹其所出之手。穩婆輕輕送入。或兒手得鹽。肌肉醃蠶且痛且縮而收者。待兒轉身頭正。扶起產母。用力一努。兒即出矣。

如逆產。足先露者。相傳為踏蓮花生。令產母仰臥。不必驚憂。用鹽塗足心。亦用香油抹其所露之足。穩婆輕輕送入。候兒轉身頭正。用力生下。凡遇橫逆之產。母子存必在頃刻。若無急救之方法。何以成醫之神聖。其胎產之所以致橫逆者。或因兒身尚未轉順。方轉至手足被產母用力逼出。或因產母氣血素虧。其子無力轉身。而手足先出者。俱速用鹽塗抹油法送入。其用力逼出手足者。送入猶易。轉正勿藥亦可。若素虛無力轉身者。急煎救逆湯服之。助其氣血送入。少頃兒自有力轉身。俟頭正產門而生下矣。但兒之手足。切不可任其久出。更不可令其多出。若見兒手或足略出時。則急以鹽塗法治之。若出多及時久。則手足青硬。難以送入。而子必傷。切不可悞聽兒婦。用刀斷兒手足。一動刀刃。子必腹中亂擾。而傷母矣。世有用針刺兒手足者。有治逆產。用手抓兒足心者。予謂恐兒驚縮。有傷觸母心之虞。不若鹽塗為便也。如坐產。醫先露者。世俗為坐醫生。令產母仰臥。亦如前法抹油推入。候兒轉運扶正。然後用力。

送出或於當高處牢繫手巾一條令產母以手攀之輕輕屈足舒伸以開生路兒即順生。

如碍產乃門戶俱正兒亦露頂而不下者此必臍帶絆住兒肩俗名背包生亦令產母仰臥穩婆輕輕推兒向上以手中指輕按而肩摸去臍帶扶正兒身一努即生下。

如偏產乃生路未正被產母用力一逼兒頭偏抵產戶不下者不知者但云兒已露頂非頂也乃顛角也亦令產母仰臥輕輕推兒近上以手正其頭用力一送即下。

如脹後產乃兒頭後骨偏柱產母較道不得下者令穩婆以棉衣炙暖裹手急於較道外傍輕輕推頭令正然後用力即生下矣或用膝頭令產母抵住亦可。

如盤腸產子腸先出者世人黃不驚畏然無妨碍令產母安心仰臥急將淨盆盛溫水冬則再加稍熱加入香油養潤待兒並胞衣俱下穩婆香油塗手徐徐送入令產母兩足夾緊較道腸

自收上有用錯和冷水令人噴面一噴一收以漸收之又有神應丹貼法然此噴貼之法腸雖可收子恐誤事不若皂角末吹鼻嚏作自上又有腸被外風吹乾不收者用磨刀水少許火上

溫過以潤其腸後用好磁石煎湯一盞服之其腸自收又有兒並胞衣下後膀胱脚尿壅出產戶者同前法送入凡此子腸膀胱先出皆平日氣虛因努脫出並用力太早內臟動搖氣虛下

元不固關鍵不牢之故若此番經過須防下次此後無孕時多服地黃丸加五味子肉桂各一兩以固下元之關鍵又有孕多服胡連丸加人參以補氣又服三補丸以涼血如滑胎瘦胎等

劑不可輕服八個月時宜服八珍加訶子瞿麥桑寄生十餘劑予意須預服補中湯升提之藥於前庶臨盆可免較之服胡連三補以及粟殼等藥穩妥而不繁雜也。

如浪臍產胞衣臍腸先出者凡兒出胞時頭必轉向產門自然正產若無力轉運脚踏胞衣臍腸先出急令穩婆理清推入稍俟氣平乘勢就其脚下不可推轉久延久則臍腸復下便難收

拾矣。

一臨產雙生須知。凡孕婦臨產一兒已下。又見一兒。此係雙胞。惟穩婆自知之。只云取胞待生。下方言恐驚母成產患也。

一候胞衣生下。須知凡產母生子出戶時。人即以兩手抱產母胸前。產母亦自以手緊抱肚腹。令胎衣下墜。如胎衣來遲。切勿慌忙。用草紙燒烟熏臍。即下。如再遲。則急斷臍帶。洗兒。仍用軟帛物繫臍帶。此帶極胞繫時。尤宜輕巧牢固。然後截斷。若不斷臍帶。恐血反潮入胞中。脹而不下。攻心則傷。如穩婆諸事者。能以手指取下。甚便。取法見後。胞衣不下門。

一悶臍生。須知凡兒產下。即啼。此正理也。如兒下地。氣悶不啼。相傳寤生。呼父乳名。手拍兒腹。即啼者。此理亦未講明。蓋兒囊門有一膜。悶住兒氣。故不能出聲。拍之而膜破。而能叫哭矣。如拍之猶不破。須令女人中有輕巧者。以銀簪腳輕輕挑破。其便。或不能挑。急用棉絮煖衣。將兒緊包抱於懷內。勿令散放。未可遽斷臍帶。速用熱水浸其胞衣。寒天則置炭火中煖之。仍作大油紙撚點燈於臍帶上。往來燎之。蓋帶連兒臍久。則熱氣內鼓。其膜自破。膜破則出聲。而麤方可斷帶洗浴。亦有用蘆艾為撚香油浸潤。薰臍帶至焦。使熱氣內鼓。破膜。又一法用燈心顯門點爆數下。均治悶臍生法也。

一兒生即死。須知凡兒生下。即死者。急看兒口中前上脣有泡。以手指摘破。用帛拭血。令淨。若血入喉。即死去。血即生。其泡中白米如針嘴尖。亦須刮去。不可令其入喉也。

一凍產須知。凡孕婦臨盆時。值冬月天寒。產母經血。因冷則凝。致兒不能速下。務於房內四處設爐置火。常有煖氣。如春。且下部不可脫去棉衣。併不可坐臥冷處。使產母背身溫和。臍下腿膝間常煖。血得熱則行。兒自易生也。炭須在房外燒紅。送進產房。否則生炭氣味。恐產婦發暈。一熱產須知。凡感熱產。婦要溫涼得所。用冷水房內灑灑。或多放水盆。或遠設水塊。以解其鬱蒸之氣。若遇風涼陰雨。亦當謹避。不可貪涼。恐增疾病。房內不可人多。恐熱氣逼襲。令產母心

煩熱血沸。騰有鬱胃冲暈之患。

救逆湯 治產母氣血素虧。子無力轉。

人參兩 當歸三兩 川芎二兩 紅花三錢

水煎。速服。久之不順。再煎再服。

三補丸 專治血熱。

黃芩炒 黃連炒 黃柏炒

各等分。為末。蜜丸。白湯下。

八珍湯 見上卷諸痛門。

保產無憂散 見本卷預服易產諸方。

催生萬全湯 見本卷催生門。

紫蘇飲 見上卷安胎門。

神應丹 見本卷催生門。

六味地黃丸 見上卷諸痛門。附六味地黃湯下。

胡連丸 見上卷安胎門。

補中益氣湯 見上卷諸痛門。

難產有五因。

一凡婦人懷孕。惟賴氣血養護。時常行動。則氣血週流。胞胎活動。骨縫關節處亦常鬆動。臨產自易。如久坐久臥。氣不運行。血不流順。胎亦沈滯。而不活動。骨節亦緊而不鬆。故令難產。常見田野勞苦婦人。忽然途中腹痛。立便生產。可知一胎之所以養賴母之所嗜。因子母之氣呼吸相通。是以胎之肥瘦。在母之素日奉養厚薄。何

如耳。如母平時恣食厚味。不知節減。多致胎肥衣厚而難產。常見糟糠之婦。容易生產。可知一古者婦人有孕。即居側室。不共夫寢。恐惹火動中氣。血沸騰而消耗。胎繫胞中。全資氣血育養。一有所犯。五月以前。故多胎漏小產。五月以後。每致胞厚難生。更且漏洩。胎元子多不壽。瘕瘕毒子。疾難醫。不然。且看馬牛犬豕。胎胎易。個個存何也。蓋因馬牛犬豕。一受孕後。絕不交合。而人受孕。不能禁絕。矧有縱慾無度者乎。人畜不同。稟生則一。可不慎歟。

一凡新婦初產。神氣怯弱。未曾經慣。切不可與言產變之事。恐懷憂懼。心懸氣餒。原本易生。反成難產矣。況子尸未舒。更恐難痛。腰屈不伸。展轉傾側。撩亂多時。精神困乏。兒不得出。即中年婦人。生育既多。氣血虛少。均慮產時艱難。氣血虛少。精神困乏。俱宜獨參湯催生甚妙。餘則泰着臨產須知。併催生及交骨不開門。

一孕婦有素常虛弱。飲食減少。至臨產乏力者。或因兒未欲出。用力太早。及兒欲出。母已無力。令兒停住。產尸乾澀。產亦艱難。用催生萬全湯最妙。或獨參湯催生亦妙。有等婦人。臨產不能飲食。用人參二三錢煎湯服之。大助精力。甚於肉食百倍。

催生論

經曰。一息不運。則機絨窮。一毫不續。則霄壤判。所謂氣血周流循環。一身無有間斷也。是以姪子者。兒在腹中。母子一氣流通。全賴漿水滋養。十月數足。其子形神俱備。氣血完全。忽如夢覺。自然求路而出。兒既出胞。母子分體呼吸。息豈可久。羈於內。而使氣血不運。不續哉。所以產子。譬諸果熟蒂落。有自然分體之勢。豈可早用催藥。以逆其性。至於催藥。原為調扶失宜。致成難產。不得已而用也。如胎壯則隨漿易產。何必用藥催生。若胎弱則轉慢遲生。有致困乏。漿乾。瘀塞不下。橫逆子死。難產等類。治者滋其榮。益其氣。使子母精神接續。運行得力。溫其經。開其。瘕。使道路通暢。子易轉舒。再得老成穩婆。在外細心接取。自獲大小平安。切勿用力太早。虛費。

精神。猛劑催生。反傷血氣。更不可妄信符水。況符水非得真傳。亦未必靈驗。且血得寒則凝。血凝則胎亦滯矣。何能望其速生也。夫產育一門。全仗氣血用事。無補精神之藥焉。圖胎產之功。徒傷氣血之和。反貽產後之災。如獨參湯者。大補元氣。助精神而生津液。臨產服之。易生。再如催生萬全湯。細心周匝。補接開導。升降溫行。產際用之。催生甚為有益。產後亦備得其宜。是以名為萬全湯者矣。後開催生諸方。以備擇用。其內有治橫逆產者。當用臨產須知內手法。施治為上。但恐人又不善用手法。致產母經久困乏難生。不得不借藥力助其氣血精神。使兜轉正速生也。再溪用佛手散治死胎不下。並催生最效。捷予曾用胎產金丹催生死胎亦下。再催生湯催生甚穩而效。

獨參湯附論 催生第一方。

人參二三錢或四五錢

論曰人參固為催生之妙品。然用之不得其法。往往有失誤之處。而人不知覺也。右生產之痛陣未來。兜先必轉胎腹痛。人未明此理。以為將生之時。即煎參湯與飲。助其氣力。未免失之過早。如產母平素氣血虧虛。則有益無害。若遇壯實婦人。並非因虛難產。致提固胎氣上逼心胸。脹悶不下。反成難產矣。如生陣已來。腰痠腹痛。穀道逼迫。目中流火。適值兜正出戶。方飲參湯。且一飲而盡。豈不失之過遲。而急及產下之後。正欲逐瘀之時。其參力方銳。瘀血受補凝滯不行。勢必上行奔心等患。且有用至一二兩者。尤宜慎之。是以古人治產後非急證。不用人參。且多以芎歸合用。其意深矣。予謂臨產之時。預備上好人參四五錢。如產婦少壯。臨盆安順。亦無需參湯。以助其力。如中年產婦。有產過多。或平素瘦弱。或生產艱難。經日不下。或錯過生陣。或亂用氣力。以致氣乏力倦。及至正產之時。反無力送胎。可用人參二錢。或三錢煎服。自然易產。至於尋常生育。恐臨期艱難。預用人參二三錢煎就。用重湯溫着。俟

漿胞破時。今產婦飲兩三口。以助氣力。少停再飲二三口。頻與漫服。不過助其氣力。以催生耳。生下即已。不必多參。盡飲以招尤也。或用上好人參一枝。含口內生津助氣。亦妙。至於橫逆等生。須用前論手法施治。再服參湯以助之。蓋人參能補氣升提。使產母不至倦怠。亦能令兒生舉轉身為順。自易生矣。

催生萬全湯 附論

人參三錢至五錢大 當歸三錢大 補藥血 川芎一錢八分 以味鬱帶少寓升 桃仁十三 去皮生新碎取苦可去 乾薑一錢 溫能通行 血分炒焦 降下之藥 得少寓升 舊甘能生新滑能潤下 乾薑一錢 溫能通行 血分炒焦 降下之藥 得少寓升 下墜 牛膝稍無 聖則氣血下行 復令其下 經絡通 其色焦 炙草六分 得少寓升 紅花三分 多則破 補血少 則 肉桂 領諸藥直入血分 且溫可通行 散瘀則生 產自易

加膠棗一枚水煎食前溫服如產婦壯實及無力服人參者去參用之其催生之效尚能倍於佛手散多多矣論曰婦人臨產關係母子性命實存亡頃刻之時是以古人立方甚多然產育乃大傷氣血者也其難產又多由氣血不足產後諸疾固屬氣血大耗然產後諸虛皆因產前所致奈佛手散免腦元及葵花益母諸方無非活血順氣滑胎破瘀溫煖通竅以圖運行推出之勢全不管運行推出之源產婦精力壯者藉此開導得以易生倘氣血不足則雖有催生開導之功而無運行藥勢之力抑何補哉至於手握石燕足貼草麻設遇實證順證假此安心候時如當氣血精神虧極用此數行之方神氣內竭勢如隔靴搔癢不調氣血而強用催生何以為運行之具徒存虛名而無實效誤人性命於頃刻豈不痛哉惟達生散立方方正奈只可調理於產前生化湯用意甚深又只可調理於產後並非可濟危急催生之用者今萬全湯乃體二方之意合成一方務取萬全屢用甚驗故以萬全名之先以調補氣血佐以散瘀下降溫中使氣血得力自能健用催生此不催之催也故用人參當歸為君

培補氣血壯其主也。少加桃仁、川芎、黑薑、炙草、酒、紅花、溫中而散其瘀也。牛膝、稍桂、心、溫行導下。使無上逆衝心之患。不惟催生神效。產後更無瘀血凝滯。百病不生。補而兼溫。則不滯溫而兼補。則不崩。升少降多。則氣得提而易下。降而兼升。則瘀自去而新自歸。補多瀉少。邪去而元氣無傷。苦少甘多。瘀逐而中和仍在。豈非萬全催生者乎。

催生佛手散

全當歸

川芎

龜板

水煎服

一方去龜板。加益母草三五錢。

油蜜飲

治產難數日不下。並瀝漿胞乾。

白蜂蜜

真麻油

共一碗煎一二沸。掠去浮沫服。

一方加童便服。

三合濟生湯

治臨產艱難。一二日不下。服此自然轉動下生。

當歸

川芎

枳殼

紫蘇

大腹皮

甘草

水煎服。待腰痛甚。服之即生。

魚膠散

治難產

魚膠

五錢同麵炒成珠。去麵。將膠研細。末用熱酒沖服。少頃即產。

催生簡易方

催生時。藥不便。就將本年時憲書上黃紙殼面。刊有欽天監奏准云。並有印信在上者。扯來

不要人見。用火燒為灰。將灰調酒一盃。與產婦吞之。即時產下。又有請本地方官。或府州縣差

籤一枝。在籤上硃書某縣知縣某人。要寫名字。在此立候催生。將籤字倒豎。於產房門檻內。即

刺產下。仍即將籤繳回本縣。奇驗奇驗。