

上

傷寒論
卷之五

除靈胎醫書三十二種

傷寒經編卷二

陽明病提綱

陽明之為病胃家實也。

陽明屬胃。胃實為陽明。病根有實於未病之先者。有實於得病之後者。有風寒外束。熱不得越而實者。有妄汗吐下。重亡津液而實者。有本經熱盛而實者。有他經轉屬而實者。此只舉病根胃實外證。

陽明病外證。身熱汗自出。不惡寒反惡熱也。

胃家實外證。身蒸蒸然。裡熱熾而達於外。汗濺濺然。從內溢而無止息。表寒已散。故不惡寒。裡熱閉結。故反惡熱。只因胃家實之病根。即見身熱自汗之外證。不惡寒反惡熱之病情。非即可下之證。必識語潮熱煩躁痛脹。纔可下耳。

陽明病脈證

陽明病脈浮而緊者。必潮熱發作有時。脈浮者。必盜汗出。

潮熱有時。脈浮而緊。是浮為熱熾。緊非為寒盜汗為營虛熱迫。故脈必浮而不兼他象。傷寒三日。陽明脈大。

脈大者。兩陽合明。內外皆陽之象。陽明初受表邪。脈但浮而未大。與太陽同。三日來熱自裡發。熱勢太盛。故脈亦應而洪大也。

脈浮而大。心下反硬。有熱屬藏者。攻之不令發汗。屬府者。不令洩數。洩數則大便硬。汗多則熱愈。汗少則便難。脈遲尚未可攻。陽明主津液所生。病津液乾。則胃家實。故禁汗與洩。夫脈之浮緊浮緩。浮數浮遲。皆不可攻。而可汗。此浮而大反不可汗。而可攻者。以此為陽明三日之脈。當知大為病進。不可拘浮為

在表也。心下者胃口。心下硬。已見胃實一斑。以表脈不當見裡證。故曰反硬。有熱屬藏。是指心肺有熱。攻之。謂攻其熱。不令者禁止之辭。屬府指膀胱。膀胱熱。故洩數。不令處見當滋陰之義。汗出多。亡津液。而大便硬。即汗出少。亦未免大便硬。而難出其利於急攻可知。若脈遲。則便非藏熱。而浮大。皆為虛脈。矣。正以發明心下硬一證。有無熱屬藏為妄。攻其熱者禁耳。

不可下證。

傷寒嘔多。雖有陽明證。不可攻之。嘔多者是水氣在上焦。而津液未乾也。胃家雖實。慎不可攻。攻之。恐利遂不止。腹滿嘔吐。是太陰陽明相關證。胃實胃虛。是陽明太陰分別處。要知胃家實。雖變證百出。不失為生陽下利不止。參附不能挽回。便是死陰也。

誤汗便艱證。

陽明病自汗出。若發汗。小便自利。此為津液內竭。大便雖硬。不可攻之。當須自欲大便。則宜蜜煎導。而通之。若土瓜根及大猪膽汁。皆可為導。

汗出溺利。而更發其汗。乃胃中津液兩竭。必大便硬而難出。是內燥而非內熱也。只須外潤。不可內攻。於自欲大便時。因勢蜜煎導而通之。挾熱者。土瓜根大猪胆汁。皆可為導。

蜜煎導。治陽明無熱胃虛便閉脈沈者。

白蜜七合。銅器內煎。熬如飴。攪之。勿令焦着。可凡捻作挺。頭銳如指。大長二寸許。乘熱納穀道。欲大便去之。

胃虛腸結。燥閉不通。故宜甘以緩之。潤以通之。是陽明無熱。而胃虛便閉者。法當需此通導。則腸結解。

而胃氣無傷也

大猪胆一枚。瀉汁少許。入醋納穀道中。食頃當大便。

腸結有火。胃家有實。故宜猪胆之苦。以泄之。寒以瀉之。是胃本無火。腸結挾熱者。需此外導。以通泄之。則腸熱化而胃不寒也。土爪根導。亦不出苦寒。通導腸結之義。

陽明傷寒證

病有得之一日。不發熱而惡寒者。雖得之一日。惡寒將自罷。即自汗出而惡熱也。

陽明自受寒邪。一日惡寒與太陽同。至二日寒化熱熾。即自汗出而惡熱也。若從他經轉屬。必常在六七日。而不在一二日間。

陽明病機

陽明居中土也。萬物所歸。無所復傳。始雖惡寒。二日自止。此為陽明病也。

陽明受寒。始雖惡寒。二日自止。蓋胃為戊土。位處中央。表裡寒熱之邪。無所不歸。無所不化。皆從燥化。而為實。實則無所復傳。所以為陽明之病根也。

太陽轉屬證

太陽病若發汗。若下。若利小便。亡津液。胃中乾燥。因轉屬陽明。胃實。大便難。此為陽明也。

此太陽轉屬陽明之病。因有亡津液之病機。故成此胃家實之病根也。

本經成實證

傷寒發熱無汗。嘔不能食。而反汗出濇濇然者。是轉屬陽明也。

胃實之病機。在汗出多。病情在不能食。初因寒邪外束。故發熱無汗。繼而胃陽中發。故反汗多而嘔。不

能食是病在陽明而成實也

太陰轉屬證

傷寒脈浮緩手足自溫者繫在太陰太陰者身當發黃若小便自利者不能發黃至七八日大便硬者為陽明病也

太陰轉屬陽明者病機在小便小便不利是津液不行而濕土受病病仍在太陰身當發黃若小便自利則津液越出而轉屬陽明為燥土受病故大便當硬也

陽結陰結證

其脈浮而數能食不能使者此為實名曰陽結也期十七日當劇其脈沈而遲不能食身體重大便反硬名曰陰結也期十四日當劇

脈浮數為陽盛陽盛於胃者名陽結脈沈遲為陰盛陰盛於胃者名陰結陽結能食不大便陰結不能食能大便陽結期十七日劇陽主進合乎陽數之奇陰結期十四日劇陰主退合乎陰數之便能食者過期不能食者不及期蓋陽結即是胃實陰結無表證當屬之少陰不可以身重不能食為陽明而不敢溫補也

陽明桂枝證

陽明病脈遲汗出多微惡寒者表未解也可發汗宜桂枝湯

營虛受邪腠理不密故汗出多而微惡寒純是表氣虛寒汗出惡寒同太陽桂枝證以脈遲乃知病在陽明也惡寒微則發熱亦微宜桂枝湯啜熱稀粥法和營散邪則汗更出而營氣和邪自解矣

桂枝湯見前

陽明麻黃證

陽明病脈浮無汗而喘者發汗則愈宜麻黃湯

表有風寒脈必浮盛有力無汗而喘者邪盛外束氣鬱不伸也麻黃湯發汗則汗出而邪外解陽氣和喘自平而脈自斂矣脈證全同太陽而曰陽明者不頭痛項強故耳

麻黃湯見傷寒

小青龍湯合吳茱萸湯證

陽明病反無汗而小便利二三日嘔而欬手足厥者必苦頭痛若不欬不嘔手足不厥者頭不痛

小便利者裡無熱反無汗者表有汗頭痛厥逆必因嘔欬是表裡虛寒胃陽不伸而迫肺上干也小青龍合吳茱萸湯兩解表裡之邪則嘔欬而厥逆頭痛自平矣

小青龍湯見傷寒

吳茱萸湯見少陰

衄血證

陽明病口燥但欲漱水不欲嚥者此必衄

陽明氣血俱多主津液所生病津液內竭故口燥欲漱水但熱迫血分而不在胃中故不欲嚥水而衄血可必是病陽明之經絡也宜犀角地黃湯清降之

犀角地黃湯見濕溫

脈浮發熱口乾鼻燥能食者則衄

鼻燥發熱為熱傷陽明之經能食口乾是熱迫陽明之胃表裡交蒸脈必浮盛有力而血結於胃血為

熱迫故衄血也。桃仁承氣湯散而逐之。

桃仁承氣湯見太陽蓄血

傷寒四五日。脈沈而喘滿。沈為在裡。而反發其汗。津液越出。大便為難。表虛裡實。久則譫語。

喘而胸滿。必脈浮者。病在表。可發汗。今脈沈為在裡。則喘滿皆屬於裡。傷寒四五日。正陽明將臨之候。反發其汗。而津液越出。則轉屬陽明。而成胃實。便難譫語。所由來。調胃承氣少和之。條中久則譫語。當作實。則譫語。此傳寫之誤。

調胃承氣湯見陽明中風

發汗多。若重發汗者。亡其陽。譫語脈短者死。脈自和者不死。

陰汗太多。津液越出。則離中之陰大虛。而陽亦外亡。故神明失措。而亦作譫語也。脈短為元陰將脫。不勝收攝。故死。脈自和。為脈有胃氣。是知不死。安神救逆。即可生全。酸棗仁湯滋養心液。以安神明也。

酸棗仁湯 治亡陽譫語。脈緩微數者。

酸棗仁三錢 懷生地五錢 麥冬三錢 肉桂三錢 砂礞石三錢 甜竹瀝三匙 白茯苓二錢 白芍藥錢半 北五味錢 真阿膠三錢 蛤粉三錢

炒生牡蠣三錢 炙甘草五分

水煎去渣溫服。汗發多則心液虛。心陽外亡。故譫語也。亡陰而曰亡陽者。以心之液為陽之汗。棗仁

養心。茯苓安神。所以奠神明之主。阿膠益血。白芍斂陰。所以振神明之用。生地麥冬滋既亡之陰。牡蠣

五味收浮越之陽。炙草緩中益氣。竹瀝養液化痰。俾陰液內充。則虛陽自斂。而神明自安。譫語自寤矣。

譫語直視喘滿者死。下利者亦死。

譫語因於陽盛。不是死證。若譫語直視。目不轉睛。是藏府之精氣將絕。即喘而不休。肺氣已絕。滿而不運。

脾氣亦絕。下利不止。乃倉廩不藏。門戶不要。皆為死證也。

夫實則讖語虛則鄭聲。鄭聲重語也。

邪氣盛則實。實則讖語。言雖誕妄。與發狂不同。自有一種莊嚴之狀。正氣奪則虛。虛則鄭聲。語言婉轉。與讖語不同。自有一種必欲有求之狀。故仲景以重語釋之。乃見有鄭重其事。而不忽其言也。

熱入血室證。

陽明病下血。讖語者。此為熱入血室。但頭汗出者。刺期門。隨其實而瀉之。澀然汗出則愈。

熱鬱陽明。陷入血室。血下則陽熱上浮。而神明被擾。故神識無主。語言讖妄也。但頭汗出。刺期門。期門乃肝之募。瀉其熱而通其經。則汗得遍身。而蓄熱外泄。下血自止。而讖語無不自己。黑膏梔子法亦可。

梔子豉湯 治陽明挾熱脈弦長者。

梔子三錢 淡豉三錢

水煎去渣溫服。胃熱乘肝。陷入血室。故下血。讖語為邪熱入於血室也。梔子除內煩。淡豉泄外熱。君

以黑膏。則陽明之血熱自解。而讖語自止矣。

婦人中風發熱惡寒。經水適來。得之七八日。熱除而脈遲身涼。胸脇苦滿。如結胸狀。讖語者。此為熱入血室也。當刺期門。隨其實而瀉之。

中風經至發熱惡寒。當先解其外。至七八日熱除身涼。反胸脇滿而非結胸。發讖語而非胃實。脈遲為在藏。是血結於肝。而堵塞神明也。此為熱入血室。刺期門以瀉結除滿。則結血化而讖語自己。小柴胡加赤芍生地亦已。

小柴胡湯見少陽

婦人傷寒發熱。經水適來。晝則明了。夜則譫語。如見鬼狀。此為熱入血室。無犯胃氣及上下焦。必自愈。傷寒發熱。見婦人中風傷寒。皆有熱入血室。證發熱不惡寒。是病在陽明。譫語不因胃實。是肝虛魂不安。而妄見。故如見鬼狀。病在血分。故晝則明了。夜則誕妄。也不得妄下。以傷中焦之胃氣。亦不得妄汗。以傷上焦之清陽。刺之出血。以傷下焦之真陰。當養血清魂。而譫語自已。黑逍遙散合舉輕古拜散主之。

懷生地錢五 軟柴胡分五 白芍藥錢半 當歸身錢三 冬白朮錢半 白雲神錢二 粉甘草分五 炒荷葉錢三

水煎去渣溫服。血熱加梔丹。傷寒經至血虛。邪熱陷於血室。故晝則明了。夜則譫語。見鬼亦為熱入血室。歸芍斂陰養血。朮草健中生血。柴胡升陽散熱。肝木得遂條達之性。茯神滲熱安神。心氣亦致

和平之德。生地黃滋陰益血。腎水有既濟之功。炒荷葉升陽和血。肝陰有轉舒之妙。俾水潤木榮。心脾

得滋養之力。更合黑荆。則血室清而魂自藏。外熱解而譫語自已。又益梔丹。以平血中之熱。何患邪有

解熱猶陷入血室乎。

舉輕古拜散

治崩漏吐衄脈浮者

荆芥穗炒黑 三兩

為末水調三錢。亦可入煎劑。經受外邪。遏熱迫血。故血從諸竅溢出。宜隨上下以酌湯治之。荆芥理

血疎風。炒黑入血分。力能和血止血。以疎血中之邪。崩止吐衄崩漏挾邪之血。因方製劑。無不獲效。

陽明中風證

陽明中風。口苦咽乾。腹滿微喘。發熱惡寒。脈浮而緊。若下之。則腹滿小便難也。

微喘惡寒。脈浮而緊。同太陽麻黃證。口苦咽乾。又似太陽少陽合病。更兼腹滿。又似太陽太陰合病。何以名為陽明中風耶。以無頭項強痛。則不屬太陽。不耳聾目赤。則不屬少陽。不腹痛自利。則不屬太陰。是知口為胃竅。咽為胃門。腹為胃室。喘為胃病無疑。今雖惡寒二日自止。脈之浮緊。亦陽明潮熱有時之候。此陽明初病在裏之表。若以腹滿為胃實而下之。則腹更滿而小便難。大便反易矣。當以小柴胡

合梔鼓湯主之。

小柴胡湯見少陽

梔鼓湯見前熱入血室證。

陽明中風。脈弦浮大而短氣。腹部滿。脇下至心痛。久按之氣不通。鼻乾不得汗。嗜臥。一身疼。面目悉黃。小便難。有潮熱。時時噦。耳前後腫。刺之小差。外不解。病過十日。脈弦浮者。與小柴胡湯。脈但浮無餘證者。與

麻黃湯。若不尿腹滿。加噦者不治。

中風二字。便藏表熱在內。刺之是刺足陽明。隨其實而瀉之。脈弦浮者。向之浮大減小。而弦尚存。故可

與小柴胡湯以解外。脈但浮而不弦大。則非陽明少陽。脈無餘證。則諸證悉罷。惟太陽之表未散。故可與

麻黃湯以解外。若不尿腹滿加噦。此是內不解。小便難者。竟至不尿。是化源已絕也。腹部滿者。竟不減

脾氣敗而不運也。時時噦者。更加噦而胃氣敗絕。均不可治也。此陽明中風之劇者。兼太陽少陽兩經證。

小柴胡湯見少陽

麻黃湯見太陽

陽明中寒證。

陽明病若能食。名中風。不能食。名中寒。

風為陽邪。故能食。寒為陰邪。故不能食。以能食不能食。別風寒。亦以見陽明之虛實也。此陽明初受表邪。先辦胃家虛實。為診家着眼處。

陽明病。若中寒不能食。小便不利。手足漚然汗出。此欲作固瘕。必大便初硬後溏。所以然者。以胃中冷水穀不別故也。

胃陽盛。則中熱而消穀。胃陽虛。則中寒而不能食。固瘕。即初硬後溏之謂。肛門雖固結。而腸中不全乾也。溏即水穀不別之故。胃中寒不能化液。故小便不利。胃中虛不能攝液。故手足漚然汗出耳。理中湯加烏梅以溫理之。

理中湯 見太陰

陽明病。脈遲腹滿。食難用飽。飽則微煩頭眩。必小便難。此欲作穀疸。雖下之。腹滿如故。所以然者。脈遲故也。

食難用飽。因於腹滿。腹滿因於小便難。頭眩又因於食飽耳。此胃虛寒滯。遏濕於中。故食入則胃氣不化。而煩。清陽下升而眩。濁陰不降而腹滿。小便難也。身體盡黃。名曰穀疸。不用五苓。合枳實理中。而反以茵陳湯下之。則脈遲為在藏。脾氣愈傷。故腹滿不減。而如故。

五苓散 見太陽

枳實理中湯 治穀疸腹滿脈遲者

於潛朮

煨半

小枳實

炒分

炮姜炭

白茯苓

錢三

甘草灰

分五

水煎去渣溫服 胃虛寒伏遏濕於中。則中氣不化。而腹滿。小便難。故身體淡黃。名曰穀疸。於朮健脾。

枳實破滯。泡姜合草灰。溫中氣。以化濕祛寒。茯苓佐草灰。滲脾濕。以安中除滿也。必偶之以五苓。則清

升濁降而小便自利穀疸自痊矣
茵陳湯 即茵陳蒿湯見痰熱發黃

除中證

傷寒脈遲六七日而反與黃芩湯徹其熱。脈遲為寒。今與黃芩湯復徹其熱。腹中應冷。當不能食。今反能食。此為除中。必死。

傷寒是熱發於表。脈遲為寒伏於中。與黃芩湯復徹在表之內熱。則熱去而寒起。胃陽不支。假穀氣以自救。反能食者。名除中。必死。不能食者。為寒中。宜桂枝人參湯溫之。

桂枝人參湯

見太陽

梔子豉湯證

陽明病脈浮而緊咽躁口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反惡熱身重若發汗則躁心憤憤而讖語若加燒針心忪惕煩躁不得眠若下之則胃中空虛客氣動膈心中懊懣舌上胎者梔子豉湯主之

此陽明半表裡證邪已入腹。不在營衛之間。故妄汗則腎液虛而發躁。心液亡而憤憤。且胃亡津液。則無以榮潤腸府。而大便秘硬。讖語身重。若溫針。則心恐懼而怵惕。煩躁不得眠也。下之則胃中空虛。客氣動脇。故心中懊懣不安。脈雖浮緊。舌有胎。是心中畜熱不散。宜梔子豉湯。兩解表裡之邪。外而自汗惡熱。身重可除。內而喘滿咽乾口苦自解矣。

梔豉湯

見熱入血室

白虎加人參湯

若渴欲飲水口乾舌燥者。白虎加人參湯主之。

燥渴欲飲水是熱已入胃用白虎加人參湯瀉胃火而扶元氣

白虎加人參湯 治燥渴飲水舌燥口乾脈洪大者

石羔錢五人參分八甘草分五知母錢半粳米握一

水煎去渣溫服 胃熱熾盛津液頓亡故脈洪大煩大渴欲飲水數升也生石羔大寒瀉胃火而津液生肥知母辛寒泄肺火以潤腎燥甘草緩寒藥之性用為舟楫而沈降之性始得留戀於胃粳米奠安中宮培形氣而生津液使陰寒之品庶無傷損脾胃之虞更加人參者以氣為水母於大寒劑中扶元氣生津血也此湯入胃輸脾歸肺則津液四布而胃熱頓除煩大渴可解脈之洪大亦無不斂矣

猪苓湯證

若脈浮發熱渴欲飲水小便不利者猪苓湯主之

脈浮渴飲是熱已傷陰發熱小便不利乃濕熱漬於水府也用猪苓湯益陰化氣則熱渴解而小便自利矣

猪苓湯 治發熱口渴小便不利脈浮者

猪苓錢半茯苓錢半澤瀉錢半滑石錢三阿膠錢五化沖

水煎去渣納膠溶和服 發熱渴飲小便不利是濕熱內淫陰津虧少不能上奉以退蒸也猪苓茯苓滲濕化氣理水之源澤瀉滑石滲濕利水清水之用阿膠乃血氣之屬是精不足者補之以味以此滋陰利水則水升火降而小便無不利熱渴無不除矣

梔子豉湯證

梔子甘草湯證

梔子生薑豉湯證

發汗吐下後虛煩不得眠。若劇者必反覆顛倒。心中懊懣。梔子豉湯主之。若少氣者。梔子甘草豉湯主之。若嘔者。梔子生薑豉湯主之。

虛煩是陽明之壞病。懊懣一證。以概憤懣怵惕。是虛煩之象。反覆顛倒。切肖不得眠之狀。心居胃上。即陽明之表。此心病。皆為陽明表邪。故製梔子豉湯。因而越之。若少氣。加甘草以益氣。若嘔。加生姜以散邪。是從虛煩中細別出。

梔子豉湯

見熱入血室

梔子甘草豉湯

治虛煩少氣。脈浮數者。

梔子

錢半 淡豉

錢半 甘草

錢半

水煎去渣溫服。

虛煩是熱乘心。膈少氣是熱傷氣化。此病在胸中。乃陽明裡之表證。梔子苦能泄熱。

寒能勝熱。其形象心。色赤通心。故主心中上下一切證。豆形象腎。色黑通腎。製而為豉。輕浮上行。能使心腹之濁邪上出於口。外散於肌肉也。一吐而心腹得舒。則表裡之煩熱悉除。熱傷氣者。少氣。加甘草以益氣。而氣自調耳。

梔子生薑豉湯

治虛煩多嘔。脈數弦浮者。

梔子

錢半 淡豉

錢半 生薑

分五

水煎去渣溫服。

虛熱相搏者。胃氣不順而多嘔。加生姜以散逆止嘔。而虛熱自平。胃氣自調。嘔無不

除矣。

梔子乾姜湯證

傷寒醫以丸藥大下之。身熱不去。微煩者。梔子乾薑湯主之。

攻裏不遠寒。用寒藥大下之。寒氣留中。可知心微煩而身熱不去。裏寒格熱之象也。梔子乾姜湯主治之。

梔子乾薑湯 治身熱微煩脉沈者

梔子 錢半 乾薑 二錢

水煎去渣溫服。裏寒格熱。故心中煩而身熱不去。乃誤下之變也。用梔子以解內煩。倍乾薑以逐裡寒。而表熱自散。

梔子厚朴湯證

傷寒下後。心煩。嘔滿。起臥不安者。梔子厚朴湯主之。

心煩則難臥。腹滿則難起。起臥不安。是心熱移胃。與反腹顛倒之虛煩不同。梔子厚朴湯主治之。

梔子厚朴湯 治心煩腹滿起臥不安脉弦者

梔子 錢三 厚朴 錢半 枳實 錢半

水煎去渣溫服。邪熱內乘。中氣不化。故心煩腹滿。起臥不安。是太陰陽明相關證也。梔子以治煩。枳實以泄滿。此兩解心腹之劑。小承氣之先著歟。

梔子柏皮湯證

傷寒身熱發黃者。梔子柏皮湯主之。

寒傷於表。陽氣拂鬱。則汗不得出。熱不得越。而發黃者。是胃火蒸騰於經絡。黃色外見於皮膚也。斯時寒已化熱。宜用梔子柏皮湯以苦泄之。

梔子柏皮湯 治身熱發黃脈數者

梔子三錢 柏皮半錢 甘草五分

水煎去渣溫服 內熱蒸騰表氣拂鬱則熱瘀經絡而汗不得出熱不得越故發黃也梔子以治內煩

柏皮以泄外熱甘草和中則熱解氣調而黃自退矣

凡用梔子湯病人舊微溲者不可與服之

向來胃氣不實雖梔子亦當禁用

瓜蒂散證

病如桂枝證頭不痛項不强寸脈微浮胸中痞硬氣上冲咽喉不得息者此為胸有寒也當吐之宜瓜蒂散

病如桂枝證但頭不痛項不强便非太陽中風證未經汗下而胸中痞硬更非結胸瀉心是邪中於面則入陽明故寸脈微浮鼻鳴發熱汗出惡風者似病在表之表乃病在胸中氣上冲不得息而又邪中於膺亦入陽明是病在裏之表則胸寒結而不散胃陽鬱而不伸故用瓜蒂散因而越之胃陽得升寒邪自散得裡之表和而表之表亦解矣

瓜蒂散 治胸中痞硬寸脈微浮者

赤小豆一兩 甜瓜蒂一分

別搗篩合治之以三錢用豉一兩煮稀糜去渣取汁和散溫服得吐乃止亡血虛家不可與邪結陽明心氣不降故胸中痞硬氣上冲咽喉不得息也瓜蒂色青象東方甲木之化得春升生發之機能提胃中陽氣除胸中實邪為吐劑中第一品其性走而不守必得穀氣以和之赤小豆象心甘酸可以保心

氣黑豆象腎。制而為鼓。能令腎家之精氣上交於心胸中之濁氣。外出於口。快吐而不致傷神。奏功之捷。勝於汗下也。

四逆湯證

少陰病。飲食入口則吐。心中溫溫欲吐。復不能吐。始得之。手足寒。脈弦遲者。此胸中實。不可下也。當吐之。若膈上有寒飲乾嘔者。不可吐也。當溫之。宜四逆湯。

飲食入口即吐。原非少陰虛寒。心下溫溫欲吐。溫上則復不能吐。此寒結在胸。熱蓄心下。宜瓜蒂散。因其高而越之。則邪從吐解矣。若膈上有寒飲與心下溫不同。反乾嘔與飲食即不吐同。宜四逆湯溫之。可知手足寒。脈弦遲。有心溫膈寒二證。治分天壤。診家須著眼。

四逆湯

見少陰

太陽病。當發熱惡寒。今自汗出不惡寒發熱。關上脈細數者。以醫吐之過也。此為小逆。一二日吐之者。腹中飢口不能食。三四日吐之者。不喜糜粥。欲食冷食。朝食暮吐。以醫吐之所致也。

太陽病當發汗而反吐之。則膈氣內傷。自汗反出。關上脈細數也。惡寒發熱雖除。頭項強痛仍在。猶未至不能飲食。尚為小逆。一二日熱正在表。誤吐而邪未盡。臨飢不能食。三四日熱發於裡。誤吐而胃陽已亡。不喜穀食。反喜瓜果。是為除中。朝食暮吐。此為大逆。

白虎湯證

傷寒脈浮發熱無汗。其表不解者。不可與白虎湯。渴欲飲水。無表證者。白虎加人參湯主之。

脈浮發熱無汗。是傷寒之表未解。故不可清火。若外熱已解。是無表證。欲渴飲水。熱已內攻。當用白虎加人參。是瀉火而益元氣也。俾火熱自化。則煩渴自除矣。