

醫

聖

階

梯

四

醫聖階梯卷之九

臨清州判官歸安半山周禮輯著

庠生元山張崑校正

大頭卅五

論

大頭者天行疫毒之氣人感之而為大頭也若先發於鼻額紅腫以致兩目腫盛不開并額上面部焮赤而腫者此屬陽明也或壯熱氣喘口乾舌燥或咽喉腫痛不利其脉數大者普濟消毒飲若內實熱甚者增損通聖散增損主之若發于耳之上

下前後并頭角紅腫者此屬少陽也或肌熱日晡潮熱或往來寒熱口苦咽乾目疼胸脇滿悶小柴胡湯加消毒之藥若發于頭上并腦後下項并目後赤腫者此屬太陽也荊防敗毒散若三陽經俱受邪并發于頭面耳鼻者以普濟消毒飲或通聖散增損主之外用清涼救苦散塗之大抵治法不宜太速攻則邪氣不伏而反攻內必傷人也

清涼救苦散

芙蓉葉

紫何車

山慈菇

赤小豆

白芨

白欬

大黃

二桑葉

霜過

黃芩

黃連

黃栢

白芷

雄黃

芒硝

南星

各等分為末蜜水調塗頻掃之或萬病解毒丹生
薄荷水磨服半錠敷腫上亦佳咽喉痛磨水點入
或綠雲散吹之

普濟消毒飲

柴胡

黃連

黃芩

玄參

甘草

桔梗

連翹

大力

升麻

白芷

馬勃

姜蚕

藍根

凡虛人脉弱加人參

胃虛食少加白朮

橘紅

一方加防風 荆芥 當歸

凡大便鞭秘者加酒浸大黃下之

右水煎服之就卧使藥性上行也

荆防敗毒散

羌活 獨活 前胡 柴胡 人參 茯苓

枳殼 桔梗 甘草 荆芥 防風 大力

川芎 薄荷

右水煎內熱加酒冷 熱甚加酒連 口渴加天

花粉

增損通聖散

凡頭面腫盛目不開鼻塞煩悶口乾舌燥內外有熱或咽喉腫痛不利內實大便秘結其脈洪數煩渴

荊芥 防風 連翹 大力 甘草 川芎

芍藥 當歸 薄荷 黃芩 山梔 滑石

石羔 桔梗 芒硝 內熱甚大便實者用之內虛食少者戒之

大黃 酒浸以取上行人實便秘者用便溏者戒之量虛實

麻黃 增寒拘急無汗脈浮數者用自汗不用

腫不消倍用大力 黑玄參 或生犀尤妙

備方

漏蘆湯

凡時毒頭面紅腫咽喉堵塞水藥不下若素有臟腑積熱發為腫毒疙瘡一切惡瘡紅腫悉治

漏蘆

升麻

酒芍

甘草

藍葉

大黃

酒浸

玄參

牛蒡

桔梗

連翹

右水煎如大便不通加芒硝一二錢以利為度

消毒丸

大黃

酒浸

牡蠣

煨粉

白僵蚕

各三錢

右為末煉蜜丸如彈子大每服一丸新汲水下不

拘時

清震湯

凡雷頭風頭面疙瘡腫痛壅塞發熱四肢拘急狀似傷寒

升麻

葛根

芍藥

甘草

蒼朮

青荷葉

一箇無青用乾

右水煎夫雷者屬震卦也震象仰盂故用荷葉色青以類形而治則效也

綠雲散

青黛

寒水石

山豆根

紫何車

玄明粉

硝石各一錢水一分

右為細末吹之

重方

小柴胡湯八十

青皮 歸身 白芍 甘草 黃芩 大黃

水煎服之 天香 氣血 經絡 山 靈 藥 叶 孟 効 用 荷 葉 色

右 藥 木 加 大 香 荷 葉 葉 色 荷 葉 青 葉 葉 以 利 為 度

右 藥 木 加 大 香 荷 葉 葉 色 荷 葉 青 葉 葉 以 利 為 度

右 藥 木 加 大 香 荷 葉 葉 色 荷 葉 青 葉 葉 以 利 為 度

右 藥 木 加 大 香 荷 葉 葉 色 荷 葉 青 葉 葉 以 利 為 度

右 藥 木 加 大 香 荷 葉 葉 色 荷 葉 青 葉 葉 以 利 為 度

喘三十六

論

傷寒發喘止有太陽上明二証太陽頭疼身熱無汗脉浮而喘宜汗之陽明潮熱汗出不惡寒而喘宜下之二陽合病胸滿而喘則當先散表邪亦用麻黃湯至若水為至陰其性則寒病有內熱得水則消燂之若身熱內寒則兩寒相搏水停心下肺氣中逆而喘則用青龍加杏仁去麻黃以行其水也若喘促脉伏者始以五味子湯和之

小青龍湯

太陽表未解心下有水氣乾嘔發熱而咳或噎或喘

麻黃 芍藥 細辛 乾姜 甘草 桂枝

五味 半夏

右水煎目汗去麻黃加茯苓 有咳嗽者去麻黃

加杏仁

或腹痛大便堅者以大柴胡湯小承氣湯選而用

之

人參定喘湯

喘而氣促者

橘紅 桔梗 蘇葉 五味 人參 杏仁

白皮

右水煎

參連葛根湯

鑿下之利遂不止脉促表未解喘而汗出者

葛根 黃芩 黃連 甘草

右水煎

瀉白湯

治煩熱胸膈不利上氣促口乾或咳

白皮 知母 骨皮 橘皮 黃芩 貝母

桔梗 甘草 瓜蒌

右水煎

麻黃石羔湯

麻黃 石羔 杏仁 甘草

右水煎加細茶一錢一方加白皮亦名五虎湯治
痰定喘如神乃劫劑也凡虛人自汗盜汗者尤宜
謹戒

灸法

寒邪下陷而喘者灸肺俞穴也

重方

麻黃湯八十七

五味子湯一百二

咳嗽三十七

論

肺為五臟之華蓋專主於氣_上之清濁既分則無嗽夫氣為邪所乘氣逆而不下清濁不分濁氣上干於華蓋加以恟水停飲肺不得清則為嗽矣或用杏仁阿膠蓋欲分清也若太陽少陽在表之邪干於肺氣則當發散而愈若陰症停寒法當溫之

小柴胡湯

傷寒三四日少陽經脉弦數口苦發熱而咳嗽者

柴胡 黃芩 人參 半夏 甘草

去人參大棗加五味乾姜發熱胸中煩而咳者
加瓜蒌仁炒胸脇痞滿而咳者加枳殼桔梗自
利者加乾姜

右水煎姜棗

四逆散

少陰四肢厥逆腹中痛或溇泄而咳嗽

甘草

枳殼

柴胡

芍藥各一兩

五味

乾姜各五錢

右為末每服二錢米飲下

人參香子湯

治虛弱人冒風寒咳嗽有痰或惡風頭疼乾嘔者

人參 半夏 茯苓 細辛 乾姜 甘草

官桂 芍藥 五味 杏子

右水煎姜脉浮緊惡風加麻黃

自汗三十八

論

衛氣者所以肥腠理而固津液者也。衛為邪干，不能固密，腠理踈而汗出焉。有表裏虛實之分。自汗出，惡風寒者，皆因太陽表証未解。冬用桂枝湯，餘月加減。中和湯汗後惡風寒，皆為表虛汗不止。黃芪建中湯，太陽証發汗遂漏不止，為亡陽。木附湯自汗出不惡風寒者，則為表証罷而裡証實也。承氣湯下之，小便自利。汗出者，津液少也。急下之，汗出而渴，小便難者，五苓散利之。