

御纂醫宗金鑑

目錄

金部卷八

訂正傷寒論註

辨少陰病鯁證併治全篇  
辨厥陰病鯁證併治全篇



御纂醫宗金鑑卷七

訂正仲景全書傷寒論註少陰全篇目錄

麻黃附子細辛湯

麻黃附子甘草湯

附子湯

四逆湯

白通湯

白通加豬膽汁湯

真武湯

通脈四逆湯



吳茱萸湯

四逆散

黃連阿膠湯

豬膚湯

甘草湯

桔梗湯

半夏散及湯

苦酒湯

桃花湯

御纂醫宗金鑑卷七

訂正仲景全書傷寒論註

辨少陰病脈證并治全篇

少陰腎經水火之藏邪傷其經隨人虛實或從水化以爲  
寒或從火化以爲熱水化爲陰寒之邪是其本也火化爲  
陽熱之邪是其標也陰邪其脈沉細而微陽邪其脈沉細  
而數至其見證亦各有別陰邪但欲寐身無熱陽邪雖欲  
寐則多心煩陰邪背惡寒口中和陽邪背惡寒則口中燥  
陰邪咽痛不腫陽邪咽痛則腫陰邪腹痛下利清穀陽邪  
腹痛下利清水或便膿血也陰邪外熱面色赤裏寒大便秘

利小便白陽邪外寒手足厥裏熱大便秘小便赤此少陰標本寒熱之脈證也凡從本之治均宜溫寒回陽從標之治均宜攻熱救陰回陽救陰其機甚微總在臨證詳究辨別標本寒熱以急施其治庶克有濟稍緩則不及矣少陰之爲病脈微細但欲寐也

註  
少陰腎經陰盛之藏也少陰受邪則陽氣微故脈微細也衛氣行陽則寤行陰則寐少陰受邪則陰盛而行陰者多故但欲寐也此少陰病之提綱後凡稱少陰病者皆指此脈證而言也

集  
方有執曰少陰言經也居於極下其脈起於小趾之下靈

樞曰是主所生病者嗜臥但欲寐蓋人肖天地天地之氣  
行於陽則闢而曉行於陰則闔而夜故人之氣行於陽則  
動而寤行於陰則靜而寐凡病人但欲寐者邪客於陰故  
也

張璐曰此言少陰之總脈總證也蓋少陰屬水主靜即使  
熱邪傳至其經在先之脈雖浮大此時亦必變爲沉細在  
先之證雖煩熱不寧此時亦必變爲昏沉嗜臥俱須辨出  
脈細沉數口中燥爲熱證脈沉微細口中和爲寒證以此  
明辨萬無差誤矣

程應旂曰凡陰脈皆沉異乎太陽之浮不必言矣陽明脈

大微者大之反少陽脈弦細者弦之反沉非微細陰證定矣

少陰病始得之反發熱脈沉者麻黃附子細辛湯主之

註

少陰病謂但欲寐也脈沉者謂脈不微細而沉也今始得之當不發熱而反發熱者是為少陰之裏寒兼有太陽之表熱也故宜麻黃附子細辛湯溫中發汗顧及其陽則兩感之寒邪均得而解之矣

集註

方有執曰發熱邪在表也脈沉少陰位北而居裏也以其居裏邪在表面發熱故曰反也以邪在表不在裏故用麻黃以發之以其本陰而標寒故用附子以溫之細辛辛溫



通於少陰用之以佐主治者以其專經而爲向导也

程知曰三陰表法與三陽不同三陰必以溫經之藥爲表而少陰尤爲緊關故用散邪溫經之劑俾外邪之深入者  
可出而內陽亦不因之外越也

程應旌曰一起病便發熱兼以陰經無汗世有計日按證者類能用麻黃而忌在附子不知軼沉者由其人腎經素寒裏陽不能協應故沉而不能浮也沉屬少陰不可發汗而始得病時卽發熱則兼太陽又不得不發汗須以附子溫經助陽托住其裏使陽不至隨汗而越其麻黃始可合細辛用耳

林瀾曰傳邪與陰寒皆有沉脈沉但可為病之在裏而表可專以沉為寒也夫少陰證中微細而沉與細數而沉其為寒熱之殊益大有別矣

麻黃附子細辛湯方

麻黃

二兩  
去節

細辛

二兩

附子

一枚炮去  
皮破八片

右三味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升日三服

少陰病得之二三日麻黃附子甘草湯微發汗以二三日無裏證故微發汗也

註

此詳上條少陰病得之二三日仍脈沉發熱不解者宜麻

黃附子甘草湯微發其汗也蓋謂二三日不見吐利裏寒  
之證知邪已衰然熱仍在外尙當汗之但不可過耳故不  
用細辛而用甘草蓋于溫散之中有和意也此二證皆未  
曰無汗非仲景畧之也以陰不得有汗不須言也

集註

張璐曰少陰無發汗之法汗之必至亡陽惟此一證其外  
有太陽發熱無汗其內不吐利躁煩嘔渴乃可溫經散寒  
取其微似之汗也

程應旆曰旣云微發汗矣仍用以字故字推原之足見鄭  
重之意按此二條與太陽篇發熱頭痛脈沉用四逆者同  
一證彼以不差則期過三日可知病已入裏雖尙冒太陽

頭痛直以少陰法律之此少陰病在初得二三日雖無頭  
痛證不容竟作少陰治之故仍兼太陽之法以律之  
一入不啻爰書假令前條得之二三日後二條過  
不差則四逆之與麻黃易地皆然矣

汪琥曰上條反發熱脈沉此亦反發熱脈沉但上言始得  
之爲急此言得之二三日爲緩病勢稍緩治法亦緩

麻黃附子甘草湯方

麻黃二兩  
去節

附子一枚  
炮去皮破入片

甘草二兩  
炙

右三味以水七升先煮麻黃二兩沸去上沫內諸藥煮取  
三升去滓溫服一升日三服

集

解柯琴曰彼太陽病而脈反沉便用四逆以急救其裏是裏

寒陰盛也此小陰脈而表反熱便於表劑中加附子以發

固其陽是表熱陽衰也夫以發熱無汗太陽之表脈沉但

欲寐少陰之裏設用麻黃開腠理細辛散浮熱而無附子

以固元陽則太陽之微陽外亡惟附子與麻黃並用則寒

邪散而陽不亡此裏病及表脈沉而當發汗者與病在表

脈浮而發汗者經庭也若表微熱則受寒亦輕故以甘草

易細辛而微發其汗甘以緩之與辛以散之者又少間矣

少陰病脈微不可發汗亡陽故也陽已虛尺脈弱濇者復不可

下之

註

少陰病脈微雖有發熱亦為少陰裏寒外熱非太陽發熱

者可比故不可發汗發汗則亡陽然陽已虛津液已竭即

見少陰口燥咽乾可下之證若尺脈弱濇者復不可下之

又恐亡陰也

集註

方有執曰微者陽氣不充故曰無陽無陽則化不行故汗

不可發也尺以候陰弱濇者陰血不足也故謂復不可下

其當亟行溫補又可知矣

程應旂曰少陰多自利證人固無言輕下者但拈出尺脈

弱濇字則少陰之有大承氣湯證其尺脈必強而滑已伏

見於此處矣



病人衄陰陽俱緊反汗出者亡陽也此屬少陰法當咽痛而復

吐利

註

病人衄陰陽俱緊發熱無汗者太陽傷寒證也發熱汗出

不止者太陽亡陽證也今衄緊無熱而反汗出此屬少陰

然少陰證法當咽痛而復吐利也上條衄微無汗不可發

汗者是以衄為主也此條有汗衄緊不可發汗者是以證

為主也從衄從證不可不察

集註

程知曰陰陽俱緊傷寒之衄也法當無汗而反汗出太陽

之陽外亡也若以少陰亡陽之證而認為太陽中風之證

則誤矣少陰之寒上逼則咽痛而吐下逼則下利也



少陰病脈緊至七八日自下利脈暴微手足反溫脈緊反去者  
爲欲解也雖煩下利必自愈

註

此承上條互發其義以別陰陽寒熱也少陰病脈沉微細  
寒邪脈也脈沉數細熱邪脈也若脈緊汗出是少陰寒虛  
證也今脈緊無汗乃少陰寒實證也因循至七八日之久  
而自下利若寒實解則脈必緊去而暴微其證必手足由  
冷而反溫是知邪隨利去爲欲解也故此時雖煩下利乃  
陰退陽回故知其必自愈也

集註

方有執曰緊寒邪也自下利脈暴微者陰寒內瀉也故謂  
手足爲反溫言陽回也陽回則陰退故謂緊反去爲欲解

也夫寒邪在陰而衾得自利衾暴微手足溫緊去爲欲解者猶之邪在陽衾數而熱得汗出衾和身涼數去爲愈之意同陰陽勝復之機也  
程應旄曰衾於利後頓變緊而爲微手足於利後變不溫而爲溫則微非諸微亡陽之微乃緊去人安之微蓋以從前之寒已從下利而去故陽氣得回而欲解也雖煩下利

必自愈

少陰病得之一二日口中和其背惡寒者當灸之附子湯主之

註

背惡寒爲陰陽俱有之證如陽明病無大熱口燥渴心煩背微惡寒者乃白虎加人參湯證也今少陰病但欲寐得

之二三日口中不燥而和其背惡寒者乃少陰陽虛之證

惡寒非陽明熱蒸之背惡寒也故當灸之更主以附子湯

以助陽消陰也口燥口和誠二者之確徵矣

集註

程知曰言初得之證口中和不渴不燥全無裏熱也內經

曰背為陽背惡寒則陽虛陰盛寒深可知若風寒在表而

惡寒則一身盡寒矣灸之以助陽消陰與附子湯以溫經

散寒論中云傷寒無大熱口燥渴心煩背微惡寒者白虎

湯加入參主之彼是陽熱乘陰虛而內陷之惡寒與此之

陰寒盛者不同陽入陰者則口燥心煩陰寒盛者則不能

銷鑠津液故口中和