

傷寒論三



注解傷寒論卷第四

漢張仲景述 王叔和撰次 成無已注解

辨太陽病脈證并治法下第七

問曰病有結胃有藏結其狀何如荅曰按之痛寸脈浮關脈沉名曰結胃也何謂藏結荅曰如結胃狀飲

食如故時時下利寸脈浮關脈小細沉緊名曰藏結

舌上白胎滑者難治

結胃者邪結在胃藏結者邪結在藏二者皆下後邪氣乘虛入

裏所致下後邪氣入裏與陽相結者為結胃以陽受氣於胃中故雨與陰相結者為藏結以陰受之則入

五藏故雨氣宜通而塞故痛邪結陽分則陰氣不得上通邪結陰分則陽氣不得下通是二者皆心下

痛寸脈浮關脈沉知邪結在陽也寸脈浮關脈小細沉緊知邪結在陰也陰結而陽不結雖心下結痛飲

食亦自如故陰氣乘腸虛而下故時時自下利陰得陽則解藏結得熱證多則易治舌上白胎滑者邪氣

結胃中亦寒藏結無陽證不往來寒熱其人反靜舌故云難治

上胎滑者不可攻也藏結於法當下無陽證為表無熱不往來寒熱為半表半裏無

熱其人反靜為裏無熱經曰舌上如胎者以丹病發田有熱胃中有寒邪氣以表裏皆寒故不可攻

於陽而反下之熱人因作結胃病發於陰而反下之

因作痞所以成結胃者以下之太早故也發熱惡寒者發於陽

也而反下之則表中陽邪入裏結於胃中為結胃無熱惡寒者發於陰也而反下之則表中陰邪入裏結

於心下結胃者項亦強如柔痙狀下之則和宜大陷為痞

胃丸方結胃病項強者為邪結胃中胃膈結滿心下緊實但能仰而不能俛是項強亦如柔痙之

狀也與大陷胸丸下結泄滿

大陷胃丸方

大黃

半斤味苦寒

葶藶

半斤熬味苦寒

芒硝

半斤味鹹寒

杏仁

半升去皮尖熬黑味苦甘溫

大黃芒硝之苦鹹所以熱葶藶杏仁之苦甘所以泄滿甘遂取其直達白蜜取其潤利皆以下泄物也

右肆味搗篩貳味內杏仁芒硝合研如脂和散取

如彈丸壹枚別搗甘遂末壹錢匕白蜜貳合水貳

升煮取壹升溫頓服之壹宿乃下如不下更服取

下為効禁如藥法

結胃證其脈浮大者不可下下之則死

結胃為邪結胃中屬土焦

之分得寸脈浮關脈沉者爲在裏則可下若脈浮大
心下雖結是在表者猶多未全結也下之重虛邪氣
復結則難可制結胃證悉具煩躁者亦死結胃證悉具邪結已
故云下之則死結胃證悉具煩躁者亦死
深也煩躁者正氣散亂太陽病脈浮而動數浮則爲
也邪氣勝正病者必死太陽病脈浮而動數浮則爲
風數則爲熱動則爲痛數則爲虛頭痛發熱微盜汗
出而反惡寒者表未解也醫反下之動數變遲膈內
拒痛胃中空虛客氣動膈短氣躁煩心中懊憹陽氣
內陷心下因鞭則爲結胃大陷胃湯主之若不結胃
但頭汗出餘處無汗齋頸而還小便不利身必發黃
也動數皆陽脈也當責邪在表睡而汗出者謂之盜
汗爲邪氣在半表半裏則不惡寒此頭痛發熱微
盜汗出反惡寒者表未解也當發其汗醫反下之虛
其胃氣表邪乘虛則陷邪在表則見陽脈邪在裏則

見陰脈邪氣內陷動數之脈所以變遲而浮脈獨不變者以邪結胃中上焦陽結脈不得而沈也客氣者外邪乘胃中空虛八裏結於胃膈中拒痛者客氣動膈也金匱要略曰短氣不足以息者實也短氣躁煩心中懊憹皆邪熱為實陽氣內陷氣不得通於隔壅於心下為梗滿而痛成結胃也與大陷胃湯以下結熱若胃中空虛陽氣內陷不結於胃膈下入於胃中者遍身汗出則為熱越不能發黃若但頭汗出身無汗刺頸而還小便不利者熱不得越必發黃也

大陷胃湯方

大黃

陸兩去皮苦寒

芒硝

壹升鹹寒

甘遂

壹錢七苦寒

大黃謂之將軍以苦蕩滌芒硝一名硝石以其鹹能炙鞭夫間有甘遂以通水也甘遂若夫間之遂其氣可以直達透結胃陷三物為允

右叁味以水陸升先煮大黃取貳升去滓內芒硝

煮壹兩沸內甘遂末溫服壹升得快利止後服

傷寒六七日結胸熱實脉沉而緊心下痛按之石鞭

者大陷胸湯主之

病在表而下之熱入因作結胸此不云下後而云傷寒六七日則是

傳裏之實鞭是也沈爲在裏緊爲裏實以心下痛按之實鞭是以爲結胸與大陷胸湯以下結熱傷寒

十餘日熱結在裏復往來寒熱者與大柴胡湯但結

胸無大熱者此爲水結在胃脇也但頭微汗出者大

陷胸湯主之

傷寒十餘日熱結在裏是可下之證復往來寒熱爲止邪分爭未全欲結與大

柴胡湯下之但結胸無大熱者非熱結也是水飲結於胃脇謂之水結胸周身汗出者是水飲外散則愈

若但頭微汗出餘處無汗是水飲不得外泄停畜而不行也與大陷胸湯以逐其水

發汗而復下之不大便五六日舌上燥而渴日晡時

小有潮熱從心下至少腹鞭滿而痛不可近者大陷

胃湯主之

重發汗而復下之則內外重亡津液而邪熱內結致不大便五六日舌上燥而渴也

日晡潮熱者屬胃此日晡小有潮熱非但在胃從心下至少腹鞭滿而痛不可近者是一腹之中上下邪

氣俱甚也與大陷小結胃病正在心下按之則痛脈

浮滑者小陷胃湯主之

也心下鞭痛手不可近者結胃也正在心下按之則痛是熱

氣猶淺謂之小結胃結胃脈沉緊或寸浮關沉今脈浮滑知熱未深結與小陷胃湯以除胃膈上結熱也

小陷胃湯方

黃連

壹兩苦寒

半夏

半升洗辛溫

枳實

大者壹箇苦寒

苦以泄之辛以散之黃連括蘘實之苦寒以泄熱半夏之辛以散結

右叁味以水陸升先煮括蘘取叁升去滓內諸藥

煮取貳升去滓分溫叁服

太陽病二三日不能卧但欲起心下必結脈微弱者

此本有寒分也反下之若利止必作結胃未止者四

日復下之此作協熱利也

太陽病二三日邪在表也

者以心下結滿卧則氣壅而愈甚故不能卧而但欲起也心下結滿有水分有寒分有氣分今脈微弱知本有寒分醫見心下結而反下之則太陽表邪乘虛入裏利止則邪氣留結爲結胃利不止至次日復如下攻腸胃爲挾熱利也

太陽病下之其脈促不結胃

者此爲欲解也脈浮者必結胃也脈緊者必咽痛脈

弦者必兩脇拘急脈細數者頭痛未止脈沉緊者必

欲嘔脈沉滑者協熱利脈浮滑者必下血

此太陽病下之後邪

氣傳變其脉促者爲陽盛下後脉促爲陽勝陰也故
不作結胃爲欲解下後脉浮爲上焦陽邪結而爲結
胃也經曰結胃者寸脉浮關脉沈下後脉緊則太陽
之邪傳於少陰經曰脉緊者屬少陰內經曰邪客於
少陰之絡令人噎痛不可內食所以脉緊者必咽痛
脉弦則太陽之邪傳於少陽經曰尺寸俱弦者少陽
受病也其脉循脇絡於耳所以脉弦者必兩脇拘急
下後邪氣傳裏則頭痛當止脉細數爲邪未傳裏而
傷氣也細爲氣少數爲在表故頭痛未止脉沈緊則
太陽之邪傳於陽明爲裏實也沈爲在裏緊爲裏實
陽明裏實故必欲嘔脉滑則太陽之邪傳於腸胃以
滑爲陰氣有餘知邪氣入裏于於下焦也沈爲血勝
氣虛是爲協熱利浮爲氣勝血虛是知必下血經
曰不宜下而便攻之諸變不可勝數此之謂也病
在陽應以汗解之反以冷水瀉之若灌之其熱被劫
不得去彌更益煩肉上粟起意欲飲水反不渴者服
文蛤散若不差者與五苓散寒實結胃無熱證者與

三物小陷胃湯白散亦可服

當病在陽為邪在表也法

濕之灌洗熱被寒水外不得出則反攻其裏彌更益煩肉上粟起者水寒之氣客於皮膚也意欲飲水者裏有熱也反不渴者寒在表也與文蛤散以散表中水寒之氣若不差是水熱相搏欲傳於裏與五苓散發汗以和之始熱在表因水寒制之不得外泄內攻於裏結於胃隔心下鞭痛本以水寒伏熱為實故謂之寒實結胃無熱證者外無熱而熱悉收欲於裏也與小陷胃湯以下逐之白散下熱故亦可攻

文蛤散方

文蛤

五兩味鹹寒

鹹走腎則可以勝水氣

右壹味為散以沸湯和壹

服湯用五合

白散方

桔梗

叁分味辛苦微温

巴豆

壹分去皮心熬黑研如脂辛温

貝母

三分味辛苦平

辛散而苦泄桔梗貝母之苦辛用以下氣巴豆之辛用以散實

右上叁味爲散內巴豆更於臼中杵之以白飲和

服強人半錢七羸者減之病在膈上必吐在膈下

必利不利進熱粥壹杯利過不止進冷粥壹杯身

熱皮粟不解欲引衣自覆者若水以濕之洗之益

令熱劫不得出當汗而不汗則煩假令汗出已腹

中痛與芍藥叁兩如上法

太陽與少陽併病頭項強痛或眩冒時如結胃心下

痞鞭者當刺大椎第一間肺俞肝俞慎不可發汗發

汗則讖語脈弦五六日讖語不止當刺期門太陽之

下項頭項強痛者太陽表病也少陽之脈循胃絡脇

如結胃心下痞鞭者少陽裏病也太陽少陽相併為

病不純在表故頭項不但強痛而或眩冒亦未全入

裏故時如結胃心下痞鞭此邪在半表半裏之間也

刺大椎第一間肺俞以瀉太陽之邪刺肝俞以瀉少

陽之邪邪在表則可發汗邪在半表半裏則不可發

汗發汗則亡津液損動胃氣少陽之邪因干於胃土

為木刑必發讖語脈弦至五六日傳經盡邪熱去而

讖語當止若復不止為少陽邪婦人中風發熱惡寒

熱甚也刺期門以瀉肝膽之氣

經水適來得之七八日熱除而脈遲身涼胃脇下滿

如結胸狀讖語者此為熱入血室也當刺期門隨其

實而瀉之

中風發熱惡寒表病也若經水不來表邪傳裏則入府而不入血室也因經水適來

血室空虛至七八日邪氣傳裏之時更不入府乘虛

而入於血室熱除脈遲身涼者邪氣內陷而表證罷

也胃腸下滿如結胃狀讞語者熱入血室而裏實期門者肝之募肝主血刺期門者瀉血室之熱審看何經氣實更隨婦人中風七八日續得寒熱發作有時其實而瀉之

經水適斷者此爲熱入血室其血必結故使如瘧狀

發作有時小柴胡湯主之中風七八日邪氣傳裏之時本無寒熱而續得寒熱

經水適斷者此爲表邪乘血室虛入於血室與血相搏而血結不行經水所以斷也血氣與邪分爭致寒熱如瘧而發作有時與小柴胡湯以解傳經之邪婦人傷寒發熱經水適來

晝日明了暮則讞語如見鬼狀者此爲熱入血室無

犯冒氣及上二焦必自愈傷寒發熱者寒已成熱也經水適來則血室空虛邪

熱乘虛入於血室若晝日讞語爲邪客於府與陽爭也此晝日明了暮則讞語如見鬼狀是邪不入府入於血室與陰爭也陽盛讞語則宜下此熱入血室不可與下藥犯其胃氣熱入血室血結寒熱者與小柴

胡湯散邪發汗此雖熱入血室而不留結不可與發汗藥犯其上焦熱入血室胃脇滿如結胃狀者可刺期門此雖熱入血室而無滿結不可刺期門犯其中焦必自愈者以經行則熱隨血去血下也已則邪熱悉除而愈矣所為發汗為犯上焦者發汗則動衛氣衛氣出上焦故也刺期門為犯中焦者刺期門則動榮氣榮氣出中焦故也脈經曰無犯胃傷寒六七日氣及上二焦必自愈豈謂藥不謂針耶傷寒六七日發熱微惡寒支節煩疼微嘔心下支結外證未去者柴胡桂枝湯主之

傷寒六七日邪當傳裏之時支散也嘔而心下結者裏證也法當攻

裏發熱微惡寒支節煩疼為外證未去不可攻裏與柴胡桂枝湯以和解之

傷寒五六日

已發汗而復下之胃脇滿微結小便不利渴而不嘔

但頭汗出往來寒熱心煩者此為未解也柴胡桂枝

乾薑湯主之

傷寒五六日已經汗下之後則邪當解今胃脇滿微結小便不利渴而不嘔但

頭汗出往來寒熱心煩者即邪氣猶在半表半裏之間爲未解也胃脇滿微結寒熱心煩者邪在半表半裏之間也小便不利而渴者汗下後亡津液內燥也若熱消津液令小便不利而渴者其人必嘔今渴而不嘔知非裏熱也傷寒汗出則和今但頭汗出而餘處無汗者津液不足而陽虛於上也與柴胡桂枝乾薑湯以解表裏之邪復津液而助陽也

柴胡桂枝乾薑湯方

柴胡

半斤味苦平

桂枝

三兩去皮味辛熱

乾薑

二兩味辛熱

枳實

四兩味苦寒

黃芩

三兩味苦寒

牡蠣

二兩熬味鹹寒

甘草

二兩炙味甘平

內經曰熱淫於內以苦發之柴胡黃芩之苦以解傳裏之邪辛甘發散爲陽桂枝甘草之辛甘以散在表之邪鹹以熅之牡蠣之鹹以消胃脇之滿辛以潤之乾薑之辛以固陽虛之汗津液不足而爲

傷寒論 卷四
渴苦以堅之括蕞
之苦以生津液

右柴味以水壹斗貳升煮取陸升去滓再煎取叁

升溫服壹升日叁服初服微煩復服汗出便愈

傷寒五六日頭汗出微惡寒手足冷心下滿口不欲

食大便鞭脈細者此爲陽微結必有表復有裏也脈

沉亦在裏也汗出爲陽微假令純陰結不得復有外

證悉入在裏此爲半在裏半在外也脈雖沈緊不得

爲少陰病所以然者陰不得有汗今頭汗出故知非

少陰也可與小柴胡湯設不了了者得屎而解傷寒五六

日邪當傳裏之時頭汗出微惡寒者表仍未解也手足冷心下滿口不欲食大便鞭脈細者邪結於裏也