

山居本草

四



山居本草卷三下目錄

菜部 下

椿芽

綱目作椿樗
白皮及根

葉

槐芽

苗葉
皮莖
根白皮

枝木
槐膠

花子

榆芽

白皮
花子
莢仁

蕪荑

木槿

苗皮根

五加苗

根皮

皂莢芽

莢子
木皮根皮
刺葉
附肥

皂莢子

櫻櫚

俗作棕
花子
笋皮

馬蘭

根葉

香薷


荆芥

紫蘇

子

水蘇

薄荷



牛膝 莖葉

决明 附蒞蒞

夏枯草

昆布

蒲公英

苦茄 子根

苦瓜 子

敗瓢

黃瓜

菜瓜

紫苑

益母草

紅花 子苗

百部

茄 蒂花根莖葉

苦瓠 瓢及子花蔓

壺盧 葉蔓鬚花子

王瓜 根子

絲瓜 葉藤根

南瓜

冬瓜

瓢子

瓜皮

花椒

綱目作秦椒載在果部味既辛辣不能以果常用且嫩可作茹蔬氣復芳香堪入食料今

入菜部餘俱倣此

川椒

椒目

野椒

蔓椒

根

地椒

胡椒

大茴

小茴

畢澄茄

吳茱萸

葉枝

食茱萸

鹽麩子

樹皮 附錄咸平樹根白皮及

酸角 附百藥煎 鹹草

附五倍子

川芎苗

附川芎

桂心

附牡桂



甘草

豆藿

豆芽

豆莢

豆腐

罌粟苗

俱見穀部

芡莖

菱莖

砂仁

胡桃

俱見果部



山居本草卷三下

新安程履新德基甫述

男

光緒梅壑甫
光經通五甫

校

菜部下

椿芽

綱目作椿樗。香者為椿。臭者為樗。二樹相似。南北皆有。但椿木實而葉香。可茹。作素菜甚佳。樗木疎而氣

臭。最為無用。但嫩芽淪食。消風祛毒。俗名香椿。芽嫩辛能同椿多壽耳。

動風。不宜與猪肉熱麪頻食。同豆腐炒茹極佳。

良白禿無髮取桃楸葉心同搗塗之白皮及根皮

刮去粗皮

陰乾。臨時切焙用。

性溫味苦澀。主治赤白濁赤白帶赤白久痢。

精滑夢遺燥下濕去肺胃陳積之痰去口鼻疳蟲殺虻

蟲疥蠱。鬼疰傳尸。蠱毒下血。止女子血崩。產後血不止。

腸血瀉。血不住。腸滑瀉。縮小便。蜜炙用。

附方 去鬼氣

樗根一握。細切。以童兒小便二升。豉一宿。絞汁。煎一沸。三五日一度服之。

小兒疳疾

椿白皮。日乾二兩。為末。以粟米淘淨。研濃汁。和丸。梧子大。十歲三四丸。米飲下。量大加減。

仍以一丸。納竹筒中。吹入鼻內。三度良。

小兒疳痢

困重者。用樗白皮。搗粉。以水和棗。作大饅。餽子。

日曬少時。又搗如此三遍。以水煮熟。空肚吞七枚。重者。

不過七服。忌油膩熱麪毒物。又方。用樗根濃汁。一蜺。

穀和粟米。泔等分。灌下部。再度。即瘥。其驗如神。大人亦宜。

休息痢疾

日夜無度。腥臭。不可近。臍腹撮。

痛。東垣脾胃論。用椿根白皮。訶黎勒。各半兩。母丁香三。

十箇。為末。醋糊丸。梧子大。每服五十丸。米飲下。唐瑤。

經驗方。用椿根白皮。東南行者。長流水內。漂三日。去黃。皮。焙為末。每一兩。加木香二錢。粳米飯為丸。每服一錢。二分。空腹。水穀下利。及每至立秋前後。即患痢。兼腰痛。米飲下。取樗根一大兩。荷篩。以好麪捻作。



鮮飽。如皂子大。水煮熟。每日下利清血。腹中刺痛。梧根

醋糊丸。梧子大。每空心米飲下。臟毒下痢。赤白。用香

三四。十丸。一加蒼朮。枳殼減半。臟毒下痢。洗刮取皮。百

乾為末。米飲。臟毒下血。溫白。用梧根白皮去粗皮。酒

酒服一錢。立效。下血經年。梧根二錢。水一盞。煎七分。人

酒糊丸。亦可。下血經年。酒半盞。服。或作丸服。虛者加

人參等分。血痢下血。臘月。日未出。特取背陰地。北引。梧

卽虎眼樹。根皮。東流水洗淨。掛風處陰乾。為

末。每二兩。入寒食麴一兩。新汲水丸。梧子大。陰乾。每服

三十丸。水煮滾。傾出。溫水送下。忌見日。則無效。名如神

脾毒腸風

因營衛虛弱。風氣襲之。熱氣乘之。血滲腸

四兩。蒼朮。米泔浸。焙。候穀麴炒。各一兩。為末。醋

糊丸。如梧子大。每服五十丸。米飲下。日三服。產後腸

脫。不能收拾者。梧枝取皮。焙乾。一握。水五升。連根葱五

則再熱。一服。可作五次用。洗後睡。少時忌鹽酢醬。女人

白帶 椿根白皮滑石等分爲末。粥丸梧子大。每空腹白湯下一百丸。 又方。椿根白皮一兩半。乾薑炒黑。

白芍藥炒黑。黃蘗炒黑。各二錢。爲末。如上法丸服。男子白濁。上方同。

莢 一名鳳眼草。 主治。大便下血。

槐芽苗葉性平。味甘微苦。嫩時採。茹治諸風邪氣。產難絕。

傷及癰疹。牙齒諸病。煎湯治驚癇壯熱。疥癬及丁腫皮。

莖同功。 一名懷音懷處處有之。木高大。初生嫩芽可療。熱水淘過食。亦可作飲。代茶。或採槐子種畦中。

採苗食亦佳。子可染皂。

附方霍亂煩悶 槐葉桑葉各一錢。炙甘草三分。水煎服之。 腸風痔疾 用槐葉一觔。蒸

熟晒乾研末。煎飲。 鼻氣窒塞 以水五升。煮槐葉取三代茶。久服明目。 鼻氣窒塞 升下葱豉調和。再煎飲。

枝煎水洗瘡及陰囊下淫痒。八月斷大枝。候生嫩芽。煮。



汁釀酒療大風痿痺甚效。治赤目崩漏。炮熱熨蝎毒。青枝燒瀝塗癰。煨黑揩牙去蟲。煎湯洗痔核。燒灰沐頭長髮。

附方風熱牙痛

槐枝燒熱烙之

胎赤風眼

槐木枝如馬鞭太長二尺作二段齊頭麻

油一匙置銅鉢中晨使童子一人以其木研之至瞑乃止令仰臥以塗目日三度瘥

九種心痛

太當

歲上取新生槐枝一握去兩頭用水三大升煎取一升頓服

崩中赤白

不問遠近取槐枝燒灰食

煎酒下方寸匕日二服

胎動欲產

日月未足者取槐樹東引枝令孕婦手把之即易生

陰瘡

溼痒

槐樹北面不見日枝煎水洗三五遍令再暖之

木皮

根白皮

主治爛瘡喉痺寒熱煮汁服治下血煮汁

淋陰囊墜腫氣痛煮漿水漱口齒風疳蠱血治中風皮

膚不仁。浴男子陰疝卵腫。浸洗五痔。一切惡瘡。婦人產

門痒痛。及湯火瘡。煎膏止疼。長肉消癰腫。

附方中風身直

不得屈伸。反復者。取槐皮黃白者。切以酒或水六升。煮取二升。稍稍服之。

破傷中風

避陰槐枝上。皮旋刻一片。安傷處。用艾灸皮上。百壯。下痛者。灸至痛。痛者。灸至不痛。用手

摩之。風蟲牙痛

槐樹白皮一握。切以酪一陰下溼痒。槐白皮炒。升。煮去滓。入鹽少許。含漱。

煎水

痔瘡有蟲。作痒。或下膿血。多取槐白皮濃煮汁。先日洗。瘡愈。仍以皮為蠅。蠅惡瘡。槐白皮醋浸。未。綿裹。納下部中。蠅。蠅惡瘡。槐白皮醋浸。半日洗之。

槐膠主治一切風化涎。肝臟風。筋脉抽掣。及急風口噤

或四肢不收。頑痺。或毒風周身如蟲行。或破傷風口眼

偏斜。腰背強硬。任作湯散。丸煎。雜諸藥用之。亦可。水煮



和藥爲丸。煨熱綿裹塞耳。治風熱聾閉。

槐耳已見
菜部

花未開時採收。陳久者良。入藥炒用。染物以
水煮一沸出之。其稠渣爲餚。染色更鮮明。性涼。味苦。

主治涼大腸。清五痔。心痛。眼赤。殺腹臟蟲。及皮膚風熱。
腸風瀉血。赤白痢。金炒研服。炒香頻嚼。治失音及喉痺。

吐血。血衄。崩中。漏下。

附方 衄血不止槐花烏賊魚骨等分。半生半炒。爲末吹之。 舌衄出血槐花末

止吐血不止槐花燒存性。入麝香少。 咯血唾血槐花炒

三錢糯米飲下。許研勻。糯米飲下三錢。 小便尿血槐花炒。金煨。各一兩。爲末。每服二錢。淡豉湯下。立效。

大腸下血經方用槐花荆芥穗等分。爲末。酒服一錢。集簡方用柏葉三錢。槐花六錢。煎湯日

服。袖珍方。用槐花枳殼等分。暴熱下血。洗淨控乾。一條

炒存性。為末。新汲水服二錢。炒槐花末。填滿札定。米醋炒。鍋內煮爛。搗九。酒毒出

罨子大。日乾。每服一丸。空心常歸煎酒化下。槐花半生。半炒。一兩。山梔子。臟毒下血。新槐花炒研。服三錢。日三服。

或用槐白。婦人漏血。不止。槐花燒存性。研。每皮煎湯服。血崩不止。

槐花三兩。黃芩二兩。為末。每服半兩。酒一盞。中風失

秤。鍾一枚。桑柴火燒紅。浸人酒內。調服。忌口。音。後炒槐花。三更。癰疽發背。凡人中熱毒。眼花頭運。口乾

有紅暈。在背後者。即取槐花子一大抄。鐵杓炒。褐色。以好酒一盞。汗之。乘熱飲酒。一汗即愈。如未退。再炒。一服

極効。縱成膿者。亦無不愈。彭楊梅毒瘡。乃陽明積熱所

幸菴云。此方三十年屢効者。外痔長寸。并用槐花煎湯頻洗。疥

炒。入酒二盞。煎十餘沸。熱服。胃虛寒者勿用。瘡腫毒。槐花微炒。核桃仁二兩。無灰酒一鍾。煎十餘沸。



熱服。未成者二三服。發背散血。槐花綠豆粉各一升。同炒象牙色。研末用細茶。

已成者一二服。見效。一兩煎一盞。露一夜。調末三錢。傳之。留頭勿犯婦女手。下血血崩。槐花一兩。櫻桃五錢。鹽一錢。水。

三鍾煎。白帶不止。槐花炒。牡蠣煨。等分。為減半服。末。每酒服三錢。取效。

子。按太清草木方云。槐者。虛星之精。十月上巳日。採子服之。去百病。長生。又庾肩吾常服槐子。年七十餘。鬚

髮皆黑。目看細字。亦其驗也。古方以子。冬月入牛胆中。漬之。陰乾百日。每食後吞一枚。云久服明目通神。白髮

還黑。有痔及下血者。九宜服之。雷公炮製云。性寒味苦。取兩子。三子者。槌碎牛乳浸一宿。蒸過用。

主治疎導風熱。口齒風涼。大腸潤肝。燦五內邪熱。止涎

垂。補絕傷。久服明目益氣。頭不白。延年。治五痔瘡。瘻以

七月七日取之。擣汁。銅器盛之。日煎令可為丸。如鼠屎

狀。納竅中。日三易。乃愈。治大熱難產。催生。吞七粒。并墮



胎殺蟲去風合房陰乾煮飲明目除熱淚頭腦心胸開

熱風煩悶風眩欲倒心頭吐涎如醉治丈夫人陰瘡

溼痒乳癰子臟急痛

附方槐角丸

治五種腸風瀉血糞前有血各外痔糞後有血各內痔大腸不收各脫肛穀道四面

弩肉如爛各舉痔頭上有孔各瘻瘡內有蟲各蟲痔並

皆治之槐角去梗炒一兩地榆當歸酒焙防風黃芩枳

殼麩炒各半兩為末酒糊丸大腸脫肛槐角槐花各等

梧子大每服五十九米飲下分炒為末用羊

血蘸藥炙熟食之以酒送內痔外痔許仁則方用槐角

下猪腰子去皮蘸炙亦可子一斗煮汁晒稠

取地膽為末同煎丸梧子大每飲服十九兼

作挺子納下部或以苦參末代地膽亦可日熱昏暗

槐子黃連二兩為末蜜丸梧子大熱心悶槐子燒末酒

大每漿水下二十九日二服服方寸七

榆芽

又名零榆白者名粉處處有之有數十種今人不能盡別惟知莢榆白榆刺榆榔榆數者而已莢榆白榆



皆大榆也。枝條生莢如錢成串。俗呼榆錢。可作羹。亦可
收至冬。釀酒。瀹過。晒乾。可為醬。即榆仁醬也。山榆之
名蕪荑。與此相近。但味稍苦耳。
荒歲人取皮為粉。食之當糧。

嫩葉作羹。及燉食。消水

腫利小便。下石淋。壓丹石。

時珍曰。晒乾為末。淡鹽水拌。或炙。或晒乾。拌菜食之。辛滑。

下水

煎汁洗酒皴鼻。同棗仁等分蜜丸。治膽熱勞不眠

白皮。性平。味甘滑利。主治利竅。滲溼熱。行津液。消癰腫。

除邪氣。大小便不通。腸胃邪熱。氣通經脉。滑胎。利五淋。

治齁喘不眠。搗涎傳瘡癰。小兒頭瘡。痂死。生皮。擣和三

年醋滓。封暴患赤腫。女人妬乳腫。日六七易效。

附方。斷穀不饑。

榆皮。檀皮。為末。日服數合。

齁喘不止。

榆白皮。陰乾。焙為末。每旦夜用。

水五合。末二錢。煎如膠服。

久嗽欲死。

許明則有効方。用厚榆皮。削如指大。長八餘。納喉中。頻出入。當

吐膿血。而愈。虛勞白濁。榆白皮二升。水二斗。煮取五升。分五服。小便氣淋。榆枝

子煎水。五淋澀痛。榆白皮陰乾焙研。每以二錢。水五合。煎如膠。日二服。渴而尿多。

非淋也。用榆皮二片。去黑皮。以水一斗。煮取五升。一服三合。日三服。身體暴腫。榆皮搗末。同米作粥。

食之。小臨月易產。榆皮焙為末。臨月三日。服方寸七。令產極易。墮胎下血。止。

榆白皮。當歸。焙。各半。兩。入生薑水煎服之。胎死腹中。或母病欲下胎。榆白皮煮汁服二升。身首

生瘡。榆白皮末。油和。火灼爛瘡。榆白皮嚼塗之。五色丹毒。俗名

犯者多死。不可輕視。以榆白皮為末。雞子白和塗之。小兒蟲瘡。榆皮末。和猪脂塗。綿上覆之。蟲出立

癰疽發背。榆根白皮切。清水洗。搗極爛。和香油。傅之。留頭出氣。燥則以苦茶頻澗。不粘更換。新

者。將愈。以桑葉嚼爛。隨大。小兒瘰癧。榆白皮生搗如泥。封之。頻易。小

兒禿瘡。醋和榆白皮末。塗之。蟲當出。

