

主篇曰針灸之法有太乙人神周身血忌逐年尻神逐日人神
而其穴有禁針禁灸之論犯者其病難瘳理固然也但瘡瘍
氣血已傷肌肉已壞急宜迎而奪之順而取之非平人針灸
之比何忌之有外科精義云瘡瘍之證毒氣無從而解膿瘀
無從而泄反攻於內內既消敗欲望其生豈可得乎危惡之
證發於致命之所禍在反掌腹癰囊癰二便不通胸腹脹悶
唇疔喉痹咽喉腫塞其禍尤速患者審之

鄰人蘇子遇之內左手指患疔麻痒寒熱惡心左半體皆麻脉
數不時見余曰凡瘡不宜不痛不宜大痛煩悶者不治今作

麻痺尤其惡也用奪命丹二服不應又用解毒之劑麻痺始去乃作腫痛余曰勢雖危所喜作痛但毒氣無從而泄欲針之適值望日其家俱言鬼神不從勢愈腫甚余強針之諸證頓退又用解毒之劑其瘡乃愈

薛按

圍藥十五

內經云五臟不和則七竅不通六府不和則留結爲癰又云形傷痛氣傷腫此以臟腑不和而瘡發於外也明矣若塗貼寒涼豈能調和臟腑宣通氣血耶○若其腫痛熱渴脉滑數而有力證屬純陽者宜內用濟陰湯外用抑陽散則熱毒自解

瘀滯自散○若似腫非腫似痛非痛似潰不潰似赤不赤脉
洪數而無力屬半陰半陽者宜內用中和湯外用陰陽散則
氣血自和瘀滯自消○若微腫微痛或色黯不痛或堅硬不
潰脉雖洪大按之微細軟弱屬純陰者宜內服回陽湯外敷
抑陰散則脾胃自健陽氣自回也○丹溪曰敷貼之劑應酬
輕小熱證耳若不辨其陰證陽證之所由分而妄敷寒涼之
劑則迷塞腠理凝滯氣血毒反內攻而肉反死矣况運氣得
寒則不健瘀血得寒則不散敗肉得寒則不潰新肉得寒則
不生治者審焉

見外科樞要

立齋曰大抵瘡之起發潰斂皆血氣使然各人元氣虛實不同
有不能發出而死者有發出不能成膿而死者有成膿不能
腐潰而死者有腐潰不能收斂而死者敷貼之法但可應酬
輕小之證耳若血氣已竭其患必死不但敷貼不效且氣血
喜溫而惡寒腠理喜通而惡塞氣血因而愈滯腫患因而愈
盛邪氣因而愈深腐潰因而愈大怯弱之人取敗多矣况瘡
瘍乃七情相火或食膏粱或餌金石以傷陰血陽盛陰虛受
病於內而發於外若不別氣分血分陰陽虛實腐潰淺深卽
服藥尙有不能保生者可敷貼而已乎

施二守項右患一核用涼藥敷貼頸皆腫又敷之腫胤胸腋冷
應腹內不悟涼藥所致尙以爲毒盛形體困憊自分不起延
余治之見其敷藥處熱氣如霧急令去藥良久瘡色變赤刺
出膿血用托裏藥而愈○張侍御發背專用敷藥瘡黯不起
胸膈悶氣不能呼吸自分不治余用辛溫托裏藥而愈○一
男子臀癰腐潰肌肉不生用藥敷之肌肉四沿反硬予診之
脉澁而弱此氣血俱虛不能營於患處故敷涼藥反硬乃血
氣受寒凝結而非毒也用大補藥而愈○一男子患胸疽腫
高作痛腫處敷藥痛雖止而色變黯腫外作痛仍敷之肉色

亦黯喉內作痛不悟此爲涼藥所誤反盡頸敷之其頸皆潰而死○一男子因怒左脇腫一塊不作痛脉瀦而浮余曰此肝經邪火熾盛而真氣不足爲患宜培養血氣爲主彼以草藥敷貼遂致不救○王安人發背正潰時欲速效敷以草藥卽日而死○張宜人年踰六十患發背三日肉色不變頭如粟許肩背腫脉洪數寒熱飲冷予以人參敗毒散二劑及隔蒜灸五十餘壯毒大發背始輕再用托裏藥漸潰因血氣虛甚而作渴用參芪歸熟等藥而渴亦止彼欲速效乃自用草

藥罨患處毒氣復入遂不救

薛按

人癰瘍腫痛宜用圍藥敷治者惟降癰散爲第一無論陰毒陽毒皆所宜也

腐肉 十六

齊德之曰夫瘡瘍生於外皆由積熱蘊於內內經謂血熱肉敗榮衛不行必將爲膿留於節腠必將爲敗蓋瘡疽膿潰之時頭小未破瘡口未開或毒氣未出疼痛難忍所以立追蝕腐潰之法使毒氣外泄而不內攻惡肉易去好肉易生也若紙其瘡而血出不止者則未可絀於瘡上摻追蝕之藥待其熟可絀方絀若絀其瘡而痛應心根者亦不可強絀之誤觸其

瘡焮痛必倍變證不無不可不慎也若瘡癰膿成未破於上
薄皮剝起者卽當用破頭代針之劑安其上以膏貼之膿出
之後用搜膿化毒之藥取效如神矣若膿血未盡便用生肌
歛瘡之劑欲其早愈殊不知惡肉未盡其瘡早合後必再發
不可不慎也

立齋曰瘡癰之證膿成者當辨其生熟淺深肉死者當驗其腐
潰連脫余嘗治脉證虛弱者用托裏之藥則氣血壯而肉不
死脉證實熱者用清熱之劑則毒氣退而肉自生凡瘡聚於

筋骨之間肌肉之內皆因血氣虛弱用十全大補湯壯其脾

胃則未成者自散已成者自潰又何死肉之有若不大痛或
大痛或不赤或內膿不潰或外肉不癢乃血氣虛弱宜用桑
枝灸及十全大補加薑桂壯其陽氣則四畔卽消瘡頭卽腐
其毒自解又何待於針割若脾胃虛弱飲食少思用六君倍
加白朮壯其營氣則肌肉受毒者自潰已死者自活已潰者
自斂若初起或因尅伐或犯房事以致色黯而不痛者乃陽
氣脫陷變爲陰證也急用參附湯溫補回陽亦有可生○又
曰夫腐肉者惡肉也大凡癰疽瘡腫潰後若有腐肉凝滯者
必取之乃推陳致新之意若壯者筋骨強盛氣血充溢真能

勝邪或自去或自平不能爲害若年高怯弱之人血脈少肌
肉澁必迎而奪之順而取之是謂定禍亂以致太平設或留
而不去則有爛筋腐肉之患如劉大尹汪夫人取之及時而
新肉卽生得以全愈金工部鄭揮使取之失期大潰而斃予
嘗見腐肉旣去雖少壯者不補其氣血尙不能收斂若怯弱
者不取惡肉不補血氣未見其生也故古人曰壞肉惡於狼
虎毒於蜂蠆緩去之則戕賊性命信哉○又曰瘡瘍之證若
毒氣已結腫赤熾盛中央肉死黯黑者內用托裏健脾之劑
外用烏金膏塗之則黯處漸低赤處漸起至六七日間赤黯

之界自有裂紋如刀劃狀其黑漸潰若用鉞針利剪徐去猶
好須使不知疼痛不見鮮血爲善若膿未流利宜用針於紋
中引之若膿水已出腫痛仍作乃內筋間隔亦用針引之若
元氣虛弱誤服尅伐之劑患處不痛或肉死不潰者急溫補
脾胃亦有復生者後須純補脾胃庶能收斂此則不可妄用
針刀若誤用之以去肉出血使陽隨陰散是速其危也

一論外通用方

鉞頭散

外一四四

去腐管

代鉞膏

外一四五

潰頭

透骨丹

外一四三

潰頭

豬蹄湯

外一二五

洗腐

合時從證

十七

立齋曰經云諸痛痒瘡皆屬於心若腫赤煩躁發熱大痛飲冷
便秘作渴脉洪數實者爲純陽雖在嚴冬之時必用大苦寒
之劑以瀉熱毒若不腫不痛脉細皮寒瀉利腸鳴飲或不入
嘔吐無時手足厥冷是爲純陰雖在盛暑之時必用大辛溫
熱之劑以助陽氣不拘嚴寒盛暑但當合時從證若微腫微
痛似潰不潰時吐清膿者爲半陰半陽宜用辛熱之劑過和
胃氣此亦治陰陽法也經曰用寒遠寒用熱遠熱有假者反
之雖違其時必從其證若執常法無不誤矣○壬午仲冬金

臺一男子患腰痛誤服乾薑理中丸卽時口鼻出血煩躁發
狂入井而死○辛卯冬一吏患傷寒誤服附子藥一鐘下咽
發躁奔走跌死○夫盛暑之際附子薑桂三藥益用連進三
劑無事嚴冬時令三藥單用一味止進一劑者卽死可見
羅謙甫先生有舍時從證權宜用藥之妙余宗此法凡冬間
陰證如脉沉實洪數大便秘瘕煩躁或飲冷不絕者卽
用消黃苓連之劑攻之雖在夏令而脉見虛弱或浮大瘕不
潰膿清稀惡寒飲者卽用薑桂參芪之劑補之如脉見沉
澀不潰不痛作呃逆手足冷大便秘不實或噤利或腹痛更加

附子皆獲大效昧者反以爲非惑亂患人恪守常法必使冬
用溫熱夏用清涼以致誤人深可哀也

薛按

至元壬午五月二十八日王伯祿年逾五旬有七右臂膊腫甚
上至肩下至手指色變皮膚涼六脉沉細而微此乃脉證俱
寒余舉瘍醫孫彥和視之曰此乃附骨癰開發已遲以燔針
啟之膿清稀解次日肘下再開之加吃逆不止彥和與丁香
柿蒂散兩劑稍緩次日吃逆尤甚自利臍腹冷痛腹滿飲食
減少時發昏潰於左乳下黑盡處灸二十七壯又處托裏溫中

湯用乾薑附子木香沉香茴香羌活等藥咬咀一兩半欲與

服或者曰諸痛痒瘡瘍皆屬心火又當盛暑之時用乾薑附子可乎予應之曰理所當然不得不然內經曰脈細皮寒瀉利前後飲食不入此謂五虛况吃逆者胃中虛寒故也諸痛痒瘡瘍皆屬心火是言其定理也此證內外相反須當合時從證非大方辛熱之劑急治之則不能愈也遂投之諸證悉去飲食倍進瘡勢溫膿色正赤和復用五香湯數服後月餘平復噫守常者衆人之見知變者知者之能知常不知變因細事而取敗者亦多矣况乎醫哉

見羅氏衛生寶鑑

愚意羅先生以合時從證之法垂訓後人誠百世不磨之要道

也但時之遷變本所難知而證之幽顯尤不易識何也蓋常
人之所謂時者春夏秋冬之時也歲歲時常之主氣也誰不
得而知之而不知五六周環則長夏有寒溼之令三冬有炎
暑之權此則雖若合時而實以從時昧者固能知此乎又如
察證之法則凡脉細皮寒泄瀉厥冷之類是皆已見之寒證
也又誰不得而知之不知其來有源其甚有漸卽諸證未見
之前而本來已具此際便難錯認使必待焦頭爛額而後曲
突徙薪則已晚矣此羅先生之所以明已然而余則更爲慮
未然蓋恐人之見之遲而無及於事也雖然余常見今人之

於已然者尙不能見而徇欲其見未然誠哉迂矣然余慨然之念則不能不遵其詳而深望於知音者

陽氣脫陷

十八

立齋曰瘡瘍陽氣脫陷或因尅伐之劑或因膿血大泄或因吐瀉之後或因誤以入房大凡潰後勞後元氣虧損或夢遺精脫或脉數便血或外邪乘虛而入以致發熱頭痛小便淋瀝或目赤煩喘氣短頭暈體倦熱渴意欲飲水投水身熱增寒惡衣揚手擲足腰背反張鄭聲自汗脉浮洪大此無根虛火之假熱證也若畏寒頭痛欬逆嘔吐耳聾目矇小便自遺瀉