

潔古黃芪湯

治小兒咳嗽喘逆身熱鼻乾燥

者是熱入肺經為客熱呬呀有聲

黃芪 貳兩

人參 貳錢半

地骨皮 伍錢

桑白皮 叁錢

甘草 貳錢半

右呬咀水煎放溫頻頻服之

海藏加味四君子湯

治涎嗽

人參

白朮

白茯苓

甘草

杏仁

桑白皮 各等分

半夏麴 減半

水煎服

又治咳嗽用四君子末煎紫蘇湯調下

張渙蟬殼湯

治肺氣不利病

蟬殼

微炒

五味子

湯洗米  
次焙乾

人參

去蘆  
各壹兩

陳橘皮

湯浸去  
白焙乾

甘草

炙各  
半兩

右件搗羅為細末每服半錢煎生薑湯調下

白朮五味湯方治欬逆氣逆上喘

五味子

白朮

丁香

人參

去蘆  
頭

款冬花

各半  
兩

細辛

去土  
壹分

右件搗羅為細末每服一錢水八分入生薑二片

煎至四分去滓放溫令時時呷之

參平肺散

治心火剋肺咳嗽喘嘔痰涎壅盛胸

膈痞滿

人參

橘紅

甘草

地骨皮各伍分

茯苓

知母

炒各柒分

五味子

炒

天門冬

去心

青皮

各肆分

桑白皮

炒壹錢

石每服一二錢水煎

**酸澀**

細辛五味子湯

治肺經不足胃氣怯弱或冒

風邪或停寒有飲咳嗽倚息不得安卧胸滿短氣

乾嘔作熱嗽唾結痰或吐涎沫頭目昏眩身體疼

重語聲不出痛引胸脇不問新久並宜服之

細辛

去苗土

半夏

湯泡各壹兩

鴛粟殼

去蒂蓋炒



五味子

各參兩

烏梅

去核

甘草

炙各壹兩半

桑白皮

炒陸錢

右剉散每服二錢水一盞生薑五片煎至六分去

滓溫服

**分經**

黃芩半夏生薑湯

治膽腑欬嘔苦水若膽汁

黃芩

生薑

各壹錢

甘草

炙

芍藥

各陸分

大棗

貳箇

半夏

壹錢伍分

右水煎服

甘桔湯

治心臟咳而喉中如梗甚則咽腫喉痺

粉草

苦梗

各壹錢

右水煎食後服



芍藥甘草湯 治小腸膀胱咳而失氣

芍藥

甘草

炙各壹錢

右水煎服

升麻湯 治脾臟咳而右脇下痛痛引肩背甚則

不可以動動則欬涎

方見傷寒

烏梅丸 治胃腑咳而嘔嘔甚則長蟲出

烏梅

參拾箇

細辛

附子

製

桂枝

人參

黃蘗

各陸錢

乾薑

黃連

各壹兩

當歸

蜀椒

各肆兩

右爲末用酒浸烏梅一宿去核蒸之與米飯搗和

九如桐子大每服十丸白湯下

赤石脂禹餘糧湯

治大腸咳而遺屎

赤石脂

禹餘糧

各貳兩  
並打碎

右每服二錢水煎

麻黃附子細辛湯

治腎臟咳咳則腰背相引而痛

甚則咳涎又治寒邪犯齒致腦齒痛宜急用之緩則不救

麻黃

細辛

各貳錢

附子

壹錢

右每服一錢水煎

茯苓甘草湯

治肺咳而遺溺

茯苓 貳錢

桂枝 貳錢

生薑 伍大

右每服二錢水煎

**百晬內嗽**

此名乳嗽實難調理亦惡證也當審虛實

而施治焉實者散之虛者補之其證氣麤痰盛口瘡

眼熱發散後可利之比金圓

驚癩

等藥主之散其實也

其證嘔吐嗽後驚悸困倦自汗者當用補肺散益黃

散天麻散補其虛也大抵治驚嗽琥珀散主之天麻

圓乃要藥也用天麻蟬退殭蠶人參川芎甘草礪砂

天竺黃膽製南星白附子煨雄黃金箔末之煉蜜圓

如雞頭大金箔為衣每服一圓薄荷湯化下治未滿



百啐咳嗽不止遠勝諸藥

曾百日内嬰孩偶咳嗽

痰壅睡中不寧亦因產後感風而得但不可過用發

散之劑先以解表散見前一二服次投貝母湯及惺惺

散治薛若脾胃內熱者用抱龍丸驚風邪外感者

用惺惺散痘初熱痰熱既去而氣粗痰盛或流涎者脾

肺氣虛也用異功散吐瀉加桔梗口瘡眼熱大便堅實

者用三黃丸裏熱大便不實者用白朮散渴若嘔吐不

乳困倦自汗或自利腹脹者脾胃氣虛也用六君子

吐瀉加柴胡若驚悸困倦痰盛不乳者心脾血虛也四

君吐瀉加芎歸酸棗仁或因乳母食五辛厚味致兒爲

患者仍參喘嗽諸證

補肺散又名阿膠散治小兒久患咳嗽氣急有痰惡心喘

虛見前

天麻散 治嬰兒咳嗽有痰氣壅面紅

南星水浸春秋五日冬七月夏三日半兩

天麻叁錢

辰砂壹錢 麝香壹字

右為末每服一字用杏仁湯調下人參湯亦可

天麻圓 治小兒未滿百晬咳嗽不止名曰乳嗽

天麻 蟬蛻 僵蠶

人參各壹錢 川芎壹錢半 甘草貳錢

鵬砂

半錢

辰砂

天竺黃

牛膽南星

各貳錢

白附子

坯

雄黃

各壹錢

金箔

伍片

右為末煉蜜圓如芡實大金箔為衣每服一圓厚

荷湯化下

琥珀散

治急慢驚風涎潮昏冒目瞪驚搐內釣腹

痛或驚癇時發

辰砂

壹錢半

琥珀

牛黃

僵蠶

炒去絲嘴

牛膽南星

金錫

白附子

代赭石

天麻



乳香

蟬殼

各壹錢

右為末每服一二分白湯調下

貝母湯

主百日內嬰孩咳嗽有痰

貝母

壹兩

甘草

半炙半生  
貳錢

右件剉焙為末每服一字或半錢用陳米煎湯空心調服痰盛淡薑湯調下

惺惺散

主傷風傷寒痰嗽咳逆理虛和氣寧心清

肌止啼去煩利咽解失音

人參

去蘆半兩

桔梗

剉炒

白茯苓

去皮

白朮

天花粉

肆味各壹兩

細辛

去葉貳錢

防風

去蘆

川芎

南星

生用 各貳錢半

甘草

半生半炙 朱錢

右件咬咀每服二錢水一盞薑二片薄荷三葉慢

火煎七分無時溫服

外臺小品療少小十日以上至五十日卒得暴欬吐

乳嘔逆晝夜不得息四物湯

桔梗

紫苑

各參分

甘草

炙壹分

麥門冬

去心 朱分

右藥切以水一升煮取六合去滓分五服以差為

度千金有桂心無桔梗以水二升煮取一升以繼

着湯中捉綿滴兒口中晝夜四五過節即乳

張煥雄黃膏 治月裏兒欬嗽并三歲已下皆可服

雄黃 壹錢 細研

杏仁 柴粒去 皮尖

半夏 柴箇童子 小便浸一

宿切作片子 焙乾為末

右一處研勻用生薑自然汁半兩蜜半兩一處入藥末於罐子內重湯中熬用柳枝子攪成膏每服一皂子大塗妳頭與兒吮或糯米飲調下

趙氏治小兒未晬欬嗽方

白殭蠶 直者

右為細末塗少許妳頭上令兒喫立效



**嗽膿血**

錢氏曰有喘而咯膿血者乃肺熱食後服甘

桔湯

久嗽者肺亡津液阿膠散主之

即補肺散見前

咳

而痰實不甚喘而面赤飲水者徧銀丸下之

方見前

段齋郎子四歲病嗽身熱吐痰數日而咯血前醫以

桔梗湯及防已丸治之不愈涎上攻吐喘不止請錢

氏下徧銀丸一大服復以補肺湯補肺散治之或問

段氏子咯血肺虛何以下之錢曰肺雖咯血有熱故

也久則虛痿今涎上潮而吐當下其涎若不吐涎則

不甚便蓋吐涎能虛又生驚也痰實上攻亦能發搐

故依法只宜先下痰而後補脾肺必涎止而吐愈為

順治也若先補具肺為逆耳此所謂識病之輕重

後為治也  
甘桔散

桔梗

米泔浸一宿焙乾

甘草

炒各貳兩

右為細末每服一大錢水一大盞入阿膠半兩炮煎至五分食後溫服  
海甘桔湯仲景少陰咽痛藥也孫真人治肺癰吐膿血用生甘草加減二十餘條

王氏手集解肌丸

治外搏風邪內挾痰飲寒熱往

來煩渴頰赤心忪減食熱在上焦咳嗽有血方

防風

地骨皮

各壹分

右件燒沙糖為圓每服一丸食後煎紫蘇湯下

團參丸

治嗽血

阿膠

皂子黃

人參

各半兩

右除膠為細末湯少許洋膠和鷄頭大白湯化下

雞清散

朱氏

治欬嗽出血下涎

鬱金

半兩用皂莢漿水壹盞或酸棗汁亦得煮乾為度

滑石

半兩生

雄黃

半兩醋煮半乾用

右為細末每服一字常服薄荷湯調下止嗽螺粉

水下嗽血鷄子清調下



聖惠夫小兒嗽而呀呷作聲者由胸膈

痰多嗽動於痰上搏於咽喉之間痰與氣相擊隨嗽動息呀呷有聲其咳嗽本體雖同至於治療則加消痰破飲之藥以此為異

聖惠射干散 治小兒咳嗽心胸痰壅攻咽喉作呀

呷聲

射干

麻黃

去根節

紫苑

洗去苗土

桂心

已上各半兩

半夏

半分湯洗七遍去滑

甘草

炙微赤

右件藥搗麤羅為散每服一錢以水一小盞入生薑少許煎至五分去滓入蜜半茶匙攪令勻不計