

文
式

風
下

寒

暑

濕

紅散

宣明方治風熱上攻陽明經絡面鼻紫色風刺

癰疹俗呼肺風者以肺主鼻而又淺在皮膚之內

皮膚主肺

船上硫黃

白礬 灰各半兩

右為末少許入黃丹染與病人面色同每上半錢

津液調塗之洗嗽罷臨卧服防風通聖散効速

羌活散

和濟方治風氣不調頭目昏眩痰涎壅滯遍身

拘急及風邪寒痺頭痛項強鼻塞声重肢節煩疼

天陰風雨預覺不安

前胡 去芦

羌活 去芦

麻黃

去根節 先煎去沫

白茯苓 去皮

川芎

黃芩

甘草 燼

曼荊子 去白皮

枳殼 去穢 炒

細辛 去苗

石膏 別研

菊花 去梗 藹

防風 去芦 各二兩

右咬咀每服一兩姜四片薄荷三葉水二盞煎至

一盞去滓溫服食後

省風湯

和濟方 治卒急中風口噤全不能言口眼喎

斜筋脉牽急抽掣疼痛風盛痰實旋暈僵仆頭目
眩重胃膈煩滿左癱右瘓手足麻痺骨節煩疼步
履艱辛恍惚不定神志昏憤應一切風證可服

防風 去芦

天南星 生各四兩 半夏 好白者水浸洗

甘草 生

黃芩 去粗皮 各二兩

右咬咀每服一兩水二盞生姜十片煎至一盞去渣溫服不拘時候

六味順氣散

濟生方凡有風之人先宜服此藥順氣次

進風藥

白朮

白茯苓去皮

青皮去白

陳皮去白

香白芷

天台烏藥

人參各一兩

甘草炙半兩

右咬咀每服五錢水一大盞煎至七分去渣溫服仍以酒化蘇合香丸間服蘇合香丸方見氣門

愈風丹

瑞竹方治諸風證偏正頭風

防風通聖散 四物湯方見婦人調經衆疾

黃連鮮毒湯方見傷寒各一料加

羌活

細辛去葉

甘菊花

天麻

獨活

薄荷

何首烏各二兩

本為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸細嚼茶酒任下不拘時候

天仙膏

仁存方治卒暴中風口眼喎斜

天南星大一個

白芨二錢

大草烏頭一個

姜蚕七個

右為末用生鱧魚血調成膏傅喎處覺正洗去

天南星膏

仁存方治証同前用天南星不以多少為末

生薑自然汁調攤紙上左啞貼右右貼左正洗去

治中風口啞灸法

仁存方以筆管五寸長插入耳內外

以麵塞四圍一頭以艾灸二七右啞灸左左啞灸右

又灸法

仁存方治口啞斜便効耳垂下用麥粒大艾

炷灸三壯左灸右右灸左

又治口啞

仁存方

牡礪

白礬

附子

伏龍肝

右為末用雄鷄冠血和塗敷右偏傳左左傳右覺正
便洗洗去遲又偏不復正也一方無白礬名聖散子

獨活湯

大全良方治風虛昏憤不自覺知手足痠癢

坐臥不能或發寒熱血虛不能服發汗藥及中風
自汗尤宜服之

川獨活

羌活

人參去芦

防風

當歸

細辛

茯苓去木

半夏湯洗

桂心

白薇

遠志去心

昌蒲去毛

川芎各五錢

甘草三分

右咬咀每服一兩水二盞生姜五片煎至八分去

渣食溫服

胡麻散

和劑方治脾肺風毒攻衝遍身皮膚瘙癢或

生瘡疥或生癰疹用手搔時浸淫成瘡久而不差

愈而復作面上遊風或如虫行紫白癡頑麻或腎
臟風攻注脚膝生瘡宜服

胡麻 十二兩

荊芥穗 八兩

苦參 八兩

何首烏 洗焙十兩

甘草 炙

威靈仙 各六兩

右為末每服二錢薄荷茶或酒或蜜湯調服藥後
頻頻浴自得汗出而立効

大秦朮湯 按粹方治中風外無六經之形証內無便

溺之阻隔知為血弱不能養於筋故手足不能運
化舌強不能言宜養血而筋自榮也

秦朮

石膏 各二兩

甘草

川芎

當歸

羌活

獨活

防風 去芦

黃芩

白芍藥

吳白芷

白朮

生地黄

熟地黄

白茯苓 各一兩

細辛 五錢

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓通口服

如天陰加生姜七八片如心下痞每兩加枳實一

錢煎枳實保命集作楮實

疎風湯

按粹方治半身不遂或肢体麻痺筋骨疼痛

麻黃 三兩去節

益智仁

杏仁 炒去皮各一兩

甘草

升麻 各五兩

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓通口服

脚登熱水研芳以大汗雲胡芦冬月不可



按粹方治諸風熱等證

防風

芍藥各兩半

石膏

黃芩

桔梗

熟地黄

天麻

人參

羌活

獨活各二兩

川芎

當歸各二兩半

滑石三兩

甘草二兩

白朮一兩三錢

連翹

荆芥穗

薄荷

麻黃

去根不去節各五錢

梔子六錢

色硝

黃連

大黃

黃柏

細辛

全蝎各五錢

右為末煉蜜為丸如彈子大每服一丸細嚼茶酒
任下臨卧服



按粹方治中風外有六經之形証先以加減

續命湯隨証治之內有便溺之阻隔復以此導之

厚朴製

大黃

枳實

羌活等分

右咬咀每服三兩水三升煎至一升半終日服之
以微利則已如內邪已除外邪已盡當復愈風湯
以行中道久服大風悉去縱有微邪只從愈風湯
加減治之然治病之法不可失於通塞或一氣之
微汗或一旬之通利如此為常治之法也久之清

濁自分榮衛自和矣

續命湯

按粹方內經曰人之氣以天地之疾風名

之故中風者非外來風邪乃本氣病也凡人年愈
四旬氣衰者多有此疾壯歲之際無有也若肥盛
則間有之亦形盛氣衰如此治法和臟腑通經絡
便是治風然輕重有三中血脉則口眼喎斜亦有
賊風襲虛傷之者也中腑則肢廢中臟則性命危
急此三者治各不同如中血脉外有六經之形證
則從小續命湯加減及踈風湯治之中腑內有便
溺之阻隔宜三化湯之類通利外無六經之形證
內無便溺之阻隔宜養血通氣大秦芎湯是活愈

風湯治之中臟痰涎昏冒宜至寶丹之類鎮墜若
中血脈中腑之病初不宜用龍麝牛黃為麝香治
痺入肉牛黃入肝治筋龍腦入腎治骨恐引風深
入骨髓如油入麵莫之能出又不可一槩用天戟
芫花甘遂瀉大腸大便損其陰血真氣愈虛知劑
方么此藥治中風半身不遂口眼喎斜手足戰掉
語言蹇澁

麻黃

去節

人參

去芦

黃芩

去腐

芍藥

甘草

炙

川芎

杏仁

去皮尖熬炒

防已

肉桂

各二兩

防風

兩半去芦

附子

炮去皮脂五錢

右吹咀每服一兩生姜三片水二盞煎至一盞去滓通口服始治中風不審六經之形證加減雖治與不治無異也開則洒然塞閉則熱而悶知暴中風邪宜先以加減續命湯隨證治之加減方例于後

麻黃續命湯

按粹方治中風無汗惡寒

麻黃

防風

杏仁

依本方加一倍宜針太陽經至陰出血豈論舉蹻

桂枝續命湯

按粹方治中風有汗惡風

桂枝

芍藥

杏仁

依本方加一倍宜針風府此二證太陽中風也

白虎續命湯

按粹方治中風身熱無汗惡寒

石膏

知母 一料中各加二兩

甘草

依本方加一倍

葛根黃芩湯

按粹方治中風身熱有汗不惡風

葛根

桂枝

黃芩

依本方加一倍宜針陷谷刺厲兌針陷谷者去陽
之賊也刺厲兌者瀉陽明之實也此二證陽明
中風也

附子續命湯

按粹方治中風無汗身涼

附子加一倍

乾姜加二兩

甘草加三兩

宜針隱白穴去太陰之賊也此一證太陰經中風也

桂附續命湯

按碎方 治中風有汗無熱

桂枝

附子

甘草

依本方加一倍宜針太谿此一證少陰經中風也

羌活連翹續命湯

按粹方

無此四證六經混有繫於

少陽厥陰或肢節攣痛或麻木不仁宜服

小續命八兩

羌活四兩

連翹六兩

右古之續命混有無經今立分經治療又分各經
針刺無不愈也治法厥陰之并大敦刺以通其經
少陽之經絕骨灸以引其熱此通經引熱是針灸
同象治法之大体也服法並如前

續命煮散

大全良方

治風氣留滯心中昏憤四肢無力

口眼瞶動或時搐搦亡失津液渴欲飲水此能扶
榮衛去虛風中風自汗及產後中風自汗尤宜服之

防風

獨活

當歸

人參

細辛

葛根

芍藥

川芎

甘草

熟地黄

遠志志

荊芥各五錢

官桂七錢半

半夏五錢

右咬咀每服一两生姜三片水二盞煎至一盞去

渣通口服不拘時候汗多不止者加牡蠣粉一錢半

防風湯

大全良方治卒然口眼喎斜言語牽急四肢如

故別無所苦