

10329

醫方集錦

卷

收 瀉 之 劑

滑則氣脫 脫則散而不收

可反

脫者可收也

如汗出亡陽

精滑不禁

泄痢不止

大便不固

小便自遺

久嗽亡津

此氣脫也



若亡血不已

崩中暴下

諸大吐血

此血脫也

十劑曰

清可去脫

牡蠣

龍骨之屬

是也

氣脫兼以氣藥

血脫兼以血藥

赤兼氣藥

氣者

血之帥也

陽脫者見鬼

陰脫者

月育

此神脫也

當補陽助陰

非瀉劑所能收也

金

州

月

初

赤石脂禹餘糧湯

治傷寒 服湯藥 下痢不止 心下痞鞭

服瀉心湯已復 以他藥下之 痢不止

醫以理中與之 痢益甚

理中者 理中焦 此痢在下焦

赤石脂禹餘糧湯 主之

下焦主分別清濁

復痢不止者

當利其小便

利小便所以實大腸也

△本方用

赤石脂

禹餘糧

等分

杵碎

益

此手陽用藥止

清可去脫

重可達下

批石脂

餘糧

之清

以止脫

重以

固下

甘

以益氣

李先知曰

下焦有病

人難會須

用

餘糧

石脂

少陰下痢

桃

治少陰病

二三月至一五月腹痛小便不利下利不止

下利不止便膿血者

花

成氏曰

陽明下痢便膿血者協熱也

少陰下痢腹痛便膿血者下焦不約而裏寒也

湯

凡下痢便膿血身冷脈小者亦治

身熱脈大者難治

仲景

本方用赤石脂干姜粳米一升

此之少陰藥也

李時珍曰

批赤石脂 之重瀉 入下焦血分而固脫

干薑 之辛溫 煖下焦氣分而補虛

粳米 之甘溫 佐石脂干姜而潤腸胃也

朱丹溪曰

桃花湯 主下焦血虛 且寒非干姜之溫

石脂 之重瀉 不能止血

用粳米之甘 以引入腸胃

淮繩曰

便膿血 熱勢下流也

成氏釋為裏寒非止

桃花湯 雖用干姜 然分兩最微

石脂 粳米 居多 以調正氣 濡滑脫

佐以干姜 用辛溫以散之 之義

諸便膿血 皆傳經之熱邪也

吳鶴皋曰

少陰 腎水 主禁固 二便為火所灼剋伐

大腸 庚金 故下利膿血

批 石脂 寒能勝熱 濡可收脫

用干姜者 假其辛熱 以從之治

用粳米者 恐石脂 性寒損胃也

聊攝之明 而猶昧此 况其下乎

程郊倩 曰

此症 終是火衰 不能生土 未可指為傳經之熱邪也

不知此而漫云

滲泄 腎防一徹 前後泄痢 而陽神陷矣

昂按 成氏

生于千載之後 而能昌明

仲景之書

使後學有所循人其功 非小亦何

後起之士 動輒非之

成氏之死 已久 豈能起而辨之其是非乎

而王肯堂

吳鶴皋

皆以為熱 竊為便膿血者 固多屬熱

然豈無下焦之寒_上虛

腸胃不同 而亦便膿血者乎

若以此為傳經熱邪 若

仲景 當用寒劑 以散其熱 而反用石脂固瀉之藥

使熱開于內 而不得泄 豈非閉門養盜

自貽伊戚也

邱觀仲景之治協熱痢

如甘草瀉心

生薑瀉心

白頭翁等湯

皆用 苓 連 黃 柏 而治下焦虛寒

下痢者 用 赤石脂禹餘糧湯 此類以觀斯可見矣

此症乃因虛以見寒

非大寒者 故不必用熱藥 惟用甘辛溫之劑以鎮固之耳

本草言 石脂 性溫 能益氣調中固下 未聞寒能損胃也

若准繩 則孰

凡傳經者 皆屬熱邪一語 遂以為熱耳

程郊倩

每以直中為寒

傳中為熱邪

古今相傳 二語竟未盡 然不為無見 若季未深造 而輕古人

訶

治虛寒泄瀉 米穀不化 腸鳴腹痛 脫肛及作膿血

日夜無度者

子

本方用

御米穀

去蒂 煨 五子

訶子

煨去核 五子

干姜

煨 六子

橘紅

五子

為末

空心服

散

此手近

陽明

病止

東垣

批

御米穀

酸澁微寒

固腎澁腸

訶子

酸澁

苦溫

收脫住瀉

炮姜

辛熱

能逐冷補陽

陳皮

辛溫

能升陽調氣以固氣脫

亦可收形脫也

如

泄瀉

氣脫

脫肛

為

形脫

河間訶子散

用

訶子一升半

生煨

木香

五分

甘草一分

黃連

三分

為末

每服

二升

引

白朮湯調下

治瀉久腹痛

漸以瀉下

治瀉久腹痛漸已瀉下漸少以此止之

如不止

加厚朴

竭其餘邪

木香

黃連

名

香連丸

行氣清火

止痢厚腸

甘草

芍藥

名
甘芍湯

甘緩

酸收

和中止痛

加訶子

清以水脫

加白朮

補以強脾

厚朴

除濕散滿 平胃調中

故更籍^之以去餘邪也