

S25-6

997

SS71
065

197



丹溪心法附錄卷之十二

風熱門

斑疹 五十九

丹溪心法

○斑屬風熱挾痰而作自裏而發於外通聖散中消息當以微汗散之切不可下 內傷斑者胃氣極虛一身火遊行於外所致宜補以降於陰証略例中求之 發斑以傷寒者痰熱之病發於外微汗以散之若下之非理 疹屬熱與痰在肺清肺六降痰或解散出汗亦有可下者 疹即瘡疹汗之即愈通聖散中消息之 瘡疹多屬脾隱隱然在皮膚之間故言隱疹也發則多痒或不仁者是兼風兼溫之殊色紅者兼火化也 黃底水調伏龍肝去紅點斑

戴云斑有色點而無頭粒者是也疹浮小有頭粒者隨出即收收則又出是也非若斑之無頭粒者當明辨之戴云斑有色點而無頭粒者是也疹浮小有頭粒者隨出即收收則又出是也非若斑之無頭粒者當明辨之附錄斑疹之病其為証各異瘡發燉腫于外者屬少陽三焦相火也謂之斑小紅屬行皮膚之中不出者屬少陰君火也謂之疹 又傷寒陽証發斑有四惟溫毒發斑至重紅赤者為胃熱也皆黑者胃爛也一則下早一則下之晚乃外感熱病發斑也以元參升麻白虎等藥服之 陰証發斑亦出背胛又出手足亦稀少而微紅若作熱証投之涼藥大誤矣此無根失守之火聚于胸中上獨薰肺傳于皮膚而為斑點但如蚊蚋虱蚤咬形壯非錦紋也只宜調中溫胃加以茴香芍藥或以大建中之類其火自下斑自消可謂治本而不治標也附諸方

玄參升麻湯 三因方 治傷寒失下熱毒在胃發癰或汗下吐後餘毒不散表虛裏實發於外甚則煩躁譫妄

右咬咀每服四錢水一鍾煎七分溫服溼毒發斑亦宜服之 玄參 升麻 甘草 各等分

陽毒升麻湯 活人方 治陽毒赤斑狂言咽喉痛出膿血 升麻 三分 犀角 射干 黃芩 人參 甘草 各等分

足本丹溪心法附錄 卷十二 風熱門 一 混江海左書局印行

右吹咀水二鍾煎至一鍾去滓溫服不拘時

梔子仁湯活人方治發斑煩燥面赤咽痛潮熱 梔子仁 赤芍藥 大青 知母各一兩 升麻 黃芩

石膏各二兩 甘草炙半兩 杏仁去皮尖 柴胡一兩 右吹咀每服四錢姜三片豉百粒水煎溫服

化癰湯 治傷寒汗吐下後癰發脈虛 人參 石膏 知母 甘草 守真加白朮一方加玄參

右吹咀時時煎服

黃連橘皮湯 治濕毒發癰

黃連去毛 陳橘皮 杏仁去皮 枳實 麻黃去節 葛根各二兩 厚樸製 甘草炙各一兩 右吹咀水煎服

調中湯 治內傷外感而發陰斑 蒼朮半錢 陳皮錢 砂仁 藿香 芍藥炒 甘草炙 桔梗 半夏

白芷 羌活 枳殼各一錢 川芎分五 麻黃 桂枝各五分 右吹咀姜三片水煎服

消毒犀角飲子 牛旁子錢六 荊芥 防風各三錢 甘草一錢 右吹咀水煎服

通聖散出丹溪經驗方 川芎 當歸 麻黃 薄荷 連翹 白芍各半兩 黃芩 石膏 桔梗各一兩

滑石三兩 荊芥 梔子 白朮各二錢半 甘草二兩

右剉水煎服 如身疼加蒼朮羌活 痰嗽加半夏每服細末三錢生姜三片搗細盪起煎沸服之

頭眩 六十

丹溪心法

○頭眩 痰挾氣虛併火 治痰為主挾補氣藥及降火藥 無痰則不作眩痰因火動又有溼痰者 溼痰

者多宜二陳湯火者加酒芩挾氣虛者相火也治痰為先挾氣藥降火藥如東垣半夏白朮天麻湯之類 眩

暈不可當者以大黃酒炒為末茶湯調下 火動其痰用二陳加黃芩蒼朮羌活散風行溼 左手脉數熱多

脉瀉有死血 右手脉實有痰積脉大是久病作久一病之人氣血俱虛而脉大痰濁不降也 昔有一老婦

患赤白帶一年半頭眩坐立不得睡之則安專治赤白帶帶愈其眩自安

附脉理

脉訣舉要曰風寒暑溼氣鬱生涎下虛上實皆暈而眩風浮寒緊溼細暑虛涎弦而滑虛脉則無

治眩暈法尤當審諦先理痰氣次隨證治

附諸方

獨活散楊氏家藏方消風化痰治頭目眩暈

細辛去葉一兩

石膏研

甘草炙各半兩

防風去芦

藁本去上

旋覆花

蔓荊子

川芎

獨活去葉各一兩

右為末每服二錢水一鍾姜三片煎至六分食後熱服

川芎散本事方

治風眩頭暈

山藥

甘菊花

人參

茯神

小川芎

各五錢

山茱萸肉

各一兩

右為末每服二錢酒調不拘時日三服不可悞用野菊花

芎朮湯濟生方

治胃雨中溼眩暈吐逆頭重不食

川芎

半夏

白朮

各一兩

甘草炙半兩

右

咀咀每服四錢水一鍾姜七片煎七分溫服不拘時

芎朮除眩湯直指方

治感寒溼頭目眩暈

甘草炙

川芎

附子

白朮

官桂等分

右

咀咀每服三錢姜七片水煎溫服食前

荊黃湯張子和方

治頭眩

大黃

荊芥穗

防風各等分

右

為粗末大作劑料水煎去滓服以利為度

芎辛湯濟生方

治風寒在腦或感邪溼頭重痛眩暈欬倒嘔吐不定並皆治之

川芎

一兩

細辛洗去土

白朮

甘草各半兩

右咀咀每服一兩姜五片茶芽少許水一鍾半煎八分臨卧溫服或食後服亦可

頭運方

利痰清氣降火

南星製五分

半夏一錢

桔梗七分

枳殼一錢

陳皮一錢

甘草三分

茯苓一錢

黃芩一分

右作一服姜七片水煎服食後

香橘飲

治氣虛眩暈

木香

白朮

半夏麴

橘皮

茯苓

砂仁各半兩

丁香

甘草炙二錢五分

右剉散水二鍾姜五片煎服加當歸川芎官桂治血虛眩暈

白附子丸 治風痰上厥眩運頭疼

全蝎炒半 白附子炮 南星炮 半夏 旋覆花 甘菊 天麻 川芎 橘紅 殭蚕炒 乾薑生各

右為末生薑半斤取汁打糊丸梧子大煎荊芥湯下五十九

人參前胡湯 治風痰頭運目眩

半夏 木香 枳殼炒 紫蘇 赤茯苓 南星炮 甘草炙各 人參三錢 前胡 橘紅各五錢

右剉散每服五錢姜五片水煎服

川芎茶調散 治風眩頭痛 見傷風

半夏白朮天麻湯 見頭痛

喝起散 大金良方 治婦人血風攻腦頭旋悶倒不知人事喝起草即蒼甘草也

右取嫩心不以多少陰乾為末每服二錢酒調下

黑錫丹 治早起眩暈須臾自定以為常此因老痰鬱痰所作必須此藥劫之 見痰類

○廣按頭眩之症多主於痰無痰則不作眩有因寒痰溼痰者有因熱痰風痰者有因氣虛挾痰者有因血虛挾痰者其症不一也夫寒痰溼痰作眩或因外感寒溼或因內傷生冷熱痰風痰作眩或因外感風暑或因內動七情氣虛眩暈或因脾虛不進飲食或因胃弱嘔吐泄瀉血虛眩暈男子每因吐血下血女人每因崩中產後而作也已上數方雖各有所主未能盡其變在智者擴充之也又嘗論之夫咳嗽頭痛頭眩三者乃病之標必治其病之本而病方已如產後眩暈只補其血如脾虛眩暈只補其氣是治其病之本也

○頭痛 六十一 附眉眶痛

丹溪心法

頭痛多主於痰痛甚者火多可有吐者可下者 清心膏治諸頭痛除血虛頭痛不可治 山東垣試效方 血



虛頭痛自魚尾上攻頭痛用芎歸湯古方有追涎藥

附諸賢論

王節齋曰久頭痛病略感風寒便發寒月須重綿厚帕包裹者此屬鬱熱本熱而標寒世人不識率用辛溫解散之藥暫時得効誤認為寒殊不知因其本有鬱熱毛竅常疎故風寒易入外寒束其內熱閉逆而為痛辛熱之藥雖能開通閉逆散其標之寒邪然必熱濟熱病本益深惡寒愈甚矣唯當瀉火涼血為主而佐以辛溫散表之劑以從治法治之則病可愈而根可除也

附脉理

脉訣舉要曰頭痛陽弦浮風緊寒風熱洪數溼細而堅氣虛頭痛雖弦必瀉痰厥則滑腎厥堅實

頭痛治例

心法附錄曰頭痛須用川芎如不愈各加引經藥

太陽川芎 陽明白芷 少陽柴胡 太陰蒼朮 少陰細辛 厥陰吳茱萸

如肥人頭痛是溼痰宜半夏蒼朮

如瘦人頭痛是熱宜酒製黃芩防風

如感冒頭痛宜防風羌活藁本白芷

如風熱在上頭痛宜天麻蔓荊子台芎酒製黃芩

如白人頭痛是氣虛宜黃芪酒洗生地黃南星秘藏安神湯

如形瘦蒼黑之人頭痛乃是血虛宜當歸川芎酒黃芩之類

如若頭痛用細辛

如頂顛痛宜藁本防風柴胡東垣云頂顛痛須用藁本去川芎

且如太陽頭痛惡風脉浮緊川芎羌活獨活麻黃之類為主

少陽頭痛脉弦細往來寒熱柴胡為主

陽明頭痛自汗發熱惡寒脉浮緩長實升麻葛根石膏白芷為主

太陰頭痛必有痰體重或腹痛脉沉緩以蒼朮半夏南星為主

少陰頭痛是寒氣逆為寒厥其脉沉細麻黃附子細辛為主

厥陰頭痛或吐痰沫厥冷其脉浮緩以吳茱萸湯主之 血虛頭痛當歸川芎為主

氣虛頭痛人參黃芪為主

氣血俱虛頭痛調中益氣湯內加川芎三分蔓荊子三分細辛二分其効如神

又有痰厥頭痛所感不一是知方者體也法者用也徒知體而不知用者弊躰用不失可謂上工矣

附諸方

加減三五七散 和劑方 治入風五痺肢躰不仁大治風寒入腦陽虛頭痛畏聞人聲目旋運轉耳內蟬鳴應有

濕痺脚氣緩弱並皆治之

山茱萸 去核三兩 細辛 一兩半 乾姜 炮三兩 防風 去芦四兩 茯苓 去皮三兩 附子 三箇半炮去皮臍

右為細末每服溫酒食前調服

川芎茶調散 治諸風上攻頭目偏正頭痛 見傷風

都梁丸 和劑方 治風吹項背頭目昏眩以及腦痛婦人產前產後傷風頭痛

香白芷 揀大者沸湯洗五次剉晒乾

右為末煉蜜為丸如彈子大每服一丸細嚼用荊芥湯下

小芎辛湯 濟生方 治風寒在腦頭痛眩暈嘔吐不已

川芎 一兩 細辛 洗去土 白朮 甘草炙各半兩

右咬咀每服四錢水一盞姜五片茶芽少許煎服



一方 治傷風感冒一切頭痛

甘菊一兩細辛半兩 甘草七錢 白芷 羌活 香附子 薄荷各三兩 荊芥二十枝 茵陳半兩 蒼朮浸 川芎各一兩

右為末每服二錢茶清調下婦人產後當歸石膏末調下

定風餅子秘方 治偏正頭痛

草烏頭半兩微炮 香白芷一兩 川芎二兩 防風 天麻 甘草炒各一兩 細辛半兩

右為末姜汁丸如龍眼大捏作餅子每服一餅食後茶湯下

川芎丸聖惠方 消風壅化痰涎利咽膈清頭目旋暈心忪煩熱頸項緊急肩背拘蹇肢軀煩疼皮膚瘙癢腦昏

目疼鼻塞聲重面上遊風

川芎 薄荷各七兩五錢 甘草 細辛 防風各二兩五錢 桔梗十兩

右為末煉蜜丸每兩半作五十九丸每服一九細嚼茶清食後臨卧時下

二芎餅子濟生方

川芎 撫芎 乾姜炮 甘草 薑本去芦 天南星炮去皮 防風去芦 白朮各等分

一方有蒼耳無白朮

右為末姜汁蒸餅為劑如鷄頭大捏作餅每服五錢餅細嚼茶清下

徹清膏 蔓荊子細辛各一兩 薄荷葉 川芎各三錢 生甘草 炙甘草各五錢 薑本一錢

右為末茶清調下二錢

神靈散 治偏正頭痛眼痛不止及破傷風等疾

煇硝一兩 黃丹 雄黃各三錢 沒藥 乳香各二錢

右為細末令患人用噙溫水用竹筒吹藥入鼻中少許

一方 治偏頭疼以雄黃細辛等分研末每服一字左邊疼吹右鼻內右邊疼吹左鼻內

已上諸方辛溫外散風寒之劑

天麻散

治頭項痛頭面腫拘急風傷衛發躁熱方見風熱

生朱丹

御藥院方治諸風痰盛頭痛目眩氣鬱積滯胸膈不利

硃砂

一兩二錢半龍腦一錢白附子炮去皮臍半斤石膏燒通紅令冷半斤

右為末燒粟米飯為丸如小豆大硃砂為衣每服三十丸食後茶酒任下

大川芎丸

治首風暈眩外合陽氣風寒相搏胸膈痰飲偏正頭疼

川芎一斤天麻四兩潮州者

右為末煉蜜為丸每兩作十九丸每服一丸細嚼茶酒下食後

上清散

集成治因風頭痛眉骨眼眶俱痛不可忍著

川芎

鬱金 芍藥 荊芥穗 薄荷葉 芒硝各二錢半 乳香 沒藥各半錢 腦子一分半

右為末每服一字鼻內搐之

菊花散

和劑方治風熱上攻頭痛不止

石膏

甘菊花 防風 旋覆花 枳殼 蔓荊子 甘草 羌活各一錢半

右用水二盞生薑五葉煎至一盞去渣溫服

芎芷散

直指方治風壅頭痛 川芎 白芷 荊芥穗 軟石膏

右為末每服一錢食後沸湯調下

川芎散

拔粹方治偏頭痛神効 甘菊花 石膏 川芎各三錢

右為細末每服一錢茶清調下一方有白姜蜜六錢生用

石膏散

拔粹方治頭痛不可忍 麻黃去根節 石膏各二兩 何首烏半兩 乾姜七錢半

右為細末每服三錢臘茶清調服

點頭散

聖惠方治偏正頭痛 川芎生二兩 香附子去毛四兩



右為末每服一錢好茶調下常服除根

一方 治頭痛去風痰

南星 一箇大者七片 包角 十四箇七箇生七箇煨 白梅 一箇 姜三片 牙茶 一撮 葱頭 一寸四分

右將前藥俱在石器內搗碎水一盞半煎至一盞去滓溫服不可輕犯鐵器搗

一方 治頭痛連眼痛 此風痰上攻須用白芷開之

雨前茶 川芎 白芷 防風 藁本 細辛 當歸 右用水煎服

川芎散 聖惠方 治頭風偏正頭痛

羌活 細辛 川芎 香附子 槐花 甘草 石膏 荊芥穗 薄荷 菊花 茵陳 防風 各一兩

右為末每服二錢茶清調食後服治動風物

○已上諸方辛平外散風寒內消風熱之劑

消空膏 治偏正頭痛年深不愈者又治風溼熱頭上壅及腦痛除血虛頭痛不治餘皆治之

川芎 五錢 柴胡 七錢 黃連 酒炒 防風 羌活 各一兩 炙甘草 五錢 細挺子 黃芩 三兩 去皮一半 酒製一半 炒

右為末每服二錢熱盞內入茶少許湯調如膏抹在口內少用白湯送下臨臥 如若頭痛每服加細辛二

分 痰厥頭痛脉緩減羌活防風川芎甘草加半夏一兩五錢 如偏正頭痛服之不愈減羌活防風川芎

一半加柴胡一倍 如發熱惡熱而渴此陽明頭痛只與白虎湯 加香白芷 白虎湯方見溼熱類

靈砂丹 御藥院方 治風熱鬱結氣血蘊滯頭目昏眩鼻塞聲重鼻流清涕口苦舌乾咽嗑不利胸膈痞悶咳嗽

痰寔腸胃燥澀小便赤黃或腎水陰虛心火熾甚及偏正頭疼髮落牙痛遍身麻木疥癬瘡瘍一切風熱並

皆治之

天麻 獨活 羌活 細辛 石膏 防風 連翹 薄荷 各一兩 川芎 梔子 芍藥 荊芥穗

當歸 黃芩 大黃 生全蝎 去毒 微炒 菊花 人參 白朮 各半兩 硃砂 二兩 寒水石 生 桔梗 各一兩 縮砂仁 二錢

生甘草 二兩 滑石 四兩

右為末煉蜜丸每兩作十九丸硃砂為衣每服一丸細嚼茶清送下

真珠散 聖惠方 治偏正頭痛頭風 盆硝 七錢半 白滑石 半兩 乳香 一錢半 片腦 少許

右研細用一字口噙水搐鼻內

豆粉丸 聖惠方 治風熱頭疼

川芎 細辛 甘草 白芷 豆粉 各二錢半 薄荷 石膏 各半兩 撲硝 二錢

右為細末煉蜜和丸如彈子大石膏末為衣每服一丸細嚼茶清下

川芎散 聖惠方 治風感膈癰鼻塞清涕熱氣攻眼下多淚多眵齒間緊急作偏頭痛

川芎 柴胡 各一兩半 夏麴 甘草 炙甘菊花 細辛 人參 前胡 防風 各半兩

右吹咀每服八錢水一盞半生薑三片薄荷少許煎至八分溫服

安神湯 聖惠方 治頭痛頭旋眼黑

羌活 黃蘗 各一兩 防風 半錢 柴胡 升麻 知母 酒浸 生地黄 各半兩 黃芪 二兩 生甘草 二錢

加蔓荊子 半錢 川芎 三分 炙甘草 三錢

右吹咀每服八錢水一盞半煎至八分去渣溫服食後

治頭痛 片苓酒浸透晒乾為末茶清調下 治諸般頭痛亦治血虛頭痛

治頭痛如破 酒炒大黃半兩一半茶煎

○已上諸方辛涼內消風熱之劑

定風餅子 治風寒客於陽經邪傷腠理背脊強直言語蹇澁熱惡寒痠厥頭痛肉瞤筋惕手顫鼻淵 傷風方見

如聖餅子 和劑方 治風寒伏留陽經氣厥痰飲一切頭痛

防風 天麻 各半兩 南星 洗乾姜 川芎 甘草 川烏 各一兩半 半夏 生半兩



南京中醫藥大學圖書館藏

右為末用姜汁糊和丸雞頭實大作餅子每五餅細嚼茶酒下同荊芥湯下澹寮方加細辛

三生丸 濟生方 治痰厥頭痛 半夏 白附子 天南星 各等分

右為末生姜自然汁浸蒸餅為丸如菜豆大每服四十九食前姜湯米飲任下

天香散 簡易方 治年久頭風頭痛不得愈者 天南星 半夏 湯洗去滑盡 川烏 去皮 白芷 各等分

右咬咀每服四錢水一盞煎一半入姜汁半盞煎八分溫服

九龍丸 聖惠方 治男女入般頭風一切頭痛

川芎 石膏 白芷 川烏頭 半夏 南星 各半兩 加細辛 全蝎 各二錢半

右為末韭汁為丸如梧桐子大每服五十九茶清送下

不卧散 治頭痛不可忍者 玄胡索 七枚 青黛 二錢 猪牙皂角 肥寔者刮去皮及子二兩

右為末用水調丸成小餅子如杏仁大用時令病者仰卧以水化開用竹管送入男左女右鼻中覺藥味至

喉少酸令病者坐却令咬定銅錢一個於當門齒上當見涎出成益即愈

玉真丸 濟生方 治腎厥頭痛不可忍其脉舉之則弦按之則堅

生硫黃 二兩另研 石膏 硬者不煨 半夏 湯洗七次 硝石 別研各一兩

右為末研勻用生姜汁煮糊丸如梧子大每服四十九食前姜湯米飲任下虛寒甚者去石膏用鐘乳粉二兩

芎烏散 治氣厥頭痛因氣所觸心腹脹滿嘔吐酸水頭目昏眩 川芎 天台烏藥 各等分

右為細末每服二錢臘茶清調下

芎朮湯 三因方 治着淫頭痛身重眩暈痛極

附子 生去皮臍半兩 白朮 川芎 桂心 各二錢半 甘草 一錢半

右咬咀每服四錢水一盞姜七片棗子一箇煎食前服

○已上諸方治痰厥腎厥着淫之劑



順氣和中湯 治氣虛頭痛此藥升陽補氣頭痛自愈

黃芪半錢 人參錢一 甘草分七 白朮 陳皮 當歸 芍藥各五分 升麻 柴胡各三分 細辛 蔓荊子各三分

右作一服水煎食後服 亦治氣血俱虛頭痛

半夏白朮天麻湯 治脾胃証已經服疎風丸下二三次元証不瘳增以吐逆痰唾稠粘眼黑頭旋目不敢開

頭苦痛如裂四肢厥冷不得安卧此氣虛頭痛也

黃柏二分 乾姜分三 澤瀉 白茯苓 天麻 黃芪 人參 蒼朮各 炒神麴 白朮各 麥芽 半夏

湯洗各半 陳皮錢半 右每服五錢水煎熱服

芎歸湯 治血虛頭痛 川芎 當歸等分 右每服五錢水煎服

四神散大金丹方 治婦人血風眩暈頭痛 菊花 當歸 旋覆花 荊芥穗

右等分為細末每服二錢葱白三寸茶末二錢水一盞半煎至八分去滓食後溫服

調中益氣湯 治氣血俱虛頭痛 內加川芎三分蔓荊子三分細辛二分 方見脾胃

○已上諸方治氣虛血虛之劑

丹溪心法

○眉眶痛屬風熱與痰 作風痰治類痛風

入方 黃芩 酒浸炒 白芷 右為末茶清調二錢

又方 川烏 草烏二味為君童便浸炒去毒 細辛 羌活 黃芩 甘草等分為佐

右為細末茶清調服 一本加南星

附諸方

選奇方 治眉骨痛不可忍大有効 羌活 防風各二錢 甘草二錢夏月生冬炒 酒黃芩一錢冬月不用有熱者用

右每服三錢水煎食後溫服水一鍾煎七分



上清散 治因風頭痛眉骨眼眶俱痛不可忍者

一方 治頭痛連眼痛 俱見頭痛

頭風 六十二

丹溪心法

○屬痰者多 有熱有風有血虛 在左屬風薄荷荊芥 屬血虛川芎當歸 在右屬痰蒼朮半夏屬熱酒

芩為主又屬溼痰川芎南星蒼朮 偏頭風在左而屬風者用荊芥薄荷此二味即是治之主藥有君臣佐

使之分九主病者為君而多臣次之佐次之須要察其兼見何症而佐使之如有痰即以二陳湯治痰而佐

之他症皆倣此又須察識病情全在活法出入加減不可執方

入方 酒片芩一兩 蒼朮 羌活 防風 各五錢 細辛 二錢 蒼耳 三錢

右為末每服三錢生薑一大片同搗勻茶湯盪起服之

又方 酒片芩 五錢 蒼朮 二錢半 羌活 蒼耳 川芎 生甘草 酒黃連 各一錢半 半夏麴 炒三錢半

右為末服法同前

瘦人搗藥 軟石膏 樸硝 各五錢 腦子 荊芥 檀香皮 薄荷 各一錢 白芷 細辛 各二錢

右為末搗鼻內

頭痒風屑髮黃 用大黃酒浸炒為末茶調服

一粒金搗鼻方 治偏頭風

藥本 玄胡索 白芷 川芎 青黛 各一兩 華撥 不以多少研細用獺猪膽汁拌勻再入膽內懸陰乾與前等分

右為末入製華撥末一兩半用無根水丸每服一粒長流水化開搗鼻以銅錢二三文口咬定出涎

治頭風 烏頭尖 七箇 荊芥 防風 甘草 蔓荊子 台芎 桔梗 麻黃 右為末茶調

一人頭風鼻塞 南星 蒼朮 酒芩 辛夷 川芎 各等分 右為末茶調

足本丹溪心法附錄

卷十二 風熱門

X 龍江海在書局印行

附諸方

川芎散 拔粹方 治偏頭痛頭風神効 甘菊花 石膏 川芎 各三錢

右為末每服一錢茶清調下一方有白姜六錢生用

消風散 和劑方 治諸風上攻頭目昏眩偏正頭風及婦人頭皮腫痒並皆治之

川芎茶調散 和劑方 治諸風上攻頭目昏重偏正頭痛頭風 並見傷風

菊花茶調散 治諸風頭目昏重偏正頭痛風鼻塞

菊花 川芎 荆芥穗 羌活 甘草 白芷 各二兩 細辛 一兩 防風 去芦一兩 蟬蛻

右為末每服二錢食後用茶清調下

芎辛湯 治膈痰風厥頭目昏痰鼻塞聲重肩背拘急 川芎 五錢 細辛 三錢 甘草 炙一錢半

右為水煎食後服

一方 治一切頭風

用猪牙皂角炮玄胡索各一錢青黛半錢為末滴水為丸如梧子大捏作餅子晒乾每用一餅新水化開男

左女右仰面以蘆筒鼻內灌之口咬銅錢一十五文其涎便出更不再發亦治痰疾妙

一方 天麻 防風 川芎 等分

右為末每服一錢溫酒食後調下以豆豉湯洗頭避風即愈

一方 治偏頭風

用華撥為末令患者口中含水如左邊痛左鼻吸一字右邊痛右鼻吸一字甚効

金花一聖散 治頭風 川芎 川烏 白芷 各等分

右為末每服二錢生葱三寸薄荷葉三四皮同煎食後服

灸法 宜灸顙會百會前頂上星等穴瘥



丹溪心法

○眼黑睛有翳皆用知母黃柏 眼睛疼知母黃柏瀉腎火當歸養陰水 眼中風淚出食後吞龍會丸數粒
日三次 冬月眼暴發痛亦當鮮散不宜用涼藥

入方

神效七寶膏 治暴發眼熱壅有翳膜者

蕤仁去油 白礪砂 片腦 硃砂

右用蜜調成膏點眼

爛眶眼

薄荷 荊芥 細辛

右為粗末如燒香狀燒之以青碗塗蜜少許於內覆香烟上取烟盡之後以小青罐收烟藏之凡眼有風熱
多淚者皆可點此是陽明經有風熱所致

生熟地黃丸

治血虛眼見後

龍會丸 見脇痛

一人病眼至春夏便當作鬱治

黃芩

酒浸南星 姜製香附童便浸 蒼朮童便浸

各二錢 撫芎酒浸

一山梔炒

龍膽草

酒浸陳皮

連翹

蘿蔔子

蒸青黛

各半兩

柴胡 三錢

右為末神麴糊丸如梧子大每服五十丸白滾湯下

附諸賢論

王節齋曰眼赤腫痛古方用藥內外不同在內湯散用苦寒卒涼之藥以瀉其火在外點洗則用辛熱辛涼之
藥以散其邪故點藥莫要於冰片而冰片大辛熱以其辛性甚故借以拔出火邪而散其熱氣古方用燒酒
洗眼或用乾姜末生薑汁點眼者皆此意也蓋赤眼是火邪內炎上攻於目故內治用苦寒之藥是治其本
如鍋底之去薪也然火邪既客於目從內出外若外用寒涼以阻逆之則鬱火上攻不得散矣故點藥皆用



辛熱而洗眼用熱湯是火鬱則發因而散之從治法也世人不知冰片為劫藥而誤誌為寒常用點眼遂致積熱入目而昏暗瘡翳故云眼不點不瞎者此也又不知外治忌寒涼而妄將冷水冷物冷藥挹洗當致昏瞎者有之

附諸方

明目流氣飲和劑方治肝經不足內生風熱上攻眼目視物不明常見黑花當風多淚癢澁難開或生瘡翳婦人血風時行暴赤一切眼疾並皆治之

大黃

炮牛旁子

炒川芎

菊花去皮

白蒺藜炒去刺

細辛去苗

防風去苗

玄參去芦

山梔子去皮

黃芩

去芦甘草

炙蔓荊子

去白荊芥

去梗木賊

去根節各一兩

草決明

一兩半

蒼朮

米泔浸炒二兩

右為末每服二錢臨卧用冷酒調下

洗心散

和劑方

治風痰壅滿心經積熱邪氣上衝眼澁睛痛或腫或赤迎風多淚怕日羞明並皆治之

方見火類

洗肝散

和濟方

治風毒攻上暴作赤目腫痛癢澁多淚

薄荷

去梗當歸

羌活

防風

各去芦

川芎

甘草

大黃

各一兩

右為末每服三錢食後熱水調下

密蒙花散

和劑方

治氣風攻注兩眼昏暗多淚羞明并暴赤腫

密蒙花

揀淨杜蒺藜

炒去尖

羌活

去芦

木賊

菊花

石決明

用鹽同東流水煮沸時取研粉等分

右為末每服一錢臘茶清食後調下

撥雲散

和劑方

治男子婦人風毒上攻眼目昏暗翳膜睛怕日羞明一切風毒眼疾並皆治之

羌活

防風

柴胡

甘草

炒各一斤

右為末每服二錢水一鍾煎服食後薄荷湯調茶并菊花苗煎湯皆可服忌諸毒物

蟬花散

和劑方

治肝經蘊熱毒氣上攻眼目赤腫多淚羞明一切風毒并宜服之