

景岳全書卷之六十三長集 痘疹詮古方

會稽 張介賓 會卿著

會稽 魯 趙 謙菴訂

痘疹

保元湯 治痘瘡氣虛 陷者

人參 二三錢 炙甘草 一錢 肉桂 五七分 黃芪 二三錢 灌膿 時酒炒同漿

時蜜 炙

水一鍾半加糯米一撮煎服○此藥煎熟或加人乳好酒各

半盞和服更妙酌宜用之○頭額不起加川芎三五分○面部加升麻三四分○胸腹加桔梗三四分○腰膝加牛膝四分○四肢不起加桂枝○嘔惡加丁香三四分○元氣虛寒加大附子七八分或一錢

調元湯二

按此卽保元湯無肉桂者名爲調元湯卽東垣之黃芪湯也東垣用爲小兒治驚之劑魏桂巖用以治痘多效因美之名保元湯也蓋小兒元氣未充最易傷殘用此保全誠幼科王道之妙方但能因此廓克則凡氣分血分虛寒虛陷等症皆可隨症增減用之無不可奏神效也

內補湯^三

治痘

瘡中虛等症

人參

黃芪

當歸

白朮

川芎

甘草

茯苓

陳皮

厚朴

右等分水煎服

托裏散^四

治痘毒元氣虛弱或妄行剋伐不能潰散用之未

成自消已成自潰并治癰毒內虛不能起發

人參

黃芪

炒各二錢

當歸

酒洗

白朮

熟地

芍藥

炒

茯苓

各一錢半

炙甘草

五分

右每用三五錢水煎服○外科樞要方有陳皮一錢半無甘草

解毒內托散_五 治痘癰

金銀花

黃芪

當歸

赤芍藥

防風

甘草節

荆芥

連翹

木通

右水煎入酒少許服

陳氏托裏消毒散_六

治痘毒氣血虛弱不能起發腐潰收斂或

發寒熱肌肉不生

人參

黃芪炒

當歸酒洗

川芎

芍藥炒

白朮炒

茯苓

陳皮各一錢

金銀花

連翹

白芷各七分
炙甘草五分

右每服三五錢水煎服○外科方無陳皮

參芪內托散七
治痘瘡裏虛發疹或不潰膿或為倒靨及瘡

癰膿毒不化膿潰作痛等證

人參

黃芪蜜炙

當歸

川芎

厚朴薑制

防風

桔梗炒

白芷

紫草

官桂

木香

甘草等分

入糯米一撮水煎服○色淡白者去防風紫草白芷多加粘
米○一方有芍藥

參芪四聖散 入

治痘瘡已出至六七日不起發不成膿

人參

黃芪

炒

白朮

炒

當歸

川芎

芍藥

炒

茯苓

各五分

紫草

防風

木通

各三分

右用水煎服

陳氏四聖散 九

治痘瘡出不快及倒靨因內實者

紫草茸

木通

炙甘草

枳殼

炒

黃芪 等分

右每服二錢加糯米一百粒水煎待米熟溫服

加味四聖散 十 治痘瘡黑陷倒陷

人參 黃芪 炙 川芎 甘草

紫草 木通 木香 等分 蟬蛻 十個

右加糯米百粒水一盞煎服

如聖湯 十一 治毒盛不起

芍藥 升麻 乾葛 各一錢 甘草

紫草 木通 各三五分

水一鍾薑一片煎七分溫服不拘時

人參固肌湯

治痘瘡發表太過致肌肉不密或痘痂久

粘者

人參

黃芪

當歸

酒洗

甘草

蟬蛻

去

上等分

水一鍾入

糯米一撮煎服

人參透肌散

十三

治痘瘡虛而有熱雖出快而不齊隱於肌

膚間者

人參

紫草

如無紅花代之

白朮

當歸

芍藥

茯苓

甘草

木通

蟬退

糯米

等分

右每服三錢水一盞煎半盞徐服之

十宣散

十四

一名托裏十補散○調氣補血內托瘡毒五日

後必用之方也亦治癰疽

人參

黃芪

當歸

各二錢

川芎

防風

桔梗

白芷

甘草

炙

厚朴

各一錢

桂心

三分

右爲細末每服一錢或二錢木香湯下

芍歸湯 十五

亦名活血散○大能養營起痘

當歸 倍用

川芎

右爲細末每服一錢紅花湯調服

活血散 十六

治痘疹血虛血熱已出未盡煩躁不寧腹痛

白芍藥 酒炒

右爲末每服一匙糯米湯調下或荔枝湯亦可○此方對四

君子湯加歸芪名參歸活血散

當歸 血散 十七

治痘色淡白

當歸 酒焙

赤芍 酒炒

川芎

紫草

紅花 各五錢
木香 二錢
血竭 一錢

右爲末每五歲者服一錢十歲已上服二錢酒下

養血化斑湯 十八
治白疹白痘

當歸身 人參 生地 紅花

蟬蛻 等分

水一盞生薑一片煎六分溫服無時

人參胃愛散 十九
治痘疹已發未發吐瀉不止不思飲食等

證

人參 茯苓 甘草 丁香

藿香

紫蘓

木瓜

糯米

右每服三錢薑棗水煎

二仙散 二十

治體寒肢冷腹痛口氣冷陰盛陽衰嘔吐泄瀉

難發等證

丁香 九粒

乾薑 炒一錢

右爲細末每服五七分白湯送下被蓋片時令脾胃溫煖陰返陽回則痘變潤矣量大小加減與之

陳氏 木香散 二一

又名十一味異功散○治小兒痘疹溫寒多

滯者宜此

木香

丁香

大腹皮

人參

桂心

炙甘草

半夏

制

訶黎勒

赤茯苓

青皮

前胡

等分

右每服二三錢薑水煎

薛按曰前方治痘瘡已出未愈之間其瘡不光澤不起發不紅活五七日內泄瀉作渴或肚腹作脹氣促作喘或身雖熱而腹脹足指冷或驚悸或汗出或寒戰咬牙或欲嘔不嘔瘡不結痂或嘔後腹脹泄瀉作渴此皆脾胃虛寒津液衰少急用此藥治之若誤認爲實熱用寒涼之劑及飲蜜水生冷水

果之顛必不治

陳氏十二味異功散 二二

治元氣虛寒小兒痘疹色白寒戰咬

牙泄瀉喘嗽等證

人參

丁香

木香

肉豆蔻

陳皮

厚朴

各二錢半

白朮

茯苓

官桂

各二錢

當歸

三錢半

制附子

半夏

各錢半

右咀每服二三錢薑棗水煎服○愚按陳氏此上三方溫性

有餘補性不足用治寒證則可用治虛證則不及也用者更

當詳酌

陳氏人參麥門冬散 二三

治痘瘡微渴

麥門冬 二兩 人參

炙甘草

白朮

陳皮

厚朴

薑制各五錢

右每服三四錢水一大盞煎至六分徐徐溫服量兒增減

薛氏曰前方治痘瘡熱毒氣虛宜用之若因氣虛作渴宜人

參白朮散

柴胡麥門冬散 二四

治痘瘡壯熱經日不止更無他證者

柴胡 二錢半

龍膽草 一錢

麥門冬 三錢

甘草 炙

人參

玄參

各錢半

右吹咀每服三錢水一大盞煎至六分不拘時徐徐溫服量
大小加減

按此方解表之功居六清火之功居四養營退熱此方最宜
升均湯二五 治痘瘡已出不勻或吐瀉發熱作渴

升麻

乾葛

人參

白朮

炒

芍藥

炒

茯苓

甘草

紫草

如無紅
花代之

右每服三五錢薑水煎

升麻葛根湯

二六

亦名升麻湯○解發痘毒之良方

升麻

葛根

芍藥

甘草

等分

右咬咀水一盞煎七分溫服無時

萬氏曰古人治痘以升麻葛根湯爲主後世好奇多立方法
法愈多而治愈難矣苟能通變則痘疹諸證皆可增減用之
不特發表解肌而已今以葛根湯爲主治隨證立增損法於
後○初發熱解表加柴胡羌活白芷桔梗防風○口乾渴內
熱也加葛粉天花粉麥門冬○自利加條實黃芩○嘔吐加
半夏生薑○腹中痛加木香青皮枳殼山查肉○腰痛加獨
活北細辛○頭痛加羌活藁本蔓荊子○驚搐加木通生地
黃燈心○小便少加木通車前瞿麥○大便秘加大黃○痢