

宣明論

十一十五

黃帝素問宣明論方卷之十

河間

安山吳勉學十八校

婦人門

總論

素問曰目得血而能視耳得血而能聽指得血而能
攝掌得血而能握足得血而能步藏得血而能液腑
得血而能氣然血所通流則氣亦然也氣血宣行其
中神自清利而應機能用矣故

素問氣血人之神也不可
不謹調護然婦人以血藏
爲基本也夫婦人之病手
太陽足少陰小腸之之經
絡爲裏表起自任衝之脉
於經脉之下以上毛際循
腹裏關元上至咽喉順循
面目過帶脉貫臍而止以
婦人月水一月一來如期
謂之月信其不來則風熱
傷於經血故血在內不通
或內受邪熱脾胃虛損不
能飲食食既不克榮衛凝
滯肌膚黃燥面不光澤或
大腸虛變爲下痢流入關
元致絕子嗣爲子職冷虛
勞顛而病帶下起於胞內
○夫帶下之造化但分經
絡釋本殊異爲病之本氣
也其病所發正在過帶脉

之分而淋瀝以下故曰帶下也赤白之說者無定也
法曰頭目昏瞶口苦舌乾咽喉不利小便赤色夫小
便秘澀滯脉實而數者皆熱證也凡白帶下者亦多
有之爲病寒豈能然素問亢則害承廼制謂亢過極
而反隸已勝之化制其甚也則如火煉金熱極則反
化爲水及六月熱極則物反出液而濕潤林木流津
故肝熱則出泣心熱則出汗脾熱則出涎肺熱則出
涕腎熱甚則唾○大庄俗論已煎熱湯養極則涕溢
及熱氣重蒸於物而生津液也故下部任脉濕熱甚
者津液涌而溢已爲帶下見俗醫白帶下者但依方

論而用辛熱之藥雖有誤中致令鬱結熱聚不能宣
通舊病轉加世傳誤之久矣

人參白朮散 治徧身燥濕相搏玄府緻密遂令公
悸發渴飲食減少不為肌膚

人參

三錢

白朮

七錢

薄荷

半兩

縮砂仁

三錢

生地黃

茯苓

去皮

甘草

各半兩

黃芩

一錢

滑石

三兩

藿香

半錢

右膏

一兩

右為末每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服

食前日進二三服

白朮湯

治妊娠血虛衰痿弱難以運動氣帶連

痺麻榮衛不能通宜常服養液潤燥開通結滯令血

昌盛

白朮

三兩

寒水石

當歸

黃芩

芍藥

人參

石膏

乾葛

防風

縮砂

藿香

甘草

茯苓一兩

木香二兩

崔宣武方

用白朮一兩

右爲末每服三錢水

一盞生薑三片同煎五六

分去滓溫服食前日三服

二氣湯

治月水不調斷

絕不產面黃肌瘦虛弱不

美食有燥熱以柴胡飲子相參服之

大黃

四兩別爲末醋
升慢火熬成膏

子

當歸

二兩

白芍藥

二兩

右爲末以膏子和丸如桐子大每服二十九粒

醋湯下食前日進三服

如月水不通加入

乾漆

三錢炒出大

沒藥

半兩

硃砂

三錢研

官桂

二錢

斑猫

三錢去足炒熟用

本草云此用熬不
可生用則吐瀉

當歸龍骨丸

治月事失常經水過多及帶下淋瀝

無問久新赤白諸證并產後惡物不止或孕婦惡

露胎痛動不安及大小兒痢瀉並宜服之

當歸

芍藥

黃連

染槐子

艾葉

炒各半兩

龍骨

黃蘗

各兩

茯苓

半兩

木香

一分

右末滴水爲丸如小豆大溫米飲下三四十丸

食前日三四服

當歸人參散 治產後虛損瘦弱難以運動疼痛胸

滿不思飲食

當歸

白朮

黃芩

芍藥

大黃

茯苓

去皮

陳皮

各半

人參

黃耆

剉

川芎

厚朴

去皮

官桂

各三錢

甘草

一兩

枳殼

四錢去

右爲末每服三錢水一盞生薑三片煎至六分

去滓不計時候溫服如大便閉以此散下和中

丸

增損四物湯 治月經不調心腹疼痛補血臟溫經

注類

川芎

當歸

芍藥

熟地黃

白朮

牡丹皮

各半兩

地骨皮

一兩

右爲末每服五錢水一盞煎至六分去滓溫服

食前

當歸川芎散

治風壅頭目昏眩痛悶筋脉拘倦肢

體麻痺保護胎氣調和榮衛

當歸

川芎

各半兩

甘草

二兩

黃芩

四兩

薄荷

一兩

縮砂仁

一分

一右爲末溫水調下一錢漸加至二錢食後日進
三服

辰砂大紅丸

治產後寒熱運悶血氣塊硬疼痛立

止

朱砂

一兩一分半入藥一半爲衣

附子炮沒藥

半兩

海馬

半錢

乳香

薤蓉

肉桂

玄胡

薑黃

硃砂

各半兩

斑貓

一分

生地黃

一兩

右爲末酒煮麴糊爲丸如酸棗大每服一丸煎

當歸酒下放溫經水不行煎紅花酒下

三聖散

治產後下血痢不止

烏魚骨少燒綿灰

血餘灰

汗脂者各等分

右爲細末每服煎石榴皮湯調下熱服一錢

沒藥丹

治產後惡血不下月候不行血刺腰腹急

痛或一切腸垢沉積堅滿痞痛作發往來或燥熱

煩渴喘急悶亂肢體疼痛大小人心腹暴痛孕婦

自利惡物過多不宜服燥熱極甚血液衰竭不可

強行宜調氣養血細詳證用

沒藥一錢當歸

大黃

兩一牽午二輕粉一錢

官桂

一分已上同研末

硃砂

一錢同研

右研勻醋麪糊爲丸如小豆大每服五丸至十

丸溫水下以快利取積病下爲度雖利後病未
痊者後再加收利止心腹急痛煎乳香下未止
取大便利

黃藥子散 治月事不止煩渴悶亂心腹急痛肢體
困倦不美飲食

黃藥子 當歸 芍藥 生地黃 黃芩

人參 白朮 知母 石膏各一 川芎

桔梗各一 甘草一兩 紫苑 槐花子 柴胡

右爲麤末杪三錢水一盞煎至七分濾汁

食前但一服

大延胡索散

治婦人經病并產後腹痛或

問或癥瘕癖塊及一切心腹暴痛

延胡索

當歸

赤芍藥

京三稜

川練子

蓬莪茂

官桂

厚朴

木香

川芎各二錢

桔梗

黃芩

大黃

各半兩

甘草

一兩

積各一錢

右爲末每服三錢水一盞煎至六分去滓熱服
食前日三服惡物過多去大黃官桂加入黃藥
子染槐子龍骨各半兩如前法或平人心胃急
痛如本方煎服得利尤好

枳實檳榔丸

治安養胎氣調和經候癥瘕痞塊有

似妊孕可以久服血氣通和兼寬膈美食

枳實 檳榔 黃連 黃蘗 黃芩

當歸 阿膠灰炒細研 木香各半兩

右爲末水和丸如小豆大溫米飲下三十丸不計時候日進三服

軟金花丸 治心胸腰腹急痛或淋病并產前後經

病刺痛乾嘔氣勞往來寒熱四肢困倦夜多盜汗

者兼治血積食積

當歸半兩焙 乾漆二錢生 輕粉 斑貓生全用

礪砂 粉霜各一錢 芭豆二錢生油

宣月論方 卷二 二

右爲末同研細棗肉爲膏旋丸如菉豆大每服
一丸新水下病甚者加服看虛實

大紅花丸 治婦人血積聚癥瘕經絡注滯

川大黃 紅花 各二兩 蟲翅足

右取大黃七錢醋熬成膏和藥丸如桐子大每
服五七丸溫酒下食後日三服

黃芩湯 治婦人孕胎不安

白朮 黃芩 各等分

右爲末每服三錢水二盞當歸一根同煎至一

盞稍溫服

海蛤丸 治婦人小便濁敗赤白帶下五淋臍腹疼

痛寒熱口乾舌澁不思飲食

海蛤

半夏

芫花 醋炒

紅娘子 去翅足

訶子 炒

玄胡索

川練子

去皮 麝香

茴香

炒各一兩

乳香

三錢

桐砂

半兩

硃砂

半兩

入藥

沒藥

各一兩

當歸

半兩

右爲末醋煮麴糊爲丸如小豆大每服五丸至

十丸醋湯下量人病虛實加減

烏金散

治婦人諸疾寒熱頭痛一切等疾

烏金子

肉桂

蒲黃

當歸

蟲蟲

血餘灰 水蛭 鯉魚灰 木香 青皮

皂角 大者炙 各半兩 芍藥 半兩 芫花 三兩醋浸

黑豆 一錢 朱砂 砂 棕皮 灰 紅花 兩 川烏頭 兩

右為末每服半錢加至 錢煎生薑湯調下空

心食前忌油膩物

伏龍肝散 治婦人血崩不止或結作片者

青蘗 兩 生地黃 分 阿膠 八錢 當歸 兩 續斷 兩

地榆 刺薊根 兩 伏龍肝 七錢 青竹茹 八錢

右為末每服三錢水一盞半煎至一盞溫服日

五服不計時候後服補藥