

醫宗金鑑內科目錄

第十三冊

卷五十五

發熱

積滯

癰疾

汗證

失血

雜證

卷五十六

痘門證治

卷五十七

痘疹併證治

卷五十八

痘中雜證上

校正醫宗金鑑

內科

編輯幼科雜病心法要訣

發熱門

諸熱總括 小兒有病多發熱表裡虛實宜分別觀形察色辨因由審證切脈有妙訣表證須汗裡下之虛則宜補實則瀉平昔體認要精詳方得臨時無遺闕益小兒發熱有表裡虛實之異治亦有汗下補瀉之殊須觀形察色審證切脈以別之惟在平昔講習精詳臨證庶不致誤

表熱 表熱之證因外感脈浮發熱惡風寒頭痛身疼而無汗十神通聖表為先益小兒外感寒邪脈浮發熱惡風寒寒頭疼身痛無汗此表熱也宜十神湯主之若兼內熱者雙解通聖湯兩解之

十神湯 升麻 葛根 麻黃 香附醋炒 陳皮 蘇葉 赤芍藥 川芎 香白芷 甘草生 引用生薑水煎服

雙解通聖湯 方見傷寒

裏熱 裏熱之證因內熱偏身蒸熱小便紅面赤唇焦舌燥渴調胃白虎解毒清注小兒肥甘過度必生內熱以致發熱蒸蒸小便赤澇面赤唇焦舌燥而渴脈實有力者先以調胃承氣湯下之不愈用白虎湯或黃連解毒湯清之

調胃承氣湯 大黃 芒硝 甘草 引用生薑水煎服

大便通利熱自消

白虎湯 石膏煨 知母生 甘草生 粳米 水煎服 方胃熱白虎湯知母生用良石膏合甘草粳米共煎嘗

黃連解毒湯 黃芩 黃連 梔子 黃蘗 水煎服 方黃連解毒湯清熱效非常苓連梔子蘗煎服保安康

虛熱 虛熱病後學衛弱神倦氣乏用補中嘔渴竹葉石膏治面赤尿白通注虛熱者因小兒病後氣血虛弱榮

衛尚未調勻之故其證神倦氣乏宜用補中益氣湯治之若兼口渴引飲而嘔者宜用竹葉石膏湯治之又有陰盛格

陽外浮發熱者其面色雖赤然小便必清白四肢必厥逆宜用白通湯收斂陽氣熱退自愈

補中益氣湯 方見陰泄

補中益氣湯 方見陰泄

補中益氣湯 方見陰泄

竹葉石膏湯 竹葉 石膏煨 人參 麥冬去心 甘草生 半夏麩 粳米 引生薑水煎服 方病後虛熱煩渴嘔皆因氣弱胃津亡竹葉石膏麥冬半夏粳米共生薑

白通湯 乾薑 附子製 蔥 水煎服 方虛熱原於陰格湯真寒假熱白通湯散寒薑附蔥白並厥回熱退自然

實熱 實熱積熱午潮熱腹脹尿紅大便難煩渴口瘡腮頰赤涼膈大黃效通仙 註小兒有餘積熱以致午後潮熱蒸蒸有汗肚腹脹滿小便赤大便難煩渴啼叫口舌生瘡腮頰紅赤脈洪數有力法宜清熱通利時時熱者涼膈散主之

午後潮熱者大柴胡湯主之

涼膈散 方見急驚風

積滯門 積滯總括 小兒養生食與乳搏節失宜積滯成停乳傷食宜分晰因證調治保安蓋 註夫乳與食小兒資以養生者也胃主納受脾主運化乳貴有時食貴有節可免積滯之患若父母過愛乳食無度則宿滯不消而病成矣醫者當別

其停乳傷食之異臨證斟酌而施治焉 乳滯 嬰兒乳滯睡不安多啼口熱吐驚煩肚脹腹熱便酸臭慎攻宜用消乳丸 註乳滯之兒其候睡卧不寧不時啼

叫口中氣熱頻吐乳片肚脹腹熱大便酸臭也但臟腑嬌嫩不可過攻惟宜調和脾胃為上以消乳丸消導之 消乳丸 方見傷乳吐

食滯 小兒食滯任意餐頭溫腹熱便酸膿噯氣惡食煩作渴大安承氣審宜 註小兒恣意肥甘生冷不能運化則腸胃積滯矣其證頭溫腹熱大便酸臭噯氣惡食煩不安眠口乾作渴滯輕者宜木香大安丸消導之滯重便秘者宜

小承氣湯攻下之 木香大安丸 木香 黃連 陳皮 白朮炒 枳實炒 山楂肉各三錢 連翹二錢 神麩炒 麥芽各三錢

砂仁 萊菔子各二錢 右為細末神麩糊為丸每服一錢陳倉米湯下

小承氣湯 方見食痛

癖疾門

癖疾總括 癖疾過食腸胃滿濁液外溢被寒凝潮熱飲冷肌削瘦腹滿硬塊面黃青註癖疾一證皆因飲食過節腸胃填滿濁汁外溢復感寒氣凝結而成每生於左脇之下始如雞卵堅硬成塊漸如覆盆之形越臍則難治矣其候身體潮熱喜飲涼水肌膚削瘦面色青黃也治者宜詳察之

癖疾證治 癖疾潮熱渴飲冷肚大青筋堅硬疼內服消癖木香效外貼紅花膏最靈註癖疾之始作也午後潮熱口渴飲冷肚大青筋漸至堅硬成塊不時作痛內以千金消癖丸治之外貼紅花膏內外兼治其癖自消若無熱渴者先以木香丸治之外亦以紅花膏貼之

千金消癖丸 蘆薈 阿魏另為 青黛 木香 厚朴炒 檳榔 陳皮 甘草各一錢 史君子註 胡黃連

山查肉 香附炒 三棱炒 莪術各二錢 水紅花子 神麴炒 麥芽各四錢 人參 白木土 茯苓各三錢

木香丸 木香 蓬義木 縮砂仁 青皮 硃砂研細 錢 右為細末將阿魏一錢白水和麴打糊為丸菜豆大米飲下量兒大小服之

乳傷乳飲下食傷以所傷物熬湯下

紅花膏 沒藥錢 血竭 麝香 阿魏各三錢 當歸 赤芍各一錢 水紅花料一捆煎汁去渣熱膏一稅 右為細末入膏內攪勻以青布攤貼患處

汗證門

汗證總括 自汗屬陽有虛實或因胃熱或表虛睡中盜汗為陰弱心虛血熱隨證醫註汗乃人之津液存於陽者為津存於陰者為液洩於外者為汗若汗無故而出者乃因陰陽偏勝也如小兒無因而汗自出者謂之自汗自汗屬陽有虛實之別虛者汗出翕翕發熱惡寒乃表虛也汗出蒸蒸發熱不惡寒乃裏熱也表虛者法當固表裏實者法當攻熱又有睡則汗出覺則汗止謂之盜汗盜汗主陰虛然當分心虛不固心火傷陰也心虛當補心心熱當涼血治者宜詳辨之庶無差謬

自汗 表虛自汗玉屏風甚者桂枝加附從裏實自汗用白虎便秘調胃承氣攻註表虛瀝瀝自汗玉屏風散主之若

上海廣益書局印行

惡寒冷陽氣虛也桂枝湯加附子固之陽明表實蒸自汗用白虎湯清之便秘者以調胃承氣湯攻之

玉屏風散 黃耆錢 防風 白木灶 水煎服 歌方表氣虛弱時自汗玉屏風治頗相宜黃耆防風炒白木水煎溫

服不拘時

桂枝加附子湯 白芍藥 桂枝 甘草炙 附子製 引用薑棗水煎服 歌方表氣虛弱甚桂枝湯最良芍藥桂枝

草加附病漸康

白虎湯方見裏熱 調胃承氣湯方見裏熱

盜汗 心虛盜汗睡多驚酸棗仁湯服即寤心火傷陰必煩熱當歸六黃湯奏功註盜汗有二虛實兩分心虛者陰氣

不斂也睡則多驚以酸棗仁湯主之心熱者火傷於陰也身多煩熱以當歸六黃湯主之

酸棗仁湯 當歸 白芍炒 生地 茯苓 酸棗仁炒 知母炒 黃蘗炒 五味子 人參 黃耆炙 水煎服

歌方酸棗仁湯治盜汗陽不能藏陰本虛歸芍生地茯苓棗和藥五味共奏者

當歸六黃湯 當歸 生地黃 熟地黃 黃芩 黃蘗 黃連 黃耆炙 引用浮麥水煎服 歌方當歸六黃治盜

汗陽盛傷陰液自流生熱二地苓連藥歸者浮麥汗能收

失血門

失血總括 陰乘陽熱血妄行血犯氣分不歸經血病及腑滲瀆道傷於藏者溢出清熱犯陽絡上吐衄熱侵陰絡下

失紅又有勞勞成血病血止仍嗽勢多凶註凡失血之證陽盛乘陰則血為熱迫不能安於脈中犯於氣分妄行不能

歸入經脈也若血病傷及於腑者則血滲入腸胃之濁道上行於咽出而為吐為衄下從二便而出為便為溺也若血

病傷及於藏者則溢於胸中之清道上從喉出而兼咳嗽下從精竅而出為溺也夫血藏於臟內行於脈中流於軀

殼之內不可得而見也非損傷不能為病而損之之因有三一曰熱傷陽絡腑病也熱傷陰絡藏病也宜以清熱為主

一曰勞傷宜以破逐為主一曰勞傷宜以理損為主若日久血止而咳嗽不休者王必死之證故勢多凶也

衄血 衄血之候鼻乾燥身熱不渴苦頭疼失表分汗麻桂治內熱犀角瀉心清註衄血者鼻中出血也其候鼻中乾

桂枝湯解之設無表病因內熱而衄者宜以犀角地黄湯清之熱感者四物三黃瀉心湯瀉之外俱用髮灰散或黑槐子末吹鼻其衄自止

麻黃湯 麻黃 杏仁炒去 桂枝 甘草生 引用生薑水煎服 方傷寒失表緊鬱熱身體無汗血妄行須用麻

黃湯調治桂麻杏草引生薑

桂枝湯 方見自汗

犀角地黄湯 牡丹皮 白芍藥 犀角 生地黃 水煎服 便硬者加川大黃 方犀角地黄湯治衄效非常丹

皮芍犀地使秘加大黃

四物三黃瀉心湯 川芎 當歸酒洗 生地黃 赤芍藥 黃芩 黃連 川大黃酒洗 水煎服 方四物三黃瀉心

湯熱盛吐衄功最良芎歸生地赤芍藥黃芩黃連川大黃

髮灰散 取壯實人頭髮陰陽瓦煨成灰放在地上去火性研細末吹入鼻中血衄自止

吐血 吐血下咳因熱逆若兼咳嗽勞傷內熱犀角地黄湯承氣四物膏勞傷有熱雜蘇散無熱須用救肺良

註小兒吐血不咳嗽者多因內熱致血妄行上逆也宜以犀角地黄湯主之若因勞傷吐血者兼咳嗽先用桃仁承氣

湯以破逐之次用加味四物湯和之又有勞傷吐血者亦兼咳嗽痰中帶血有熱者雜蘇散主之無熱者救肺散主之

犀黃地黃湯 方見本門衄血

桃仁承氣湯 桃仁去皮 大黃 芒硝 甘草 桂枝 加當歸芍藥蘇木紅花 水煎服 方勞傷吐血先破逐

桃仁承氣湯妙絕桃仁黃硝草桂枝加入歸芍蘇紅捷

加味四物湯 當歸 芍藥 川芎 生地黃 茅根 蒲黃 牡丹皮 梔子炒黑 甘草生 引用藕節酒水煎

服 方勞傷吐血須活血四物為主真妙訣再加茅根與蒲黃丹皮梔草引藕節

雞蘇散 雞蘇薄荷葉 川貝母法 麥門冬法 桔梗 阿膠蛤粉 生地黃 甘草生 黃耆炙 白茅根 蒲

黃少 水煎服 方勞傷有熱嗽痰血雞蘇貝母麥門冬桔梗阿膠生地草黃耆茅根蒲黃同

加味救肺散 麥冬法 人參 黃耆炙 鬱金 五味子 當歸酒洗 白芍藥酒洗 川貝母法 甘草炙

馬兜鈴 水煎服 方勞傷無熱嗽痰血加味救肺麥門冬參者鬱金五味子歸芍貝母草兜鈴

便血 熱傷陰絡病便血藏毒血點腸風紅須辨腹痛肛腫痛熱感濕盛要分明藏毒初起腫痛甚大黃皂刺莫消停

傷陰絡也若血色黯而濁肛門腫痛先血後糞此為近血名曰藏毒若血鮮而清腹中不痛先糞後血此為遠血名曰

腸風藏毒肛門每多腫痛初起宜用皂刺大黃湯消之大小下血後熱感微痛者以槐花散和之濕感不痛者以平胃地

榆湯和之腸風亦宜以槐花散主之使血日久脈微氣血弱者升陽和血湯和之繼以人參養榮湯補之

皂刺大黃湯 皂刺 生川大黃各等 量小兒年歲大小虛實酌其多少水酒煎服

槐花散 槐花炒 側柏葉 枳殼製炒 川黃連 荆芥穗炒 水煎服 臟毒加蒼木苦棟 腸風加秦光防風

方臟毒腸風槐花散黃連枳殼槐柏荆臟毒蒼木苦棟入腸風須加羌防行

平胃地榆湯 蒼木炒 陳皮 厚朴薑炒 甘草 地榆 引用生薑水煎服 方便血濕感腹不痛須用平胃地

榆湯蒼木陳皮厚朴草地榆同煎引生薑

升陽和血湯 黃耆炙 當歸洗酒 白芍炒 牡丹皮 陳皮 肉桂 秦光 生地黃 熟地黃 生甘草 炙甘

草 蒼木炒 升麻 水煎服 方下血日久腹中痛治宜升陽和血湯二地二草者歸芍陳丹秦光升桂蒼

人參養榮湯 人參 黃耆炙 白木炒土 白茯苓 白芍藥炒 肉桂 熟地黃 當歸洗酒 甘草炒 陳皮 引

用薑棗水煎服 方失血日久氣血虛人參養榮湯頗宜者木苓白芍桂地黃當歸草陳皮

溺血 溺血多緣精竅病尿血分出或尿牛膝四物湯調治急宜煎服效從容註溺血為精竅之病乃尿與血先後

分出者也宜用牛膝四物湯治之其證自愈

牛膝四物湯 牛膝 木通 鬱金 甘草梢 瞿麥 當歸 川芎 生地 赤芍藥 水煎服 方小兒溺血精

竅病宜用牛膝四物湯牛膝鬱金通瞿草歸芍赤芍生地黃

雜證門

二便秘結 小兒熱結二便秘口渴舌乾唇面紅八正尿秘少腹滿神芎便秘腹脹疼註此證多因乳食停滯生熱結

二便秘結 小兒熱結二便秘口渴舌乾唇面紅八正尿秘少腹滿神芎便秘腹脹疼註此證多因乳食停滯生熱結

於腸胃以致二便秘結其候舌乾口渴面赤唇焦也熱積則小便秘濇小腹滿急宜八正散主之若食積大便秘脹

痛者宜神芎丸主之

八正散 方見不小便
神芎丸 大黃 滑石 各一兩 薄荷 川芎 各四錢 黃芩 黃連 各五錢 牽牛 四錢 共為細末滴水為丸每服五

丸蜜湯化下

氣虛脫肛 瀉痢日久中氣陷肛鬆腸薄滑而脫面色青黃指指冷脈來沉細唇淡白補中益氣湯升舉真人養藏固

滑脫外用濕腸散調敷氣升肛濕腸自合 註脫肛一證因瀉痢日久中氣下陷腸胃薄瘦遂令肛門滑脫不收現證面

色青黃指指冷脈沉細唇色淡白宜溫補為主先以補中益氣湯升提其氣再以真人養藏湯溫補固滑外以濕腸散

糝之則氣升肛濕而腸自收矣
補中益氣湯 方見後瀉 真人養藏湯 方見寒痢

濕腸散 訶子 赤石脂 龍骨 各等分 右為細末用臘茶調敷和藥摻腸頭上綿帛揉入

肛腫翻肛 積熱肛腫大便艱努力肛出翻不還外用蟠龍散消腫內宜皂刺大黃煎豎小兒積熱太盛以致肛門作

腫大便艱難努力翻出肛脫不還外用蟠龍散消其腫內服皂刺大黃湯其腫一消肛自收矣

皂刺大黃湯 方見便血

曾氏蟠龍散 乾地蟠龍 一兩 燬 風化朴硝 二錢 右剉研為細末仍和勻朴硝每以二錢至三錢肛門濕潤者

乾塗乾燥者用清油調塗先用荆芥生葱煎水候溫洗浴輕與拭乾然後敷藥

龜胸 肺積痰熱病龜胸胸骨高聳若龜形氣急喘咳體脈瘦寬氣百合酌量行在龜胸一證多因小兒飲食不節痰

熱熾盛復為風邪所傷風熱相搏以致肺經脹滿攻於胸膈高如覆杯現證咳嗽喘急身體羸瘦治宜清肺化痰為主

先以寬氣飲開其氣道再以百合丹除其壅滯肺熱清而脹滿自除矣

寬氣飲 杏仁 去皮 桑白皮 橘紅 蘇子 炒 枳殼 炒 枇杷葉 蜜 麥門冬 法 生甘草 苦葶藶 水

煎服 方寬氣飲治兒龜胸杏仁桑皮合橘紅蘇子枳殼枇杷葉甘草葶藶麥門冬

百合丹 百合 天門冬 杏仁炒去皮尖 木通 桑白皮炒 甜葶藶 石膏各五錢 大黃三錢 共為細末煉蜜丸

如菜豆大量兒大小服之臨臥滾白水送下

龜背 龜背坐早被風吹偃僂背高狀如龜內服松益丹緩治外用灸法點龜尿管註龜背者因嬰兒坐早被客風吹入脊脊遂致偃僂曲折背高如龜往往為終身痼疾內以松益丹調治之外用聖惠灸穴法灸肺俞心俞膈俞三六三五壯或以龜尿管骨節上亦可得效

松益丹 松花 枳殼炒 防風 獨活各一 麻黃 前胡 川大黃生 桂心各五錢 右為細末煉蜜丸如

黍米大每服十九丸飲送下

五軟 五軟稟賦不足證頭項手足口肉肌地黃丸與扶元散全在後天調養宜註五軟者謂頭項軟手軟足軟口軟肌肉軟是也頭軟者項軟無力也手足軟者四肢無力也肉軟者皮寬不長肌肉也口軟者唇薄無力也此五者皆因稟受不足氣血不充故骨脈不强筋肉痿弱治宜補氣為主先以補腎地黃丸補其先天精氣再以扶元散補其後天羸弱漸次調理而五軟自強矣

補腎地黃丸 熟地黃一兩 山萸肉一兩 懷山藥炒 茯苓各八錢 牡丹皮 澤瀉各五錢 牛膝八錢 鹿茸五錢

炙酥 右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服二錢用鹽湯下

扶元散 人參 白朮土炒 茯苓 熟地黃 茯苓 黃耆蜜炙 山藥炒 炙甘草 當歸 白芍藥 川芎

石菖蒲 引用薑棗水煎服 五軟扶元散堪嘗參苓茯苓熟地黃茯苓神黃耆山藥草歸芍川芎及石菖

五鞭 陽氣不榮成五鞭仰頭取氣難搖動手足強直冷如冰氣壅胸膈牽連痛小續命湯最為良烏藥順氣散極應若遇肝木乘脾經加味六君妙無竟 五鞭者仰頭取氣難以動搖氣壅疼痛連胸膈關乎心足心冰涼而鞭皆由陽氣不榮於四末最為難治重者以小續命湯疎其風輕者以烏藥順氣散調其氣若肝木乘脾食少氣弱者加味六君子湯治之内外交治而證自瘥矣

小續命湯 人參 麻黃 川芎 黃芩 芍藥 甘草炙 防風 官桂去皮 附子炮去皮臍 杏仁炒去皮尖 漢防己

引用薑棗水煎服 小續命湯治五鞭人參麻黃川芎共黃芩芍藥草防風官桂附子防己否

烏藥順氣散 麻黃 白芷 川芎 桔梗 枳殼炒 殭蠶炒 烏藥 炮薑 甘草生 橘紅 引用葱白水煎

服 歌烏藥順氣五鞭輕麻黃白芷合川芎桔梗枳殼殭蠶炒烏藥炮薑草橘紅

加味六君子湯 人參 白朮 炮薑 陳皮 半夏製 茯苓 炙甘草 升麻炒 柴胡炒 肉桂 水煎服

歌加味六君虛五鞭人參白朮共炮薑陳半茯苓炙甘草升麻柴胡肉桂良

五遲 小兒稟來氣血虛筋骨軟弱步難移牙齒不生髮疎薄身坐不穩語言遲加味地黃為主治補中益氣繼相醫

邪乘心氣菖蒲好血虛髮遲宜勝宜註小兒五遲之證多因父母氣血虛弱先天有虧致兒生下筋骨軟弱行步艱難

齒不連長坐不能穩要皆腎氣不足之故先用加味地黃丸滋養其血再以補中益氣湯調養其氣又足少陰為腎之

經其華在髮若少陰之血氣不足即不能上榮於髮宜勝丹主之又有驚邪乘入心氣至四五歲尚不能言者菖蒲丸

主之

加味六味地黃丸 熟地黃二兩 山萸肉一兩 懷山藥炒 茯苓各八錢 澤瀉 牡丹皮各五錢 鹿茸三錢 炙

五加皮五錢 麝香五分 共為細末煉蜜丸如梧桐子大兒每服二錢小兒一錢五分鹽湯送下

補中益氣湯 方見後源

荳勝丹 當歸洗焙 生地黃 白芍藥各一兩 荳勝子二兩 胡粉三錢 右同研勻煉蜜為丸如黍米大每服

十粒煎黑豆湯下

菖蒲丸 人參 石菖蒲 麥門冬去心 遠志去心 川芎 當歸酒洗 乳香 硃砂各一錢 右為細末煉

白蜜為丸如黍米大食遠用米湯送下

鶴膝風 小兒稟賦不充盈肌肉削瘦少崢嶸膝骨外露如鶴膝多緣腎弱髓難生血脈不榮筋攣縮膝肘風涎時外

疼大防風湯宜先服地黃繼進莫從容註小兒鶴膝風多因稟賦不足血氣不榮肌肉削瘦遂致骨節外露筋脈攣縮

股漸細小而膝蓋愈大要皆腎虛不能生精髓之故也須先服大防風湯繼以補腎地黃丸治之庶氣血充而證自愈

矣

大防風湯 人參 白朮土炒 茯苓 甘草炙 熟地黃 當歸身 白芍藥炒 川芎 黃耆蜜炙 羌活 防

風 附子製 杜仲 牛膝 引用薑棗水煎服 劫大防風湯八珍膏充防附子杜仲移榮筋更有川牛膝虛風

鶴膝最相宜

補腎地黃丸 方見五軟

解頤 小兒解頤最堪憐先天有損腦髓乾面色皓白形瘦弱二目多白若愁煩補腎地黃丸堪服補陽扶元散為先

更有封頤散極效臨時攤貼保安然註解頤者乃頤大骨縫不合也蓋腎生髓腦為髓海腎氣有虧腦髓不足亦如

花木無根現證面色皓白形體瘦弱目多白睛悲愁少笑治宜補養腎氣為主先以補腎地黃丸滋補其陰再以扶元

散補養其氣外用封頤散攤貼之則精血稍充或可轉危為安也

補腎地黃丸 扶元散 俱見五軟

封頤散 柏子仁 防風 天南星 各四 右為細末每用一錢以猪膽汁調勻攤在緋絹帛上看頤大小剪貼一

日一換不得令乾時時以湯潤動

顛陷 小兒緣何顛下陷瀉久脾虧虛弱見面目青黃四肢涼六脈沉緩神慘淡補中益氣湯最宜固真湯進有奇驗

外用烏附膏攤貼溫中理脾功無限註小兒臍府有熱渴飲水漿致成瀉痢久則脾氣虛寒不能上充腦髓故顛陷成

坑名曰顛陷現證面目青黃四肢逆冷六脈沉緩神氣慘淡先以補中益氣湯升提其氣再以固真湯溫補其脾外用

烏附膏攤貼於陷處極效

補中益氣湯 方見瘡瀉 固真湯 方見慢脾風

烏附膏 雄黃 二錢 川烏 附子 各五錢 右為細末用生葱和根葉細切杵爛入煎藥末同煎作成膏每早空

心貼陷處

顛填 顛門腫起氣上衝其間虛實要分明毛髮憔悴頻頻汗胸高氣促口唇紅肝盛瀉青丸最效裡熱連翹飲堪行

因表防風升麻劑難冷屬陰用理中註顛填者謂顛門腫起也蓋因乳哺無度或寒或熱乘於脾經致使臍府不調其

氣上衝為之填脹腫突現證毛髮憔悴頻頻出汗胸高氣促口唇色紅須分虛實治之肝氣盛者瀉青丸主之裡熱盛

者大連翹飲主之因表者防風升麻湯主之堅韌不熱者屬陰理中湯主之

瀉青丸 方見急驚風

大連翹飲 柴胡 荆芥 連翹去心 木通 滑石 水飛 梔子 蟬退去足 瞿麥 當歸 酒洗 赤芍藥 黃

芩 甘草 生 防風 水煎服 方連翹飲治熱上衝柴胡荆芥翹木通滑石梔子蟬退歸芍黃芩草防風

防風生麻湯 麥冬去心 木通 甘草 節 山梔 升麻 防風 引用淡竹葉水煎服 方防風升麻湯頗填效

非常麥冬木通草山梔升麻防

理中湯 方見不乳

中惡 小兒神氣未充寔觸惡何能自主持目閉面青驚悶亂蘇合皂角功效奇 註小兒神氣未充一為邪惡所觸何

能主持自然神魂離舍目閉面青悶亂不省人事內以蘇合香丸除其邪外以皂角末開通其閉噴出則氣通而甦矣

蘇合香丸 方見疳門內合

卷五十六

編輯痘疹心法要訣

痘原 上古無痘性溫樸中古有痘情欲惡痘稟胎元出不再毒之深淺重輕識天瘡之名因天稟瘡形如豆痘名居

塞北不出寒勝熱毒發必自待天時 註上古之人無出痘者天性溫樸也中古之人有出痘者情欲漸熾也古人謂痘

稟胎毒此定論也惟稟於胎元故一出不再出也毒有淺深故出有輕重也名為天瘡者因毒稟於先天也名為痘瘡

者因瘡形如豆也其毒伏於形中而塞北不出者以其氣多寒涼鮮邪陽火旺之氣以觸發其毒故伏藏於內而不出

也中土之人必出者以其氣多溫熱一觸邪陽火旺之氣毒隨內發而即出也此皆醫所當識者也

出痘形證 欲識小兒出痘形類是傷寒發熱驚氣粗眼眼中指冷耳尻不熱耳筋紅 註痘證初起見證大抵與傷寒

相似其候身體發熱不時驚悸口鼻氣粗兩眼發睜惟中指獨冷耳尻不熱耳後有紅筋皆為出痘之形證也

痘出五臟形證 痘出五臟主證形呵欠頓悶是肝經肺證效嗽瘰癧涕心證驚煩面赤紅脾證喜睡肢熱利耳尻俱

涼是腎徵肝泡肺膿心赤小脾大黃淺腎黑形 註痘瘡之毒伏於五臟故內出何藏外即應之如何欠頓悶此痘出肝

經證也效嗽有痰噴嚏涕此痘出肺經證也驚悸煩躁面色紅赤此痘出心經證也喜睡自利四肢發熱此痘出脾

經證也惟腎經但見耳尻發源者是火不能勝水也肝症之形為水泡其色青而小肺症之形為膿泡其色白而大心症之形其色赤而小脾症之形其色黃淺而大至於腎經不宜有證若水不勝火症色黑者非吉兆也

痘主部位 額心額腎鼻脾部左頰肝位右肺方周身分主面屬胃頭背膀胱腰脅疆心肺胸膈肝膽腸腹肢屬脾大小腸包絡之絡聯藏府三焦之氣應無方註小兒出痘自頭面以及周身各有藏府所屬部位治者須詳察部位以定吉凶如額先見點者是毒發於心也頰先見點者毒發於腎也左頰先見點者毒發於肝也右頰先見點者毒發於肺也鼻先見點者毒發於脾也面屬胃經部位也頭背屬膀胱經部位也腰屬腎經部位也胸膈屬心肺二經部位也脇

旁屬肝膽二經部位也肚腹四肢屬脾大小腸三經部位也至於包絡乃周身脂膜之絡聯屬百骸藏府者也三焦為周身水精之氣充滿軀殼藏府者也凡周身發痘俱從此出故無一定部位也

痘形順逆 痘形見點喜尖圓惡隱歧迹癩粟蠶起脹漸綻充肥順頂平不突板寔難生漿斂束形完固軟嫩皮薄瘡塌纏結痂如螺先後落最忌欬薄潰爛粘註痘形氣之為也氣勝毒則毒為氣取其毒解矣故順也毒勝氣則氣為毒蝕其氣竭矣故逆也氣毒相平則勢界於險惟在醫者調治得宜使險變順也如始出之形頂尖而根圓此氣勝毒為順也若隱如蚊咬或如熱沸寒粟蠶種此毒勝氣為逆也起脹之形漸綻充肥此氣勝毒為順也若頂平不突板寔不

綻此毒勝氣為逆也成漿之形根紅斂束痘殼完固此氣勝毒為順也若殼軟皮薄則必瘡塌此毒勝氣為逆也結痂之形痂如螺殼先結先落後結後落此氣勝毒為順也若痂薄如欬潰爛粘聚此毒勝氣為逆也此痘形順逆之大畧也

痘色順逆 痘色桃花漸漸紅淡白枯紫晦多凶起脹頂白根紅潤頂灰根散或深紅生漿白由而黃厚最忌灰乾與薄清慶喜蒼粟惡發白疔喜紅滿惡白平註痘色血之為也血勝毒則毒為血載其毒化矣故順也毒勝血則血為毒滯其血涸矣故逆也血毒相平則勢界於險亦在醫者之調治得宜也始出之色如桃花而漸加滋潤此血勝毒為順也若初出即淡白乾紫晦而不亮此毒勝血為逆也起脹之色頂漸放白根紅光潤此血勝毒為順也若頂色灰滯根

血散漫或地脚深紅此毒勝血為逆也生漿之色白而漸黃蒼而滯厚此血勝毒為順也若灰乾不潤或漿薄清稀此毒勝血為逆也結痂之色蒼如粟殼此血勝毒為順也若如色灰白此毒勝血為逆也也

毒勝血為逆也結痂之色蒼如粟殼此血勝毒為順也若如色灰白此毒勝血為逆也也

毒勝血為逆也結痂之色蒼如粟殼此血勝毒為順也若如色灰白此毒勝血為逆也也

毒勝血為逆也結痂之色蒼如粟殼此血勝毒為順也若如色灰白此毒勝血為逆也也

白黑紫平凹無大起之狀皆為不順之色醫者詳之

痘證老嫩 蒼高嬌豔老嫩色肥實浮虛老嫩形濃濁稀清漿老嫩厚薄痂之老嫩明_註痘之一證自始至終喜老惡嫩如蒼高嬌豔此色之老嫩也肥實浮虛此形之老嫩也濃濁稀清此漿之老嫩也薄軟厚堅此痂之老嫩也總之老者多順易於成功嫩者多險逆難於施治也

痘證疎密 頭項胸背痘疎吉手足雖密不為凶疎兼陽熱須防變密若磊落不必驚_註頭面清陽元首頸項管鑰咽喉胸背乃藏府所附惟稀疎則吉也至於手足無甚關係雖多不為凶也疎固是順若見陽證謔妄大渴大熱唇舌躁裂煩躁不寐大小便秘等證此毒壅遏不出雖疎未為吉也密固是逆若磊落鋪排大小勻淨精神寢食二便如常雖密亦不須驚也

辨形神聲氣飲食之虛實 軀之肥瘦形衰盛聲之粗細氣虛實目瞭不瞭神強弱胃氣虛實食不食_註欲治痘者先看兒體之肥瘦體肥者形盛可知也體瘦者形衰可知也次聽聲氣之粗細聲粗者聲音雄粗此氣實也聲細者聲音微細此氣虛也再觀其目中之神瞭瞭精彩者此神強也目不瞭不精彩者此神弱也更問其飲食能食否飲食如常者胃氣實也不能飲食者胃氣虛也此辨形神聲氣飲食之虛實也

辨氣血虛實證 氣虛項陷多軟薄氣過成泡少漿膿血虛淡紅摸轉白血過發癰紫黑凝_註痘之形色乃氣血外現也如項凹陷手摸之多軟薄者此氣虛也氣過者氣過盛也泡者發水泡也少漿膿者不能生漿也謂氣若過盛則發水泡而漿不能生也如痘色淡紅以手摸過隨即轉白者此血虛也血過者血過盛也癰者地界有癰暈也紫黑凝者謂毒盛則色黑紫凝滯也此就痘癰形色以辨氣血之虛實也

辨表證虛實 發熱惡寒身痛表有汗為虛無汗實隱稠密灰紅滯血平塌爛水浸濕_註痘出有發熱惡寒身體疼痛者屬表證也若有汗則為表虛無汗則為表實表實閉塞痘毒隱伏難出也稠密者痘出稠密也灰者痘色灰白也紅者痘色紅赤也滯者謂痘稠密不論灰紅若帶滯暗者皆表毒盛也若表虛之證則痘平不起塌癢無漿也爛者痘潰爛也水浸濕者痘膿水浸漬濕而不乾也此辨表證之虛實也

辨裏證虛實 發熱惡寒腹痛裏便秘為實下利虛實則板實根緊鞭虛則倒陷腐收遲_註痘出發熱惡寒者表證也

醫宗金鑑 卷五十一 痘疹心法要訣 上海廣益書局印行

不惡寒惡熱者裡證也鞭者不大便而鞭也痛者肚腹作痛也此皆屬裡熱之證若便秘則為裡定下利則為裡虛板
定者虛裏板定不活動也根紫鞭者根脚緊束堅鞭不鬆皆裡實證也倒陷者疔已出復陷入於內也倒壓者疔正灌
漿即收靨也收遲者疔已灌漿日久不靨皆裡虛證也此辨裡之虛定也

辨陽熱證 陽熱壯熱面唇赤舌乾飲冷爪尿紅煩躁昏狂譫失血紫黑焦枯不潤通註凡疔屬陽熱者身必壯熱面
唇皆赤舌上乾燥好飲冷水爪甲尿溺皆現紅色煩躁不寧神氣昏憤發狂譫語失血者吐血衄血也紫黑焦枯者疔
色紫黑焦枯也不潤通者九竅不潤通也此皆屬陽熱之證也

辨陰寒證 陰寒無熱口鼻冷面唇爪色白青厥冷難回利不具水泡反白無暈紅註凡疔屬陰寒者身肢不熱口
鼻皆冷面唇尿溺爪甲色現青白也厥冷難回者謂四肢厥冷不能即溫也利不具者謂下利無臭穢也水泡濕盛也
反白無暈者謂痘色灰白根脚無紅暈也此皆屬陰寒之證也

辨虛實寒熱誤治 溫補過則痘潰爛毒攻咽喉目腫癱清瀉過則痘白陷嘔吐不渴厥利清註疔有虛實治有補瀉
要在當當而施也如虛者當補亦須酌量施治若溫補過甚則反助毒熱而痘潰爛也以致毒熱上攻或咽喉腫痛或
才顯發疔或眼目赤腫生翳甚而攻於榮衛發為癰疽也如是者當瀉亦須中病即止若清瀉過甚則損傷正氣而痘
白陷或嘔吐不渴或厥逆下利此皆發明溫補清瀉之過當也

稟賦順逆險 毒微氣血寔則順毒甚而虛逆自明毒微若虛恐化險毒甚逢寔變險能註疔由稟賦毒氣輕者固順
然必兒之氣血不虛雖逆變順也重者固逆亦必兒之氣血虛則始為逆也毒微者順也若兒之氣血虛弱雖順恐化
險也毒甚者逆也若兒之氣血不虛雖逆能變險也此以兒之胎毒重輕氣血虛寔定疔之順逆險也

天時順逆險 毒微天時和者吉毒甚天時不和凶毒微不和順中險毒甚時和逆或更註毒微吉矣然必逢天時之
和始為順而吉也毒甚凶矣然必遇天時不和則始為逆而凶也毒微者順也若值天時不和恐順中化險也毒甚者
逆也若值天時之和或逆中轉險也此以胎毒之輕重天時之和不和定疔之順逆險也

人事順逆險 險逆時和無病吉不和有病定然凶由此故識種痘善人事能回天命註凡痘險逆之證固不善矣
若逢天時之和兒又無病險者可以變順逆者可以化險故曰吉也若逢天時不和兒又有病則險者變逆逆者更逆

故曰山也由此觀之可識種痘之善以得其天時之和免庶無病其中即有毒之重者而人事克盡亦能挽回天命而致亨也

發熱順證 發熱和緩微微汗飲食如常二便調睡卧安然神氣爽此為順證不須療 註發熱和緩身不甚熱毒輕也

微微汗身微微有汗表和也飲食二便如常裡和也神氣清爽睡卧安然精神氣血大和故為順證不須治療也

發熱逆證 發熱神昏悶亂成妄言喘滿腹腰疼不食不眠搖不止乾嘔失血證逆凶 註發熱神昏悶亂妄言毒伏於

心也喘滿喘急毒伏於肺也腹疼毒伏於脾也腰疼毒伏於腎也不食不眠毒伏於胃也驚搖不止毒伏於肝也不時

乾嘔失血吐血尿血是毒攻氣血內亂也此皆為不治之逆證勢多凶也

發熱險證 發熱三日熱不退煩渴咬牙面赤紅驚啼戰粟乳食少夜不安眠險證明 註發熱三日見點者常候也若

見點熱不退者毒甚也更兼煩躁口渴頻頻咬牙面色紅赤驚悸多啼身體戰粟乳食甚少不能安眠等證此是毒甚

伏鬱難出具為險證明矣宜隨證施治庶或從險化順也

發熱證治 痘出發熱固自內必因其誘使之然時氣風寒驚食熱表裡虛是隨證參表熱惡寒而無汗裡熱有汗沒

便難氣弱熱微不足治形寔熱盛有餘者 註痘出發熱者謂痘本火毒故未出先發熱也自內謂其熱自內達外也必

因其誘使之然者謂必因其四時不正風寒邪氣使之發熱也驚謂外觸異物跌撲驚嚇使之發熱也食謂內傷食滯

使之發熱也熱謂內熱積久因而熱發於外也內外既有所因之邪又當以表裡虛實隨證參詳施治也表熱者謂發

熱在表則惡寒而無汗也裡熱者謂發熱在裡則有汗小便短澀大便燥難也氣弱熱微者謂形氣不足發熱微輕也

形寔熱盛者謂形氣有餘發熱太甚也醫者果能臨時詳察因證施治則汗下清補之法自得其宜矣

升麻葛根湯 發熱升麻葛根湯表邪痘疹兩得方升麻葛根赤芍草隨證宜加法最良無汗表寔加麻薄便秘腹痛

裡大黃形怯氣弱參者入熱盛犀連荊等防尿澀通滑車前子驚搐荊防鈞連羊煩渴石膏冬粉效嗽前桔杏蘇桑

傷食腹熱查芽枳下利芩連嘔半薑咽痛荳梗身羌獨頭痛荊穗芩並羌 註痘出發熱當以升麻葛根湯為主以其能

發表邪透痘疹兩得之良方也然必隨證加佐使之品斯為盡善如身熱無汗者此表實也本方中加麻黃薄荷如大

小便秘腹作痛者此裡寔也本方中加大黃如形氣法弱者稟賦不足也本方中加人參黃耆熱盛者內熱熾盛也本

方中加犀角黃連荆芥牛蒡子防風如小便短澀者熱結膀胱也本方加木通滑石車前子如發驚搐者肝心有熱也本方中加荆芥防風鈎藤鈎川黃連羚羊角如煩渴者內熱盛也本方中加石膏麥冬花粉如咳嗽喘急者肺鬱風邪也本方中加前胡桔梗杏仁蘇葉桑皮如傷食腹皮熱者胃中停滯也本方中加山查麥芽枳殼如下利者腸胃熱滯也本方中加黃連黃芩如作嘔者胸膈有痰飲也本方中加半夏生薑如咽痛者火在上焦也本方中加牛蒡子苦桔梗如偏身疲疼者外染風寒也本方中加羌活獨活如頭痛者上冒風寒也本方中加荆芥穗川芎白芷羌活此治發熱之大略又貴臨時詳察融會貫通也

升麻葛根湯 升麻 葛根 赤芍藥 生甘草 引加芫荽水煎服

歸宗湯 形寔無表毒火盛所以歸宗主大黃地芍查青通荆蒡杜熱爪紫肢厥涼惡熱頭汗蒸蒸汗便秘謔語煩躁狂大渴唇焦舌生刺失血腰痛不循常註發熱之初形寔者形氣壯寔也無表者無風寒表邪也若證見毒火太盛法當攻之所以用歸宗湯者因其以大黃為主也而佐使生地赤芍山查青皮木通荆芥穗牛蒡子也痘未見點如壯熱不已毒火熾盛也爪甲色紫血熱凝滯也四肢厥冷同陽證見者熱深厥深也惡熱內熱盛也頭汗出胃熱上蒸也通身蒸蒸汗出毒火內迫津液也大小便秘腸胃熱結也謔語胃熱也煩躁狂亂毒火擾心神也大渴引飲毒火灼津液也唇口焦裂舌生芒刺毒火胃熱並盛也失血者口中失血小便尿血也皆緣火毒迫血妄行也其腰痛不尋常者毒攻腎位也以上諸證非險則逆若見之急用此方峻攻火毒庶可挽回少有透迤瞻顧則無及矣

歸宗湯 大黃 生地黃 赤芍藥 山查 青皮 木通 荆芥穗 牛蒡子 炒 引加燈心水煎服

清解散 痘毒清解升葛蒡荆防甘草桔連苓蟬翹芩前查通紫表羌蘇芷弱者參註痘欲出而發驚搐者皆由其毒不得快然宣發而鬱於經也其現證則面赤心煩口渴手足抽搐俱以清解散主之或因風寒束於表者其現證則無汗頭疼身體疼痛咳嗽喘涕本方中加羌活蘇葉白芷以表發之若兼形氣虛弱者其現證則面色淺淡身體微熱四肢微溫倦怠嗜卧本方中加人參黃耆以託之

清解散 防風 荆芥 牛蒡子 炒 生甘草 升麻 葛根 桔梗 黃連 黃芩 蟬蛻 紫草茸 川芎

前胡 山查 木通 連翹 去心 引加生薑燈心水煎服