

S28

46946

陳修園
先生著 南雅堂醫案

上海羣學社發行

第六冊



南京中医药大学图书馆版权所有

南雅堂醫案卷六

閩長樂陳念祖修園著

痿症門

病痿有年，兩足輒弱，不能步履。是症治法，擬獨取手陽明一經，蓋手陽明胃為五臟六府之海，主潤宗筋，藉以束骨而利其機。關陽明虛則不能受水穀之氣，以布化精液，是以致成痿躄。今師丹溪法以虎潛丸主之。

大熟地

三兩
酒炒

黃柏

三兩
鹽水炒

肥知母

三兩
鹽酒炒

龜版

四兩
炒

當歸身

二兩

炒白芍

二兩

淮牛膝

二兩

瑣陽

一兩五錢

虎脰骨

一兩五錢

陳皮

一兩五錢

乾薑

五錢

右藥十一味，杵研為末，用羯羊肉酒煮為丸，如梧桐子大。每

服三錢，鹽湯或姜湯送下。

濕熱沈著，下焦足跗疲軟無力，擬主以苦辛之劑，冀由經絡而達

陽明始有轉機

細菌陳 三錢 白朮 三錢

茯苓皮 三錢

黃柏 一錢五分

寒水石 三錢 晚蠶沙 一錢

當歸身 一錢

麥門冬 一錢

當夏兩腿疲軟無力、口乾溺黃膚熱放嗽時作、常患鼻衄、上焦陰液受耗、胃中濕熱之氣薰蒸於肺、肺為嬌嫩之府、金受火刑、肺熱葉焦、乃生瘻變、揆諸經旨、理當不謬擬用東垣清燥湯加減治之。

黃耆 二錢

川連 五分

炙甘草 八分

炒黃柏 八分

五味子 五分

白芍 一錢

人參 七分

生地黃 一錢

澤瀉 八分

杞杷葉 一錢

神麴 八分

陳皮 八分

澤瀉 八分

診得脈形弦遲、舌苔滯膩、便溏溺少、口角流涎、左肢痺而不用、中虛濕勝之體、易於生瘻動風、內風既動、外風自招之易入法以扶中和陽、祛風化痰為主。

白附子 八分

製半夏 二錢

炒殼桑 八分

白茯苓 一錢

桂枝 五分

白芍藥 一錢

橘紅 一錢

蝎梢 八分

甘草 五分

水全煎服

病已半載有餘，熱邪留於肺胃。胃熱故消穀易飢；肺熱則覺痿難行。當春天氣暴熱，卧不成寐，舌心乾紅，陰氣更傷可知。今師長沙法，以甘寒主之。

生地 三錢

沙參 三錢

麥門冬 二錢

白茯苓 三錢

知母 一錢五分

酸棗仁 一錢五分

滑石 三錢

百合 六錢

肺為百脈之長。肺熱葉焦，則津液不能灌輸經絡，致成為痿躯。脈細而數，舌絳無苔，肌肉瘦削，欬嗽痰臭，何一非津液內涸，燥火亢烈之象。然稽諸內經，治痿獨取於陽明，以胃為氣血之海，主潤宗筋故也。茲擬生胃津以上供於肺，使土旺而金自生，是即養母壯子之義。

枇杷葉 三錢
去毛

阿膠 二錢

杏仁 二錢
去皮尖

天門冬 一錢五分

麥門冬 一錢五分

白茯苓 二錢

玉竹 一錢

冬桑葉 二錢

元參 一錢

火麻仁 一錢

甘草 八分

脈數肌瘦色蒼。左肢偏痺。擬從金匱肺熱葉焦。則生瘻竇例治。

大沙參 三錢

麥門冬 二錢

甜杏仁 二錢

玉竹 二錢

地骨皮 一錢五分

百合 四錢

水全煎服

外受雨濕之氣。加以水穀濕熱內蘊。傷及經脈。漸致筋骨痠弛。氣隧不通。慎弗久延。致劇。

大豆卷 二錢
去皮尖

飛滑石 三錢

通草 一錢

木防己 二錢

水全煎服

長夏氣泄太過。入秋收肅無權。右肩臂及足跗漸致痠躄。陽明脈絡空虛。厥陰風木內動。症屬虛候。擬先用通攝一法。

大熟地 三錢

肉蓯蓉 二錢

枸杞子 二錢

白茯苓 三錢

川石斛二錢 遠志炒一錢

石菖蒲一錢

牛膝一錢五分

形體充壯。色蒼脈實。平時酒醴甘肥。釀成濕熱。蘊結下焦。自述少腹有氣上衝作脹。兩足沉重。艱於行動。大小便濇。腿中覺有熱氣。此即內經所謂濕熱不攘。大筋纏短。小筋弛長。纏短為拘。弛長為痺。是也。擬用苦寒為驅濕清熱之計。方列后。

細茵陳

三錢

黃柏

一錢五分

茯苓皮

三錢

晚蠶沙

一錢

川草薢

一錢

漢防己

二錢

黑山梔

二錢

青黛

八分

龍膽草

一錢

淮牛膝

一錢

內經治痺。獨取陽明。以主潤宗筋。束骨而利機關也。今胃土虛弱。不能運化水穀。津液無以灌輸。宗筋失於所養。痺嬖由是而作。茲宗經旨。製方列后。

紫苑

三錢

蒼朮

二錢

米泔浸炒

黃柏

一錢

天門冬

五錢

淫羊藿

一兩
去刺

水公煎服

卷六 瘰症門

三

望六之年。陽氣漸衰。陽明脈絡空虛。不主束骨以利機關。入夏陽氣升泄。頭目如蒙。肩肢痺麻。兩足痿疲乏力。絡熱內風旋動。為虛上實之症。若徒事利濕化痰。奚望有濟。擬先清營執以熄內風為合。

鮮生地 三錢 連翹 二錢 元參 一錢 鈎藤 一錢

冬桑葉 二錢 粉丹皮 二錢 明天麻 一錢 犀角 五分

心熱煩渴。腰膝兩足屈伸不利。脈象濡弱右大。乃下焦真陰已虧。熱燦筋骨而為痿蹙。今仿丹溪虎潛丸法加減。

熟地黃 三錢 炒知母 三錢

酒炒

川黃柏 三錢

酒炒

當歸身 二錢

炒白芍 二錢 淮牛膝 二錢 龜版 四錢

炒

元參 二錢

乾薑 五分 虎脰骨 錢半

肝腎俱虛。熱淫於內。肝主筋。腎主骨。痿弱不能步履。是肝腎為病也。擬用三因四斤丸法。加減主治。

乾地黃 二兩

肉蓯蓉

酒浸 二兩

淮牛膝

一兩五錢 酒浸

木瓜

一兩五錢 酒炒

杜仲 二兩

兔絲子

炒 二兩

鹿茸

一兩五錢 酥炙

右藥共研為末，煉蜜丸如梧桐子大。每服二錢，溫酒或米湯

送下。

精血不足，肝腎失養，致筋骨痠弱，行動不便。但病已兩年有餘，正氣多虛，亦應兼顧為安。茲酌列兩方如左。

炙龜版

四兩

虎脰骨

一兩 酥炙

黃柏

三兩 酒炒

知母

三兩 酒炒

熟地黃

三兩

淮牛膝

二兩 酒蒸

白芍

二兩 酒炒

陳皮

二兩

瑣陽

一兩五錢

當歸身

一兩五錢 酒洗

白茯苓

二兩

炙甘草

八錢

右藥共研為末，以羯羊肉酒煮爛，搗勻和前藥為丸。早晨每服三錢，鹽湯或黃酒吞下。下午可用湯劑。

又方 人參

一錢五分 炒白朮

二錢

白茯苓

二錢

炙甘草

五分

製半夏

二錢

陳皮

八分

黃柏

二錢

蒼朮

二錢

淡竹瀝 一盞

薑汁 半杯

水全煎午後服

下元虛憊，痿弱不耐步履。當夏濕熱內淫，經脈流行不利，腿足時覺痠楚，大便忽溏忽閉，皆由肝腎為病。然益下之劑並須宣通，絡斯為正治之法。久服冀有功效，方列后。

大熟地

三兩 炒

肉蓯蓉

二兩

巴戟天

二兩

遠志

一兩

當歸身

三兩

白茯苓

三兩

桑椹

二兩

炒白朮

三兩

鹿角霜

五錢

小茴香

一兩

金毛狗脊

一斤

右藥十一味，先以狗脊用酒蒸透，熬成膏，和前藥搗爛為丸。每服三錢，淡鹽湯送下。

索性嗜飲，濕熱必盛，致氣血阻滯，肌肉痺麻不仁，下體重著難移。大凡痿躄在下，病屬肝腎居多，無非濕邪沈著為患，但久病不宜遽行攻伐，緩圖當有轉機。

細生地

三錢

川石斛

二錢

淮牛膝

一錢五分

黃柏

一錢五分

肉蓯蓉 二錢 當歸鬚 二錢 刺蒺藜 一錢 川草薢 二錢

刺蒺藜 一錢 川草薢 二錢

川草薢 二錢

自述素有夢遺之患。精血內奪，無以營養筋骨。腰脊僵僂不伸。周身骨節盡痛。濶然汗出不解。冬月尤甚。擬溫通太陽督脈。以香茸丸。生川烏。

麝香 一錢

鹿茸 三兩

當歸身 二兩

生川烏 五錢

右藥四味各研細末。以雄羊腎三對。用黃酒煮爛。將前藥和勻搗為丸。每服一錢。開水送下。

病已三載有餘。遇冷筋掣。兩足痿弱無力。溺後精滑。肝腎虛已可知。擬用通攝下焦法。

生白朮 三錢

川杜仲 三錢

肉蓯蓉 二錢

白茯苓 三錢

金毛狗脊 三錢

川石斛 二錢

水全煎服

積聚門 瘢瘕痞附

臍下有形。發則覺有氣自小腹上衝心肺而痛。名曰奔豚。是為腎積。

泡附子 五錢

肉桂 五錢

吳茱萸 五錢

當歸身 五錢

川棟子 一兩 李根白皮 一兩 白茯苓 四兩

川樸 姜炒

炙甘草 一兩 川芎 五錢

瞿麥穗 五錢

沉香 一錢五分

木香 一錢五分 右藥十三味共研細末每服三錢薑湯送下

素有積聚腸腑不通濕熱內阻食物難化法宜和中

炒白朮 二錢

蒼朮 二錢
米泔浸炒 淡黃芩 二錢

枳實 一錢

白芍藥 一錢五分 菜菔子 一錢五分

陳皮 八分

雞內金 二分

陽氣式微陰濁僭佔午後即覺疲倦暮夜痛發擬用溫通一法

製半夏 二錢 人參 一錢

吳茱萸 一錢

白茯苓 三錢

炒白芍 一錢五分 薑汁 半盞

水公煎服

病由嗔怒而起腹痛有形緩則氣下鳴響泯然無迹木強侮土是乃瘕疝之屬土虛兼挾積滯若徒施以攻導恐變中滿之慮近復腹痛泄瀉延久防成滯下治之宜慎

川樸 一錢

炒白芍 二錢

白茯苓 三錢

陳皮 一錢

益智仁一錢炒

丁香一錢

水全煎服

食入而痛。是必有積。脹形弦數面黃苔白小便熱黃乾咳不爽。定有溼熱。食痰內阻為患邪無從出之路。是以鬱而為痛。茲用越鞠加味法。
蒼朮二錢米泔浸炒 黑山梔二錢 赤茯苓二錢 川芎一錢
焦山楂二錢 神曲二錢 杏仁二錢 炒白芍
枳實八分 川貝母一錢 枇杷葉露一盞冲 水全煎服
製蒼朮二錢 川樸一錢薑汁炒 橘紅一錢 炙甘草一錢
生薑兩片 大棗三枚 水全煎服

土虛濕聚不主健運。痰食留滯中焦。致有痞滿之患。擬用平胃散主之。

脾胃為倉廩之官。胃虛不能容受。故飲食不思。脾虛不能運化。故積滯不化。皆由土虛氣弱之故。法宜攻補兼施。為扶正却邪之計。方擬于后。

人參三兩

白朮二兩土炒

炒麥芽二兩

陳皮二兩

枳實 三兩

山楂肉 一兩五錢

右藥共研為末用神麃四兩糊為丸每服三錢米湯送下。金匱云堅而不移者名為積病在臟推移不定者名為聚病在腑皆由中土虛衰血氣不運茲用攻伐消導之劑兼加養正扶元之品方列后。

肉桂 一錢

炮薑 三錢

川樸 四錢

吳茱萸 三錢

炒白朮 二錢

黃芩 二錢

茵陳 酒炒 三錢

川連 六錢

辰砂 八分

巴豆霜 三分

右藥煉蜜為丸每服二錢燈草湯下。

初起曾有寒熱腕左隱癖作痛脈形弦細舌苔滯膩是溼熱痰食交阻為患擬用消導法。

製半夏 二錢

白茯苓 三錢

山楂肉 一錢五分

青皮 一錢五分

蘇梗 一錢

雞內金 三錢

沉香 冲 五分

陳皮 一錢

硃砂 三分 香圓 一錢

中虛陽弱，寒積內停，脈遲，當脾而痛，連及腰脅，身常慄慄，惡寒，微通陽以驅沉痼，益火以消陰翳。擬方列左。

肉桂 八分 泡附子 八分 人參 二錢 白茯苓 三錢

炒白朮 二錢 肉蓴蓉 二錢 烏藥 一錢五分 木香 一錢

肝胃不和，兼有寒積，腕間脹滿作痛，脈沉弦而緊，舌苔白膩，口渴不欲引飲，大便似利不利，恐為藏結之證，治法最為棘手，非溫無以通其陽，非下無以破其結，擬用許氏溫脾法主之。

附子 一錢 泡 肉桂 五分 乾薑 八分 川樸 一錢

大黃 二錢 酒蒸 枳實 一錢 水全煎服

自述昔年經阻半載，疑為有孕，後下污穢臭水甚多，因而漸結成塊，八九年來其形漸長漸大，靜則伏於臍旁，動則上攻至腕，連及兩脇，想係水寒氣血凝聚而成，但久病宜用緩攻之法，匪可急切

以圖功擬方開列于后。

肉桂一錢

香附炒一兩

桃仁五錢
炒去皮尖

甘遂三錢
麩煨

五靈脂五錢
醋炒

川棟子五錢
用巴豆七粒炒後去豆

地鼈蟲廿一個

酒浸

三稜一兩
醋炒

蓬莪朮一兩
醋炒

右藥共研細末，煉蜜為丸。如梧桐子大。每服十九。早晚開水送下。
左脇有形攻痛，發則上衝至腕，其積在肝，乃肥氣也。

柴胡二錢

鱉甲二錢

川樸一錢
薑汁炒

陳皮一錢
去白

大麥芽二錢

川芎一錢

扁蓄一錢
薑汁炒

瞿麥穗一錢

沉香五分

木香五分

大黃三錢

青皮一錢

蓬莪朮一錢

水全煎服

六腑濁滯為之聚，推之自能移動。病屬於陽，由氣機流行不暢，濕阻熱蒸，腸中變化傳導失司。茲倣東垣法。

川樸一錢

川連八分

山楂肉二錢

青皮一錢

雞內金二錢

木香八分

蘿蔔子一錢

蘆薈八分

色黃脈弦內有積聚脾胃受傷腹大青筋突露勢恐成爲膨脹但病已年餘之久正氣已虛必須疏補兼施以緩攻取效為宜

川連一兩

生白朮四兩

厚樸二兩

陳皮二兩

雞內金三兩

薑汁三杯

右藥研為末水泛為丸如梧桐子大每服三錢開水送下推之著而不移知為陰邪聚絡脈弦而緩攻伐恐非所宜姑用辛溫入絡一法

肉桂七分

當歸鬚三錢

延胡索二錢

橘核二錢

韭白一錢

水全煎服

右脇攻痛作脹時發時止乃濁陰聚而成瘕病在絡脈凝以和營通絡為主

肉桂一錢

當歸身三錢

小茴香一錢

炒

青蔥管一尺

右脇積聚有形，動則攻痛。是名息責。此為肺積。右脇形浮滑。內必挾有熱痰。是以乾咳心煩。脘悶作脹。擬用平胃散加味治之。
製蒼朮二錢 桑白皮一錢五分 白豆蔻一錢五分 川芎一錢
大麥芽二錢 瞿麥穗一錢 川樸一錢 陳皮一錢
黃鬱金一錢 淡黃芩一錢五分 黃連一錢五分 扁蓄一錢
大黃酒三錢 沉香五分 木香五分 生薑三片
肝鬱氣滯。少腹攻逆而痛。脹形弦濶。擬先條達木氣。免令延成中滿。
大麥芽一錢 山楂肉二錢 白茯苓一錢 青皮五分
製香附一錢五分 雜內金一錢五分 香圓皮八分 縮砂仁三分
病由悒鬱而起。肝木不舒。胃土必受其侮。病久入絡。左脇聚積有形。發必嘔吐涎沫酸濁。寤不成寐。便閉忽瀉。急攻防變脹滿。宜緩圖為妥。擬方列后。

吳茱萸一兩五錢 製半夏二兩 左牡蠣三兩 桃仁去皮八錢