

午 31
31

竹林寺女科秘書



浙 紹

光緒三年重鐫

竹林寺女科秘書

錢醫產十一症方

板存
琉璃廠橋西路南
富文齋刻字鋪吳



序

夫竹林寺女科一書係秘奧不宣者錢醫公

方豈精術因傳也鑑之先君國懋公持幕

省詣太尖不縣茲仍視是籍洞悉其所罕見

力求而自逢症與方法頗廣藉以寶惜珍

藏先君子遊世所遺嗎家兄雲可玉都門命



蠶流傳此因家羈息每有恙未速去安考

珊曰君來序覽閱新集欣以濟坤要

保產良方不惜囊空付梓剞劂以期有益

於世願同心以幸為廣布世切望焉

告

光緒三年丁丑孟夏浙紹沈士鑑赴湖氏謹設

竹林寺女科秘傳

共一百一十一症原本失抄九症今存一百二症

壹症

月經先期來如膽水惡心作熱腰痛并小腹痛面色黃瘦不思飲食乃氣虛之故先用

黃芩湯

黃芩六分 川芎 知母各八分 當歸 白芍 蒼朮各一

甘草炙三分 花粉七分 水煎服後用

調經丸

三稜 莪朮 當歸 白芍 生地 熟地 茯苓



元胡各一兩

川芎

小茴香

大茴香

烏藥各八錢

砂仁

五錢

香附

一兩五錢

米糊為丸黃酒送下

二症

月經後期來如漏水頭昏目暗小腹作痛更兼白帶咽中臭如魚腥惡心吐逆先用

理經四物湯

當歸

川芎

生地

柴胡

白朮

香附

元胡

各一錢

白芍

黃芩

三稜

各八分

水煎臨臥服後用

內補當歸丸

當歸

川斷

白芷

阿膠

厚朴

茯苓

各五錢 續香柳

菴蓉

各一兩

川芎

熟地

各一兩五錢

乾薑

甘草

錢

茯苓

錢

三錢

煉蜜為丸空心黃酒送下

三症

月經或先期或後期不思飲食此症不須理血只宜調和勝脾血旺氣勻自然應期而至用

紫金丸

陳皮

五錢

良薑

莪朮

枳殼

烏藥

各八分

檳榔

砂仁

紅豆蔻

各六分

三稜

一兩

米糊為丸飯後米湯送下

四症

腹內經成一塊兩脇疼痛月水不行惡心發熱頭昏目暗咳



嗽生痰因行經時交媾觸傷或性急所致先用

逍遙湯

當歸 白朮炒 白芍 柴胡 石蓮肉各一錢 花粉八分

黃芩六分 地骨皮二錢 薄荷四分 龍膽草五分

水煎空心服後用

紫苑湯

杏仁一錢五分 桑皮炙 知母炒各一錢 五味子五分 欵冬花六分 紫苑

桔梗 阿膠沖 川貝母 蘇子各八分 水煎服此症宜急

治若延至半載一年後則肌膚消瘦泄瀉不止不可救藥矣



五症

經閉發熱因行經時或產後多食生冷并水果等物所致蓋血見生冷則凝滯初起一二月生寒作熱惡心煩燥若不早治延至半載一年後則變成骨蒸子午面熱肌膚消瘦世間不止百無一生重者用鴉片二釐甘草湯送下有起死回生之妙亦用逍遙湯

紫苑湯

俱見四症

六症

經來腹痛發熱乃餘血未盡之故用

紅花湯

枳殼六分紅花

牛膝

當歸

蘇木

各一錢

川芎

五分

赤芍

三稜

莪朮

各八分

水煎空心服

七症

經來十日或半月不止因喫椒薑熱物過度以致血妄流行

用金狗湯

川芎

金毛狗脊

炒

地榆

當歸

白芷

黃芩

川斷

各八分

熟地

二錢

水煎空心服

八症

經來如黃水是為虛症用

加味四物湯



當歸 川芎 烏藥 元胡各一錢 白芍 小茴香各八分

熟地三錢 薑三片 棗三枚 水煎空心服

九症

經來如綠水無血色乃大虛大寒之症用

烏雞丸

天雄附子三錢 鹿茸 山藥 菝葜 蒲黃炒黑 肉桂 當歸

山萸肉 白芍各一兩 川芎一兩 烏雞肉去油 酒蒸三兩 米

糊為丸空心黃酒送下百丸半月後即愈兼能受孕

十症

經來如白水無血色惡心煩熱小腹作痛面色青黃乃氣血



南京中医药大学图书馆版权所有

兩虛之症用

烏雞丸 見九症

十一症

經來成塊如蔥白色又如死猪血黑色頭昏目暗唇麻赤瘡
症也用

內補當歸丸 見二症

十二症

經來腥臭如夏月之腐乃身體衰弱舊血與新血不接之故

用龍骨丸

龍骨 海螵蛸 牡蠣 生地 各一錢 當歸 川芎 白芍



茯苓各八分 黃芩六分 蜜為丸空心黃酒送下百丸兼服

湯藥

當歸 三稜 莪朮 赤芍 丹皮 白朮 香附

條芩 陳皮 木通各八分 薑一片水煎服

十三症

經來不止如魚腦双腳疼痛不能動履乃下元虛冷更兼風邪之故用

疎風止痛湯

當歸 天麻 殭蚕 烏藥 牛膝 獨活 乳香 石

南籐 紫金丸 骨碎補各一錢 川芎六分 薑三片 葱白



三寸水煎對黃酒一杯空心服

十四症

經來不止如牛膜色昏迷倒地用

硃砂丸

硃砂二錢 茯苓一兩 水為丸薑湯送下五十丸

十五症

經來不止下血泡三四個

如雞蛋大用刀割開如石榴子

昏迷不省人事

用噦味十全大補湯

當歸 白朮 川芎 白芍 人參如無用 茯苓 黃芪

生地各一錢 薑三片 棗二枚水煎空心服



南京中醫藥大學圖書館版權所有

十六症

經來小便痛如刀割乃血門不開之故用

八珍湯

白朮

土炒

人參

白芍

各一錢五分

茯苓

當歸

川芎

各一錢

甘草

炙八分

熟地

一錢

水煎服不效再用

牛膝湯

牛膝

三錢

水一鍾

半煎

牛膝一鍾

磨乳香

一錢

加麝香

少許投

入藥內空心服重者用

硃砂六一散

原本失抄

十七症



經來有筋二條從陰門吊起乳上疼痛名曰吊陰用

川練湯

川練子 豬苓 澤瀉 白朮 大苟 小苟 烏藥

元胡 乳香各二錢 木香 麻黃各五分 檳榔一錢 薑三片 蔥白

三寸水煎服須發大汗

十八症

經來一半潮熱小腹痛又覺饑渴乃食傷生冷血滯不行餘血未盡之故用

莪朮湯

莪朮 三稜 紅花 牛膝 蘇子各一錢 水煎空心服



十九症

經來已盡作痛手足麻痺乃腹內虛冷血氣衰弱之故用

人參四物湯

人參 歸身

白芍

川芎

各一錢

薑三片棗二枚水

煎服

二十症

經來小腹結塊如皂角一條橫過痛不可忍不思飲食面色

青黃用

元胡散

元胡

四錢

髮灰

三錢

共為末黃酒調服半月後其塊自銷

二十一症

