

298

S265-7

1029

壽

疾

新

編

下卷



跌打

玉真散

治一切刀傷、跌傷、打傷、及破腦傷風等症。此乃兵部傳出秘方。天下第一金鎗藥也。

白附子

十二兩

白芷

一兩

天麻

一兩

生南星

二兩

防風

一兩

羌活

一兩

右六味切忌火炒，概宜生用，研極細末，就傷處

敷上，倘傷重須內服者，可用黃酒浸服二三錢。

立愈。但附子、南星須製過。

製法見後

方可服，否則恐

致麻倒。

如受傷數日，傷口膿多者，用溫茶避風洗淨，再敷此藥，無膿不必洗。

按白附、南星宜用生料，用在外敷，立能止血，住痛。



中國醫藥大學圖書館藏

消腫其神效固不可殫述惟內服似宜製過蓋
生南星得防風雖可不麻而與生白附全用終
覺有毒曾見陳修園醫學實在易中所載生南
星用酒炒白附子分兩減半用麩粉裹爲衣置
火上煨熟較爲平穩服之神效若好善君子肯
製此方不如敷服藥各製半料其價甚廉所全
甚多也

回生第一仙丹

治跌傷壓傷打傷刀傷銃傷割

喉吊死驚死溺水死等症

雷擊死雖未試過想亦可治

雖遍

體重傷死已數日，只要身體稍軟，用此丹灌服，少刻卽有微氣，再服一次，卽活。大便如下紫血，更妙。惟身體殭硬者難救。此係豫章彭竹樓民部家傳秘方。道光初年，民部宰直隸時，有人被毆死已三日矣。民部往驗，見其肢體尙軟，打開一齒，以此丹灌服一分五釐，少刻其屍微動，再灌一分五釐而活。其餘甫經毆殺或毆死一二日者，全活尤多。終歲無一命案。維時磁州地震，壓斃甚衆。民部製丹，遣人馳往救活，不下千人。

大有起死回生之妙、誠千古第一仙丹、如能施藥傳方、救得一人之生、可全兩人之命、造福真

無量也

活土驚蟲

又名地驚、又名簸箕蟲、形扁不能飛、大小不等、色黑而亮、背有橫楞、前窄後寬、

以大如大指頭為佳、小者功緩、雄的更好、用刀截為兩節、放地上、以碗蓋住、過夜、其蟲自接而活、方是雄的、隨處皆有、多生米店、有糠之處、及碓臼下、倉底、灶脚、冬天灶脚更多、或生麪舖、或油榨坊、並空屋、乾燥之處、總在鬆土內尋覓、取活的、去足、放瓦上、小火焙黃、研細、用淨末五錢、死的不效、假的更不效、藥店有乾的賣、一看便知、

自然銅

放瓦上、木炭火內燒紅、入好醋、淬半刻、取去、再燒、再淬、連製九次、研末、要親身自製、



藥店製多不透真乳香以形如乳頭黃色如膠

不效用末三錢者為真不真不效每一

兩用燈草二錢五分同炒枯與燈草真陳血竭

同研細吹去燈草用淨末二錢

飛淨真硃砂飛淨巴豆去壳研用紙包壓數次

二錢去淨油用淨末二錢

真麝香

三分要當門子

以上各藥揀選明淨眼同研極細

末收入小口磁瓶

口大藥易洩氣

用蠟封口不可洩氣

大人每用一分五釐小兒七釐酒冲服牙關不

開者打開一齒灌之必活

要藥稱準方效灌時多用水酒使藥下喉

為活後宜避風調養若傷後受凍而死須放暖

室中最忌見火

如活後轉心腹痛此瘀血未淨急將白糖三兩用熱酒或滾水

冲服自愈

製活土蟹蟲法取土蟹數十枚放瓦罐內以紅
花末子養之約至二三十天後不必再加紅花
末子大蟲自食小蟲只剩十餘枚須再照前焙
製好聽用功效更神

七釐散

專治金瘡跌打損傷骨斷筋折血流不止先
以藥七釐燒酒冲服復用藥以燒酒調敷傷
處瘡口大則乾糝之定痛止血立時見效

上硃砂

一錢二分
水飛淨

淨麝香

一分二釐

冰片

一分二

釐
乳香

一錢五分

紅花

一錢五分

明沒藥

一錢五

分血竭一兩兒茶二錢四分於五月五日午時爲

極細末密貯每服七釐不可多服

八釐散 治跌打損傷瘀血攻心將死之症灌藥即醒

土鱉去足生半夏二錢乳香去油一錢沒藥去油一錢自然銅

煨一煨去毛一錢骨碎補煨去毛一錢血竭一錢歸尾一錢礪砂一錢

共研細末磁罐收貯每用八釐好酒送下

治跌打損傷神效膏 此方專治刀斫斧傷跌打損碎敷上立時止痛止血更不作膿

聽其結痂自落卽見全愈傷處須忌風忌水

真麝香六分上四六六分輕粉四兩淨樟腦三兩

跌打



真血結 一兩 真兒茶 一兩 製沒藥 一兩 淨乳香 一兩

兩 以上八味選料稱準共研極細末以密羅篩過

聽用

金鎗鐵扇散神方

此方乃韓士勇得諸盧福堯福堯係塞外神僧所傳治法甚奇驗藥

甚多茲不贅錄得者珍之

象皮

五錢切薄片用小銀煨黃色以乾為度勿令焦

龍骨

五錢用上白者生研

老材香

一兩山陝等省無漆民間棺殮俱用松香黃蠟塗於棺內數十年後有遷葬者棺朽

另易新棺其朽棺內之香蠟即謂之老材香東

南各省無老材香即以數百年陳石灰一兩代

之其效驗可寸柏香一兩即松香一兩與

與老材香同之黑色者松香寸柏香



一同鎔化攪勻傾飛礬一兩將白礬入鍋內熬透便是以上六

味共五兩研爲細末貯瓷罐中遇有刀石破傷

者用藥敷傷口以扇向傷處搨之立愈忌臥熱

處如傷處發腫煎黃連水用翎毛蘸塗之立消

或經多日已爛流膿血者亦用黃連水洗去膿

血敷藥一二日卽愈敷藥時若血流急用扇搨

倘血不流則不必搨倘傷重在地滾跌難以

敷藥可縛其手足令臥涼地用枕墊其首使傷

口漸合卽敷藥搨之自少頃血凝不出三日必

愈此方無論何等重傷、卽人已昏絕、但胸口微溫者、無不可救、人皆知破傷忌風、而此獨用扇搨、不免致人之疑、蓋當傷口初破、熱血迸流、勢若泉湧、不能受藥、惟藉扇力、使血稍涼、乃能凝結、故雖冬月、亦忌臥熱處、傷口不必用布裹、以致過煖、難以結痂、并忌飲酒、以致血熱妄行也、鐵扇散始用此法、餘藥仍宜避風、

黎洞丹

治一切無名腫毒、昏困欲死、並跌打損傷、瘀血奔心、昏暈不醒等症、

牛黃

冰片

各二錢五分

阿魏

雄黃

各一兩

麝香

香 三錢五分 生大黃 兒茶 天竺黃 人參

三七

乳香

去油

沒藥

去油

血竭

膝黃

隔湯煮

十數次去沫

用子

不必用子

羊血拌晒如有山羊血加五錢
不必用子羊血以上藥各二兩

右共爲末將膝黃化開爲丸如芡實大若乾少

用白蜜外用蠟皮封固每服一丸用無灰酒送

下外敷用茶滴磨塗忌一切生冷發物

按此丸藥味昂貴殊難修合廣東購來者頗有神

驗凡遇跌打以及中毒危險重症倘灌下一丸

無不立活真有起死回生之功特附刊以俟大

君子之採擇

治婦人脚閃腫痛方

不必用瓦鋒吸筒此末一敷即愈但不可服以有生半夏故也

當歸尾

二錢

製乳沒

二錢

白芥子

一錢

生半夏

錢五分

肉桂子

一錢

生川烏

一錢五分

共爲極細

末燒酒調敷乾濕得中用布裹之

此方得諸

程友據云授自一張老師精於跌打極爲秘密

臨危時始肯洩出并囑須到二藥店分檢余試

用之價廉效速敷上一夕即痛止腫消輕則一

料重則兩料必愈即男子閃脚及折抑手腕用

之亦效
此方藥味不多而活血散瘀行氣化痰
無法不備真仙方也



言十第

五



新中医大学图书馆版权

中毒

瘋狗咬奇方

此症七日發作、緩則七七日、至百日

定當發作、卒病心腹絞痛、如刀割裂、神識不清、
病劇中心無賴、自抓其胸、嚼其舌、齧其指、齧其
膚肉、甚至嚼衣服磁器、不過二三時卽死、慘狀
難言、欲辨病症是否、須以蒲扇向病人重扇、見
風卽身縮戰慄畏甚、又急鳴鑼、聞聲卽心驚、確
是中癩犬毒無疑、卽驗犬是否病癩、亦以蒲扇
風試、見風卽戰慄、又以鑼聲試、聞聲卽亂竄、確

是瘋犬無疑、當其觸毒、尙未發作、一聞鑼聲、其
癲卽激發矣、人與犬皆然、犬用烏藥一兩、加入
方中、煎水拌飯與食、卽被瘋犬咬傷、斷不發癲、
人則於受毒時、或毒已發時、急煎服一劑、至一
七後、再嚼生黃豆、不作腥氣、不令心惡、欲嘔、毒
尙未盡、急再煎一劑、及至二七三七後、知豆腥
氣、則毒盡矣、永保無恙、方卽人參敗毒散、加地
榆、紫竹根、又驗瘋犬、凡見其舌出流涎、拖尾亂
竄、不吠而咬人者、卽是最易辨也、

真紋黨

羌活

獨活

柴胡

前胡

茯苓