

樂氏病案



南京中醫大學圖書館版權所有

重刊巢氏諸病源候總論卷三十六

獸毒病諸候 凡四論

馬噉踰人候

凡人破馬噉踰及馬骨所傷刺弁馬韁靽勒所傷皆爲毒瘡若腫痛致煩悶是毒入腹亦斃人

馬毒入瘡候

凡人先有瘡而乘馬汗弁馬毛垢及馬屎尿及坐馬皮鞍並能有毒毒氣入瘡致焮腫疼痛煩熱毒入腹亦斃人

獵狗噉候



凡猘狗噛人七日輒一發過三七日不發則無苦也要過百日方大免耳當終身禁食犬肉及蠶蛹食此發則死不可救矣瘡未愈之間禁食生魚豬雞膩過一年禁之乃佳但於飲下飯蒸魚及於肥器中便發若人曾食落葵得犬噛者自難治若瘡瘻十數年後食落葵便發

狗噛重發候

凡被狗噛瘡忌食落葵及狗肉云雖瘥經一二年但食此者必重發重發者與初被噛不殊其猘狗噛瘡重發則令人狂亂如猘狗之狀

蛇毒病諸候 凡五論

蛇蟹候

凡中蛇不應言蛇皆言蟲及云地索勿正言其名也惡蛇之類甚多而毒有瘥劇時四月五月中青蛙三角瘡虺白頸大蜴六月七月中竹狩艾蝮黑甲赤目黃口反鈎白蛙三角此皆蛇毒之猛者中人不卽治多死又有赤連黃額之類後有六七種而方不盡記其名水中黑色者名公礪山中一種亦相似不常聞蟹人又有鉤蛇尾如鉤能倒牽人獸入水沒而食之又南方响蛇人忽傷之不死終身伺覓其主不置雖百人眾中亦直來取



之惟遠去出百里乃免耳又有施蛇長七八尺如船施狀毒人必死卽削取船施煮汁漬之便瘥但蛇例雖多今皆以青條搘尾白頸艾蝮其毒尤劇大者中人若不卽治一日間舉體搘皮肉坼爛中者尙可得二三日也凡被蛇螯第一禁第二藥此二者有全劑雄黃麝香可預辦故山居者宜令知禁法也又惡蛇螯者人卽頭解散言此蛇名黑帝其瘡冷如凍凌此大毒惡不治一日卽死若頭不散此蛇名赤帝其毒小輕瘡上冷不治故得七日死凡蛇毒未愈禁熱食熱食便發治之依初被螯法也



蝮蛇螯候

凡蝮中人不治一日死若不早治之縱不死者多殘斷人手足
蝮蛇形乃長頭褊口尖頸斑身亦艾斑色毒黑人犯之頸腹帖
著地者是也江東諸山甚多其毒最烈草行不可不慎又有一
種狀如蝮而短有四腳能跳來噉人名曰千歲蝮中人必死然
其噉人竟卽跳上樹作聲云斫木者但營棺具不可救若云擣
菽者猶可治吳音呼藥爲菽故也

虺蟄候

虺形短而褊身亦青黑色山草自不甚多每六七月中夕時出

路上喜入車轢中令車轢腹破而子出人侵晨及冒昏行者每
傾意看之其蟄人亦往往有死者

青蛙蛇蟄候

青蛙蛇者正綠色喜緣樹及竹上自掛與竹樹色一種人看不
覺若入林中行有落人項背上者然自不甚嚼人嚼人死此
蛇無正形極大者不過四五寸世人皆呼爲青條蛇言其與枝
條同色乍看難覓其尾二三寸色黑者名螭尾毒最猛烈中人
立死

蠪毒候

此是諸毒蛇夏日毒盛不泄皆嚼草木及吐毒著草木上人誤犯著此者其毒如被蛇螫不殊但瘡腫上有物如蟲蛇眼狀以此別之名爲蠍毒

雜毒病諸候 凡十四論

蜂蟻候

蜂類甚多而方家不具顯其名惟地中大土蜂最有毒一螫中人便卽倒悶舉體洪腫諸藥治之皆不能卒止舊方都無其法雖然不肯殺人有禁術封唾亦微効又有瓠瓢蜂抑亦其次餘者猶瘥

蠍蟻候

此蟲五月六月毒最盛云有八節九節者彌甚蟻人毒勢流行多至牽引四支皆痛過一周時始定

蠶蟻候

陶隱居云蠶蟲方家亦不能的辨正云是蠍蟻子或云是小烏蟲尾有兩歧者然皆恐非也疑卽是蠍蟻尾歧而曲上故周詩云彼都人士卷髮如蠶

蟆𧈧蟻候

此則百足蟲也雖復有毒而不甚蟻人人誤觸之者故時有中

其毒

蜞蜍著人候

江東及嶺南無處不有蜞蜍蜞蜍乃是兩種物蜞者在草裏名爲山蜞在水裏名馬蜞皆長四五寸許黑色身滑人行涉山水卽著人肉不甚痛而痒兩頭皆能嗍人血血滿腹便自脫地無甚毒害蜍者無不背作文理粗澀多著龜螺殼上若著人肉卽於肉裏生子乃至十數枚經日便腫痒隱軫起久久亦成瘡瘍

石蛭蟶人候

山中草木及路上石上石蛭著人則穿嚙肌皮行人肉中浸淫



南京中医药大学图书馆版权所有
1954

卷三十六
起瘡灸斷其道則愈凡行山草之中常以膏和塗足脛則蛭不得著人

蠶噉候

蠶既是人養之物性非毒害之蟲然時有噉人者乃令人增寒壯熱經時不瘥亦有因此而致斃斯乃一時之怪異救解之方愈

甘鼠噉候

此卽鼴鼠也形小而口尖多食傷牛馬不甚痛云其口甜故名甘鼠時有噉人者



諸魚傷人候

魚類甚多其鱸鯢鯉鮀之徒骨芒刺有毒傷人則腫痛

惡颯嗜候

颯房中切

惡颯一名滿大如毒蟬似蝗無尾前有兩角觸後則傍後觸前則卻行生於樹皮內及屋壁間又喜在紙書內圓似榆莢其色赤黑背橫理二月生十月蟄蟻人唯以三時五月六月七月尤毒初如胞狀中央紫黑大如粟粒四傍微腫焮色赤或有青色者痒喜搔之若飲酒房室近不過八九日遠不過十餘日爛潰爲膿汁亦殺人

狐尿刺候

此是野狐尿棘刺頭有人犯之者則多中於人手指足指腫痛
煩熱有端居不出而著此毒者則不必是狐尿刺也蓋惡毒氣
耳故方亦云惡刺毒者也

蚝蟲螯候

此則樹上蚝蟲耳故名蚝蟲此毒以其毛刺能螯人蓋輕不至
深雖然亦甚痛螯處作軫起者是也

蠼螋尿候

蠼螋蟲云能尿人影卽令所尿之處慘痛如芒刺亦如蚝蟲所

蟄然後起細瘡瘻作聚如茱萸子狀其瘡瘻偏赤中央有白膿
如粟粒亦令人皮肉拘急惡寒吐熱極者連起多著腰脇及會
若繞腰匝徧者重也

入井冢墓毒氣候

凡古井冢及深阤窯中多有毒氣不可輒入五月六月間最甚
以其鬱氣盛故也若事輒必須入者先下鷄鴨毛試之若毛旋
轉不下卽是有毒便不可入

金瘡病諸候 凡二十三論

金瘡初傷候

夫被金刃所傷其瘡多有變動若按瘡邊乾急肌肉不生青黃
汁出瘡邊寒清肉消臭敗前出赤血後出黑血如熟爛骨及血
出不止白汁隨出如是者多凶若中絡脈髀內陰股天聰眉角
橫斷肺腸乳上及與鳩尾攢毛小腹屎從瘡出氣如貢豚及腦
出諸瘡如是者多凶少愈診金瘡血出太多其脈虛細者生數
實大者死小者生浮大者死所傷在陽處者去血四五斗脈微
緩而遲者生急疾者死

金瘡血不止候

金瘡血出不斷其脈大而止者三七日死金瘡血出不可止前

赤後黑或黃或白肌肉腐臭寒冷鞶急者其瘻難愈亦死

金瘻內漏候

凡金瘻通內血多內漏若腹脹滿兩脇脹不能食者死瘀血在內腹脹脈牢大者生沈細者死

毒箭所傷候

夫被弓弩所傷若箭鏃有苟藥人人皮脈令人短氣須臾命絕口噤脣乾血爲斷絕腹滿不言其人如醉未死之間爲不可治若榮衛青瘀血應時出瘻邊溫熱口開能言其人乃活毒箭有三種嶺南夷俚用焦銅作箭鏃次嶺北諸處以蛇蟲毒熬物汁

著管中潰箭簇此二種纔傷皮便洪腫沸爛而死唯射豬犬雖
困得活以其噉糞故也人若中之便卽食糞或飲糞汁并塗瘡
卽愈不爾須臾不可復救箠箭著寬處者雖困漸治不
死若近胷腸便宜速治小緩毒入內則不可救

金瘡腸出候

此謂矛箭所傷若中於腹則氣激氣激則腸隨瘡孔出也

金瘡腸斷候

夫金瘡腸斷者視病深淺各有生死腸一頭見者不可連也若
腹痛短氣不得飲食者大腸一日半死小腸三日死腸兩頭見