

未1

4342.

外科輯要

上海千頃堂書局印行



外科輯要卷三

當湖邵澍子雨氏輯

洪寶膏

一名抑陽散治癰腫熱症兼治金瘡出血

天花粉

三兩

薑黃末

白芷末

不見大各一兩

赤芍末

二兩

附加減法

大熱症茶湯調敷

溫症淡酒調敷

提膿薑汁三分茶湯七分調敷

瘡口破處肉硬不消加獨活末酒調不應加紫荊皮

金瘡血濺在頭面茶調敷項上在手足茶調敷瘡後以斷血潮之路

金瘡着水翻花薤汁調敷以火微炙水出即愈

吐血鼻衄并花水或艾汁調敷項上立止

湯火瘡雞子清調敷

跌撲損傷在胸膈間者用綠豆湯下吐出即安如天寒血凝服藥不效加軍薑末酒飲之

此方能退腫破血去腐生肌却又能使血凝氣滯故癰疽不可輕用恐其寒凝治癰疽力

中和膏

一名陰陽散治癰疽半陰半陽及冷熱未明者誠良方也



紫荊皮

五兩

獨活

三兩去節炒

赤芍

二兩

白芷

一兩不見火

木臘

即石菖蒲兩半勿見火

附加減法

熱症倍紫荊皮木臘

寒症微加赤芍獨活

初起勢甚葱湯調減後酒調因葱散酒溫故也

瘡面有小泡先敷四味後用木臘蓋上

四圍黑暈不退瘡無血色是冷藥之故加肉桂當歸暈退除去

痛不可住酒化乳香沒藥調敷

流注筋不伸者加乳香

瘡口着風赤肉突出加南星薑汁酒調不應非按膿太重即涼藥所致另以枯白礬撲硝敷

之次用硫黃揆之

熱症不可便用涼藥配洪寶膏葱湯調敷

一切癰疽流注寒熱未明者俱以此藥敷消之

流注在緊要處將此方葱調厚敷患處另用獨活末酒調敷一出路盡處以玉龍誘之如已

成膿則引不下

癰疽初起單用白芷紫荊皮酒調敷以消之各一勝膏單用赤芍木臘紫荊皮作箍藥各三



南京中醫藥大學圖書館藏

勝膏

癰疽欲其成膿以玉龍敷瘡頂四圍以此方敷之

瘡根以洪寶竈住未甚者此方不必但用洪寶

發背初起單用紫荊末酒調竈住自然撮細不開加南星草烏三分之一可以潰膿不痛久損亦加南星草烏酒調敷至妙

小兒軟痂初生單用紫荊皮木臘酒調敷消之已成用本方

癰疽發於手足痛不忍以此方圍之另以洪寶敷於手足脛骨節處一二寸以截血潮之路

回陽玉龍膏

治白疽冷疽流注鶴膝久損痛痺寒濕脚氣冷血風諸症

草烏

炒三兩

軍薑

二兩煨樞要無

肉桂

五錢忌火

南星

煨白芷忌火

赤芍

各一兩

附加減法

冷症平漫無紅腫熱痛者熱酒調敷

癰疽為涼藥所候瘡平黑爛以此敷之外用洪寶托住用藥後陽回色紅即住此藥以中和

收功不應於冲和內加南星草烏如中心有一點黑爛不紅者另以腐藥去之

冷疽流注附骨疽若骨寒而痛筋骨不伸宜以此藥敷之但流注宜加木臘少許

鶴膝以此藥敷膝蓋骨上腫痛處又以冲和敷下腿冷處復以此方敷脚脛骨處以引血脉

冷痺血風痛用夾袋貯藥繫之

冷脚氣加生麵薑汁數另加酒化乳香沒藥痛立止
久損入骨瘀血作痛遇寒則發熱酒敷

石疽熱酒調敷外以洪寶泥住

乳癰初起加南星薑汁酒調敷消之如已成則宜冲和或加南星草烏必須加乳沒以住痛
宿痰失道癰腫無膿以此點頭病必旁出再作為佳

元虛敗症急以此方全體敷之拔出成膿

內癰初起隱痛外面微腫急以此拔作外癰

凡癰疽色轉紅活不可過用宜冲和收功

如欲潰膿以此藥貼瘡頂外以冲和圍之自破如膿出不快用三分薑汁七分茶湯調洪寶
敷之自快

如內癰已成不能拔出及自能出外者勿用此方但用冲和使氣血溫而膿成自出

孕婦勿用此藥始
終用冲和為安

凡用此方須要洪寶泥住如現症
未明祇用冲和加南星草烏要

四虎散 治白疽初起重如負石筋脈不舒
及腫硬厚如牛皮不痛不作膿者

草烏 狼毒 南星 半夏 各生用

右為末用猪腦打爛遍敷瘡上留頂出氣如覺大熱不妨未成即消已成色即紅活用熱



南京中醫藥大學圖書館藏

酒調亦可

鯽魚膏

治乳岩初起及對口發背石疽瘻包皆效

活鯽魚

鮮山藥一段

右打爛敷四圍留頂未成即消已成即潰

青龍膏

治紅癰赤腫不論已成未成敷之皆驗中留瘡頂未

綠荳粉

草烏五錢 南星兩半 煨

附加減法

欲散加麝香少許葱湯調

欲潰加雄黃酒調

欲作圍醋調

欲止痛加乳沒蜜調

綠荳粉代以陳蒸粉更妙又方藥末五兩豆粉減半以白芙蓉葉打汁拌晒乾再拌再晒至深青色為度

烏龍膏

治一切癰疽赤腫四圍紅腫赤暈不消者其效如神

陳小粉

草烏五錢 去 土木鱉殼 半夏生切片

右共文火炒焦黑為度研細以新汲水調敷自外向裏留瘡頂一日一換醋調亦可



芙蓉葉既清熱解毒又能涼血束毒故有以此一味為末加入蒼耳灰者或加赤小豆末者名曰清涼膏陳小粉愈陳愈妙其性粘膩故亦有以此一味為末加入五倍參者亦名烏龍膏

二味拔毒散治紅癰赤痢疥癬諸瘡及一切無名腫毒紅腫痛痒者大效

明雄黃 明礬各等分

右為末茶湯調敷瘡上潰瘍勿敷

真君妙帖散治一切無名腫毒及異形異類頑硬惡瘡散漫無膿者以此敷之不論痛即痛者即止兼治天泡火丹肺風酒刺遮眼錢頭并一切皮破流血濕爛痛若諸瘡

明淨硫黃十斤為末 蕎麥 白麵各五斤

右三味以清水和成麵打成薄餅單紙包好掛風中陰乾愈陳愈佳臨用研細無名腫毒

涼水調血流破爛者麻油調天泡火丹等散汁調

五龍膏治癰疽腫毒初成敷之能拔毒散腫

五龍草 車前根葉 稀薺草 銀花 陳小粉各等分

右加鹽少許搗爛遍敷瘡上中留一頂帛蓋避風或為末醋調敷

五龍草一名五爪龍即烏蘇菰俗名老鴨眼藤

坎宮錠子治熱毒腫痛癰疽赤諸瘡并瘡疔瘡最驗有頭者留頂

金墨雨 胡黃連 兒茶各二錢 熊胆三錢 麝香五分 牛黃三分 冰片七分

右研細末以猪胆汁為主稍加大黃浸取汁薑汁及米醋少許和成錠晒乾水磨敷

離宮錠子

治疔瘡及一切瘰癧脫疽等症凡疔瘡木痛痒者敷四圍紅腫處

金墨

兩 蟾酥

胆礬

血竭

錢各三

麝香

錢半 硃砂

二錢為衣

右以涼水和成錠水磨敷如難成錠少加煉蜜

又斤瘡圍藥用雄黃白礬等分研末密水敷痛加乳香一半

坤宮錠子

治紅癰赤腫初起者圍之即愈無名腫毒

雄黃

熊黃

銅綠

胆礬

硼砂

皮硝

草烏

各一兩

麝香

錢二

蟾酥

錢三

右以醋為條水磨敷或醋磨亦可

又大黃末一味入猪胆風乾研末再套如此三次臨用以滾醋一碗加薑汁少許搗成錠磨塗赤癰名一筆消

兕宮錠子

治癰疽疔瘡流注痰包初起者及耳痔耳挺等症敷之即消不可入口用法與白

白靈藥

即後白降丹四錢

銀黝

人中白

寒水石

各二錢

右以白芨麵打和為錠每用以陳醋磨敷患上如乾再上

此藥有毒不可入口

大提藥

治諸毒不起敷之即起圍敷初起發背對口惡疽四五日可消

大紅昇藥

半錢

雄黃

熊黃

當門子

錢各一

硃砂

分三

右將葶麻子淨肉三錢打爛和藥不可乾不可泄氣宜磁瓶收貯用象牙匣藏外用虎皮

包好



一法草麻子一味打爛鋪絹上紮於患處能拔毒止痛惟紅腫非常者不得已用之白疽

陰症提藥治陰症初起色白不甚腫附骨極痛者敷之能提出陽分自然紅腫高起

生白芥子末 生半夏末 生山梔 飛麵各等分

右以葱汁白蜜調敷上留一小孔乾則以葱蜜潤之一日二換

陰症敷藥治純陰症初起重如員石平漫不起不紅不痛者敷之致痛則生

艾葉 硫黃 雄黃各五錢

右藥入鍋煮半日打爛乘熱分一半敷患上冷則易之

如意金黃散此方統治紅腫赤痢濕熱諸瘡凡紅腫痛痒濕爛者皆效

天花粉四兩 大黃 川柏 薑黃 白芷各二兩 陳皮 甘草 厚樸 蒼朮 南星各八兩

右切片曬乾磨極細末貯勿泄氣夏月紅癰赤痢未成膿者茶湯加蜜調四時未成膿者

葱湯加蜜調欲作膿酒調皮膚紅熱色亮游走者蜜水調天泡火丹黃水漆瘡大藍根葉

汁調湯火發傷皮膚濕爛麻油調漫腫無頭皮色不變者勿敷

大藍即靛草如無馬蘭豆代之

鐵桶治癰疽發背潰後根脚不收束者用之如神

五倍子一兩淨 銅綠 白芨各五錢 明礬四錢 鴨嘴胆礬三錢 輕粉 鬱金各二錢 麝香五分

先將陳米醋一大碗文火熬至一小盃以金黃泡起為度調藥敷瘡根以綿紙蓋之



鐵箍圍

治一切癰疽初起登之即消已成膿者圍宜留頂

芙蓉葉末

乾陰

白芷

白芨

五倍子

川烏

草烏

南星

大黃

各等分炒黑

共為細末另加炒黑陳小粉照諸藥加倍磁瓶收貯用醋調敷如上法蜜調亦可

萬應針頭丸

治腦疽背疽疔瘡及一切惡毒大症危急欲死者一粒即愈亦可代針

礞砂

蟾酥

輕粉

血竭

各三錢

元麝

二錢

片腦

一錢

蜈蚣

一對全用

右為細末煉蜜為丸如瘡有頭以針挑見血將藥一黍米大放瘡內上用唾粘紙蓋之如

腋見無頭瘡即是暗疔將兩手虎口上白紋挑破如前法用戒雞鴨酒麪

替針丸

治紅癰赤痢成膿不潰或潰後膿出不快者納瘡口使膿不滯

白丁香

礞砂

各一兩

乳香

沒藥

各八兩

白糯米

一百四十粒

以飯為丸如麥大每用一粒粘貼即破

白糯米以爐灰水淋用水調風化灰一

保命針頭丸

治疔症同萬應針頭丸以人乳搓作細條子晒乾切薄片用津粘貼更妙

蟾酥

乳香

右以乳為丸如樗大津貼瘡上毒氣自除

白麥飯石膏

治癰疽不論陰陽如已成未潰小膿圍之即熟有膿即潰潰後能排膿如滿遍敷赤處但留瘡口雖肌肉腐爛但內膜不穿以布攤貼亦能取安

白麥飯石

二兩醋煎十餘次研細末

鹿角

四兩大燉燄盡為度研細末

白薇末

二兩精要無此



右三味細則止痛粗則反痛用米醋煎滾調敷潰瘍先用猪蹄湯洗淨一日一換

六合回生丹 治發背癰疽潰爛者能拔毒盡絕有回生之妙及對口腫瘡下疳諸症

鉛粉 輕粉 銀硃 雄黃 乳香油 沒藥 去油各二分半

凡用先將濃茶洗瘡拭乾後將猪腰剖開搽藥四五分貼上發熱如蒸良久取去一日一換瘡小一次可愈下疳將腰子穿開納藥於內籠套之腫瘡以黃臘化黃丹少許攤紙搽

一二分貼之

二味化毒散 治癰疽潰爛毒氣未盡反諸熱熱瘡瘍紅腫濕爛者

雄黃 兩 滑石 兩四

凡洗後用此搽

欲止痛 加乳香

冰蠟散 治癰痔瘰癧等症凡頭大蒂小者皆可以此治之先以針輕輕挑損患上以津粘少許作餅貼之紙蓋十餘日其核自落即以紅玉膏搽之

大田螺 七個 金頂砒 錢二分 硃砂 分三 冰片 分一

大田螺去殼掛日中晒乾切片研有用五枚者金頂砒有白砒麴裏煨者

枯瘤散 治瘤初起成形未破者及根蒂小而散者

白砒 硃砂 輕粉 黃丹 雄黃 乳香 沒藥 硼砂 各一 班貓 個 田螺 三個 去殼

研

共研細末糯米粥調作小卷子樣晒乾先炙三炷以此貼之外以水調黃柏末蓋藥上十日後其瘤自然枯落用斂瘤膏敷之

蝕腐錠子一名翠雲錠子治瘰癧疽發背等瘍潰後腐肉不脫以此化之

銅青錢四 麝香分五 杏仁十四粒去皮尖另研 枯礬 韶粉 乳香 青黛各錢半

丁香錢各一

右為細末臨時用軟飯和餅子看瘡淺深經之

無死肉去
白丁香

一法以巴豆一味燒存性用
乃薛氏妙法也名為烏金膏

追膿錠子一名黃雲錠子

自然銅 川芎 白芷各五錢

黃連 白斂各二錢半 木香錢半 麝香分五

右研細末以飯為錠子

右二方為潰瘍必用之藥凡瘡口深窄者先以綿杖子去膿維藥至底淺者以乾末搽之乾者油調

化腐定痛散治潰瘍紅熱腫痛有腐者以末撒之

生石膏一兩甘草水漂五六次 辰砂四錢

硼砂一兩 冰片分四

生肌定痛散治潰瘍紅熱腫痛已脫者為末搽之

煨石膏一兩 血竭 乳香 輕粉各五錢 冰片錢一



有水加煨龍骨生白芷各一錢不收口加雞裏金一錢灸

石脂生肌散

此方生肌之力太

赤石脂

一錢

血竭

一錢

輕粉

官粉

白占

龍骨

各二錢

乳香

製

沒藥

製各一錢

冰片

一錢以煨石膏一錢易官粉其血竭白占少錢

二味生肌散

治潰瘍用二味化毒散後以此珍之內

軟石膏

一兩

黃丹

三錢

欲止痛

一錢去黃丹加龍骨三錢血

收口珍珠散

治諸瘡毒盡却破爛不

兒茶

乳香

沒藥

血竭

早三七

各三錢

冰片

一錢

麝香

分二

早三七即草三七杖傷倍之有水加煨龍骨一錢欲速收口加珍珠一兩蟹黃二錢取團

臍熟黃晒乾備用或用豬油黃蠟調攤亦可

一用鹿腿骨煨紙包灰內煨之以黃肥為度不可過焦研極細末珍之生肌最速

生皮珍珠散

一名日

青缸花

輕粉

珍珠

錢一



下疳用猪髓調搽

右方治新肉已生但不生皮及湯火傷下疳腐痛諸症青紅花即乾散花如無以青錢一

一用雞子清晒乾刮取

木研細搽之其效如神

平安餅治潰瘍惡肉不脫作餅照瘡大小以貼毒根日易一次不痛自落如餅硬用津潤不

烏梅肉錢輕粉分五

二味共研以不見粉亮為度

凡諸瘡肉突出寸餘者以烏梅一味煨灰

退管方治一切漏管先以猪棕擇其深淺然

角刺尖末拓樹膜五錢紅腹金錢鱉三錢

各研細末和合再研以無聲為度

鐵筆圈治瘡疽已成不能消散

膽礬三兩同紅米雄黃一兩月石二兩

先將膽礬月石入鍋內熔化次入雄黃末攪勻離火冷定研細末入麝香末五分研勻收

貯臨用以燒酒調新筆蘸藥圈瘡四圍漸圍漸小膿熟方針

紫金丹治瘡瘍久不收口并



白礬 水銀

鍾乳石

各一兩

焰硝

兩八錢

硃砂

雄黃

各二錢

先將白礬入鍋內熔化同雄黃末攪勻至枯入餘藥共研至不見星入罐內封固照常藥法昇好待冷開看如金色者為上用清水漂過再研極細每兩入冰片三分凡用法以雞子油塗瘡上然後上藥再用膏藥封貼

山蓮散

治潰爛不堪但內膜不穿者應手取效毒未盡者勿敷

大活鯽魚

去一尾

山羊屎

不拘數

以羊屎入魚腹瓦上文火炙燥研末搽之

一用

山羊屎一味炒研末搽之

推車散

治附骨疽骨槽風敷之多骨自出以紙為藥線亦能退管

螻蛄

一兩

乾薑末

錢五

各研極細末吹之其骨不痛自出

蛇蝎化堅散

治破後不潰瘡口堅硬者傷風也

蜈蚣

去頭尾研末

全蝎末

二味等分用葱湯調敷瘡口硬處

一方有木香末

薑礬定痒散

治腐瘍入水發痒及白爛諸瘡不可思者皆效



乾薑末 枯礬等分

先以茶湯加鹽少許洗後以藥撒之

乳香定痛散 治潰瘍紅腫疼

乳香 去油各 沒藥 三錢 滑石 七錢

寒水石 一兩 冰片 二錢

各為細末和合密貯勿泄氣

一法用乳沒二味等分搽之能使毒水淋

拔疔散 治一切疔瘡痛痒麻木者宜挑破擠去惡血以藥敷之兼治牙疔凡刀鐮疔不可用

硃砂 硃砂 白礬 煨 食鹽 煨

共為末敷

一法平時以鐵器浸水中臨用取鐵綉醋調敷之一以上號吸鐵石研細末醋調敷或搽

拔疔丹 治同上一切惡

乳香 沒藥 胡桃夾 一分 草麻肉 二分

為丸嵌之

拔疔餅 治同上

荔枝肉 一分 吸鐵石 一分 雄黃 三分

打作三餅三次貼之其疔自落



北京中醫藥大學圖書館藏

一法面上生火疔用莊卿打爛敷之莊卿為火中之物從治法也或俱用蟾蜍肝貼之即蟾酥意也唇疔緊急兼刺爛敷之因蝸牛水中之物亦從治法也

委中穴出血

追疔丹

治疔毒初起其勢緊急者不可用小方候事宜用此方四圍以離宮定于圍之

雄黃錢

巴豆去油不

蟾酥酒

蜈蚣全

硃砂

輕粉

白丁香

硃砂

各錢

右為細末以麵糊為丸如麥形入針孔以白芨膏蓋之以護好肉白芨細末放水面上待其沈下去水攤紙貼之名水澄膏

立馬回疔丹

治疔走黃或初發于頭面其勢緊急者須挑去疔根以藥插入或痛反不痛腫反不腫必煩復痛腫追出膿血為效

金頂砒分五

蟾酥酒

硃砂

白丁香

輕粉錢各一

蜈蚣全一條

雄黃

硃砂

麝香分三

乳香分六

麵糊為麥形用法同上

九一丹

疔毒已退以此搜膿化毒外貼琥珀膏

黃靈藥分

煨石膏分

為末搽患處

鐵粉散

治冷疔生于足根初起發紫白胞疼痛徹骨漸生黑氣腐爛孔深血水氣穢經久不

生針砒錢三

黃丹飛

輕粉

松香錢各一

麝香分

研細先以葱湯洗患處香油調敷油紙蓋孔

生針砒或用黑鉛四兩化開傾水中再傾再化以鉛盡為度去水取灰代之