

驗方擇要卷四

鐵嶺儀臣鳳 岐輯

江夏蔣棠戚克昌

會稽炳侯陳邦輝

目錄

婦科諸方

胎前

臨產

小產

驗方擇要

卷四

目錄



產後

小兒科雜治

初生去毒開口法

保嬰各法

臍風

疳疾

驚風論

慢驚風

急驚風



南京中醫藥大學圖書館版權所有

婦科諸方

胎前

保產諸方

保產無憂方

專治一切產證有胎卽能安胎臨產卽能催
生不拘月分凡胎動不安腰痠腹痛一服卽
安再服全愈 臨盆艱危者一服卽安 橫
生逆產六七日不下及兒死在腹中命在須
臾亦一服卽下懷孕者七個月卽宜預服七



個月一劑八個月服二劑九個月服三劑十

個月亦服三劑臨產服一劑斷無難產之患

百發百中功效如神

紫厚樸

薑汁炒

蘼艾

醋炒各七分

當歸

酒炒

川芎

各壹錢五分

生薑

荆芥穗

各八分

川貝母

去心淨為末不入煎以藥沖服

兔絲子

揀淨酒泡

各壹

川羌活

生甘草

各五分

枳壳

麴炒六分

白芍

酒炒二錢冬月

只用

壹錢

藥須照方揀選泡製後用戥稱準不可加減分毫引

用老生薑

三片

水二大鍾煎至八分服預服者空心



溫服臨產及胎動不安並勢欲小產者皆臨時熱服
如人虛極再加人參三五分更妙已產後此藥一滴
不可入口切勿誤服此方藥劑分量雖輕功效甚大
不論強弱老少皆宜

佛手散

治胎氣受傷或子死腹中疼痛不已口噤昏
悶或心腹脹滿血上衝心服之生胎卽安死
胎亦下又治橫生倒產須先安卧將此藥煎
服再行安卧自然順生若兒手足在外未能

收入切不可亂動惟少以食鹽塗兒掌用指甲輕搔之並以鹽摩母腹安卧一時自然收入藥宜早備以資急用

當歸

壹兩

川芎

七錢

水七分酒三分同煎至七分服

若治橫生倒產及死胎則加

黑馬料豆

壹合

炒焦

乘熱淬入水中加童便一半煎藥服少頃再服一劑神效此方又治產後腹痛發熱頭痛能逐敗血生新血除諸病

加味芎歸湯

專治難產及陰氣虛弱交骨不開催生如神

藥宜早備以資急用

當歸 壹兩 川芎 七錢 生龜板 手大一塊醋炙研末藥店中多以熬過龜膠之

板混用必自行看過實 婦人亂髮 蛋大一團 用水二

碗煎一碗如人行五里之久即生若死胎亦即下也

有人產門不開兩日未生服此一劑即產真聖藥也

安胎飲

專治婦人慣於墮胎屢試神驗無小產之患

者服此亦妙一婦人小產六次百藥無效後



服此方連生數子無恙屢試如神百發百中

眞保胎第一方也

蓮肉

去心不去皮

家用青苧麻

洗淨膠

白糯米

各叁錢

水煎去

麻每早連湯服一次或服湯不服蓮肉糯米亦可

小產由於房勞傷損足三陰腎傷則精氣不固肝傷則血熱妄行脾傷則胎元自墮蓮肉清君相之火而能固澀眞氣苧麻利小便而通子戶清淫慾之瘀熱糯米補益脾陰能實陽明空竅使胎氣自安以五穀果實爲方誠王道之劑也

泰山磐石散

治婦人氣血兩虛或肥而不實或瘦而血熱或肝脾
素虧倦怠少食屢有墮胎之患此方和平兼養脾胃
氣血覺有熱者倍黃芩少用砂仁覺有胃弱者多用
砂仁少加黃芩更宜戒惱怒慾事屏酒醋辛熱之物
可保無墮

白黨

炙芪

川芎

黃芩

川續斷

各壹錢

白芍

酒炒

熟地

各八分

白朮

二錢土炒

炙草

砂仁

各五分

糯米

叁錢

用

泉水煎服但覺有孕隔三五日常用一服過四個月

方保無虞其藥渣可傾入河池內與魚食之以有糯
米故也 徐東臯曰婦女凡懷胎三兩個月慣要墮

落名曰小產此由體弱氣血兩虛臟腑火多血分受

熱所致醫家安胎多用艾附砂仁熱補之劑是速其

墮矣殊不知血氣清和無火煎燥則胎自安大抵氣

虛則提攝不住血熱則濫溢妄行欲其不墮得乎香

附雖云快氣開鬱多用則損正氣砂仁快脾多用亦

耗真氣況香燥之性血氣兩傷求以安胎適所以損

胎也惟泰山磐石散千金保孕丸二方能奪化工之

妙百發百中神效非常

千金保孕丸

治孕婦腰背痛慣於小產服此可免墮胎之

患

厚杜仲

四兩切片用白糯米炒斷絲

川續斷

式兩酒拌炒

共爲末以山

藥

六兩

煮糊爲丸如桐子大每服八九十丸用米湯

空心送下戒惱怒忌食酒醋猪肝發火等物





南京中医药大学图书馆版权所有

婦科諸方

臨產

臨產須知

六字真言 一曰睡 二曰忍痛 三曰慢臨盆

初覺腹痛先要自家拏定主意要曉得此是人生必然之理極容易之事不必驚慌但覺痛一陣不了又疼一連五六陣漸疼漸緊此是要生方可與人說知以便何候若疼得慢則是試疼祇管安眠穩食不可亂動此是極要著意留心乃是第一關頭不可忽畧



若將試痛認作正生胡亂臨盆則錯到底矣

此時第一要忍痛爲主不問是試痛是正生忍往疼照常吃飯睡覺疼得極熟自然易生且試疼與正生亦要疼久看其緊慢方辨得清千萬不可輕易臨盆坐草揉腰擦肚至囑至囑再站時宜穩站坐時宜正坐不可將身左右擺扭須知此處要自家作主他人替不得與自己性命相關與別人毫無干涉也

到此時必要養神惜力爲主能上牀安睡閉目養神最好若不能睡暫時起來或扶人緩行幾步或扶棹

站立片時疼若稍緩又上牀睡總以睡爲第一妙法
但宜仰睡使腹中寬舒小兒易於轉動且大人睡下
小兒亦是睡下轉身更不費力蓋大人宜惜力小兒
亦宜惜力以待臨時用之切記切記

無論遲早切不可輕易臨盆用力切不可聽穩婆說
孩兒頭已在此以致臨盆早了誤盡大事此乃天地
自然之理若當其時小兒自會鑽出何須著急因恐
小兒力薄其轉身時用力已盡及至產門不能得出
或亦有之宜稍用力一陣助之則脫然而下蓋此時

瓜熟蒂落氣血兩分渾身骨節一時俱開水到渠成
不假勉強及至生下卽產母不知其所以然矣
或曰大便時亦須用力如何生產不用力不知大便
獸物必須人力小兒自會轉動必要待其自出
不必用力正切忌用力蓋小兒端坐腹中及至生時
垂頭轉身向下腹中窄狹他人有力難助要聽其自
家慢慢轉身到產門頭向下脚向上倒懸而出若小
兒未曾轉身用力一遍則脚先出以爲詫異且贈之
美名曰腳踏蓮花生或轉身未定時用力一遍則橫

臥腹中一手先出又名之曰討鹽生卽或轉身向不
畧不條直用力畧早亦或左或右偏頂腿骨而不得
出不知此等弊病皆是時候未到妄自用力之故舉
勸世人萬萬不可用力然亦非全不用力但當用力
祇有一盞茶時耳其餘皆不可亂動者也卽如大便
未到其時縱用力亦不能出而況於人乎

或問何以知此一盞茶時而用力乎曰此時自是不
同若小兒果然逼到產門則渾身骨節疎解胸前陷
下腰腹重墜異常大小便一齊俱急目中金花爆濺