

298.

S265-7

1028

壽
支
新
編
中
卷



目疾門

消風養血湯

治目赤腫痛

荆芥 蔓荆子 菊花 白芷 麻黃 防風

桃仁

去皮尖

紅花

酒炒

川芎

各五分

當歸

酒洗

白芍

酒炒

草

決明 石決明 甘草

各一錢

水煎服、洗亦可。

蟬花散

治肝經蘊熱。風毒上攻眼目。翳膜遮睛。赤腫疼痛。昏暗視物不明。隱澁難開。多生眵淚。內外障眼。

草決明

炒

甘菊花

川芎

不見蟬退火

土

洗去

山梔子



穀精草

防風

不見火

黃芩

蔓荆子

木賊草

羌活

不見火

荆芥

蜜蒙花

白蒺藜

炒去刺

甘草

各等分

右爲末

每服二錢，用茶清調服，或用荆芥湯

入茶少許調服亦得，食後及臨卧時服。

此去翳

洗刀散

治風熱上攻火眼赤痛，驟生雲翳。外障遮翳。

防風

一錢

麻黃

五分

荆芥

五分

川芎

五分

羌活

八分

分蔓京子

四分

薄荷

四分

獨活

五分

石羔

一錢

滑

石

一錢

歸尾

一錢

赤芍

八分

大黃

五分

黃芩

五分

連召

五分

元參

五分

芒硝

五分

菊花

五分

梔子

四分

分木賊五分蟬退五分草決明五分白蒺藜五分

細辛三分甘草三分白朮五分桔梗五分共爲粗

末加清茶葉分兩次水煎數沸服。

此方藥味雖雜而治風熱上泛之時眼殊有奇

功然必口乾而渴小便短赤大便閉結者投之

乃能效如桴鼓也見症既的萬勿疑畏風火眼

疾倘醫治法不善或一味辛散火得風益熾或

一味寒涼血得冷則凝往往有致人瞽目者殊

可浩歎此散妙在表裏兩解涼劑雖多決不閉

又一味寒涼血得冷則凝往往有致人瞽目者殊
可浩歎此散妙在表裏兩解涼劑雖多決不閉



遏真良方也。如風火輕。或夾風寒者忌用。
又有風火時眼。數日後目赤如血。腫痛欲裂。小便
滯滯。大便閉結。或偏左頭目掣疼。或脇肋脹痛。
口苦耳鳴。煩躁不安。左關脈弦數。確知其爲肝
風胆熱者。速用龍膽瀉肝湯。胆草梔仁生地當歸柴胡黃芩木通
澤瀉車前加酒大黃二三錢。歸尾二錢。桃仁一二錢。
爲釜底抽薪之法。連服數劑。其效如神。

凡風火時眼。目赤腫脹。頭目昏痛。羞明畏日。淚流
盈頰。偏於風寒而熱不重者。消風養血湯。一二

劑可愈。若赤腫翳多隱澁難開，宜用蟬花散。口渴小便短赤，大便閉結風火上攻，紅腫痛甚。偏于熱重者，洗刀散或龍胆瀉肝湯加味最驗。風火時眼有此數方不必另請眼科，決無不愈之理。但貴人善於化裁耳。

敷火眼及風熱眼方

生南星

五錢紅飯豆五錢

共爲末，取生姜自然汁，

調作二餅，貼兩太陽穴。

此方寒眼尤宜。

又敷火眼痛

極用大紅棗取肉五六枚，葱三四根，共搗如泥，

作二小餅，閉目貼之，令其發散自愈。蓋眼無風寒，必不疼痛。以此疏散，立時見效。昧者以爲火眼，必用涼藥敷點。而用芩柏之類，不知遏抑其寒邪，不能外出。若非真屬火症，必變眼珠疼痛，久不能愈。慎之。

金露散

治目赤腫痛、翳障諸疾

天竺黃新香海螵蛸不必月石各二兩
硃砂飛蘆甘石片子者佳，煅童便淬七次，飛淨八錢爲極細末，磁瓶收貯，每用時旋取數分研入冰片少許，諸目疾皆妙。若治

外內皆障取一錢許加珍珠八釐須放豆腐中蒸熟用臘

礬三釐若爛弦風眼每一錢加銅綠飛丹各八

釐如赤眼腫痛每一錢加乳香沒藥各五釐

治法同上此散善磨翳障除昏暗

磨光散

野荸薺粉

洗淨去皮石臼中搗爛密絹絞汁蘆甘

研細

石

用黃連黃柏黃芩甘菊薄荷煎水煅後入

入

滓入再用童便淬七次將藥水飛晒乾

珍珠豆

腐內煮過研細水飛每荸薺乾粉一兩配製過甘石五錢珠末二三錢各將磁瓶收貯臨用漸漸配和加入

冰片少計點之

水眼藥秘方

治諸般眼疾

羊腦蘆甘石

一兩童便浸春五夏三秋七冬十日
取出打碎放新瓦上火蝦二盞漂淨

焙乾山東黃丹

一兩水飛

辰砂四錢研細

水飛過

真麝香

三分研細

去油四錢熨

真沒藥四錢熨

去油

白硼砂二錢研細

細水飛過海螵蛸

一兩去衣研細

水浸漂淨焙乾

破大珍珠五分製

見前

右藥九味研極細末

直研至無聲爲度

每味稱準外煉

上白蜜八兩

要煉三次用

細絹濾三次將藥調成膏子用磁

罐盛熔蠟封口愈陳愈佳點一切眼疾神效

礞石丸

治神水寬大漸散昏如霧露中行漸覩空中有黑花覩物成二體及內障神水淡綠色淡

白色、及治耳鳴及聾。

靈磁石

二兩、煅醋淬水飛

辰砂

一兩、飛神麴生

三兩

右三味更以神曲一兩水和作餅、煮浮、入前藥煉爲

丸、每服十九丸、加至三十丸、空心米湯下。

石斛夜光丸

治神水寬大漸散、昏如霧露、空中有黑花、覩物成二神水淡綠淡白色者。

各七錢

天門冬

二兩、熟地

各一兩

人參

各二兩

茯苓

各二兩

甘草

炙黃連

防

菊

山藥

枸杞

石斛

杏仁

各七錢

草決明

八錢

麥冬

熟地

生地

各一兩

肉蓯蓉

青葙

子

羚羊角

鎊蒺藜

川芎

甘草

炙黃連

防

風 枳殼 烏犀 銸各五錢 牛膝 七錢五分

右二十四味爲細末，煉蜜丸如桐子大。每服三十五丸，溫酒鹽湯送下。眼科藥不外此諸味。

二百味草花膏

治目赤流淚或痛或痒，畫不能

視，夜惡燈光。血熱則目赤，肝熱則多淚，熱微則夜惡燈光，

痒熱甚則痛，赤腫昏眊，故畫不能視，陽勝故夜惡燈光。

羯羊膽 蜂蜜 一入蜜膽中蒸熟，候乾細研爲膏。每含少許，或點目中，又法臘月入蜜膽中紙籠套住，懸屋簷下，待霜出，埽取點眼。羊食百草，蜂蜜百花，故名。

張三丰真人治目疾碧雲膏臘月取羯羊膽十
餘枚以蜜裝滿紙籠套住懸屋簷下待霜掛埽
下點之神效卽二百味草花膏另一製法

凡目疾有由於腎臟風者惟四生散最神眼醫多
不知治特採名案三條以證之

薛立齋治一男子眼赤痒痛時或羞明下淚耳內
作痒服諸藥不效氣血日虛飲食日減而痒亦
盛此脾腎風熱上攻也以四生散白附子黃芪
獨活沙苑蒺藜藜酒調四服而愈又一人頭目暈眩皮膚瘙痒

搔破成瘡。以八風散治之。亦愈。

張三錫治一人目赤黑珠傍暗赤成瘡。耳中痒。作腎臟風。用四生散。每作三二服。卽愈。時稱爲聖散。方見前。

沈存中云。予爲河北察訪使。時病目赤四十餘日。黑睛傍黯赤成瘡。晝夜作楚百治不效。郎官邱革相見。問予病目如此。曾耳中痒否。若耳中痒。卽是腎中風。有四生散療腎風。每作二三服。卽瘥。閭里稱爲聖散子。予傳其方合服之。午後一

服臨卧一服目反大痛至二更乃能眠及覺目赤稍散不復痛矣更進三四服遂平安如舊尤在溼曰目赤腫痛人知降火而不知活血所以多不得力只用四物湯內地黃用生芍藥用赤加蒸大黃赤茯苓薄荷葉治之甚妙此戴復菴法也余謂目赤腫痛人知活血而不知治痰脾胃壅滯積熱生痰積痰生熱輒轉相因氣冲頭目昏痛不已者須用半夏石菖蒲黃芩枳實茯苓陳皮微兼菊花白蒺藜之屬治之

慎柔五書有曰。左光祿丞年及四十。兩目俱瘀肉。
滿珠他醫與以祛風散熱之劑。不效。余謂脾胃
肌肉。此脾胃內滯也。以桃仁泥二錢。枳實一錢。
半連翹一錢半。元明粉二分。白芷二分。山楂肉
一錢半。每晚服一帖。至十帖而全愈。余以此方
治數百人。患此者。未嘗不效。第先曾服多苦寒
之劑。已傷脾胃。不思飲食者。禁不可與。如勉服
之。則眼必壞。且致虛損。如患此症。服過寒涼。已
傷中氣。且宜靜養。守之亦得漸退。不可造次。致

于失明。蓋此症醫者罕識。陽明多血多氣之經。
而經云血實決之。此方決之之意也。如患者脾
胃素虛。必欲服之。或間日一帖。或間二三日一
帖可也。急服則損目傷脾矣。邱豫章患瘀鬱。
滿眼。醫以大黃行之。祛風散熱之劑。服之俱不
效。以前方前條所載三四帖而愈。時下眼醫所
恃者惟點藥耳。至用湯煎。則僅知眼門套藥。如木賊蒺藜菊
花決明之類。以上所選諸法。皆足開人神智。啟
人聰明。宜熟玩之。

凡一切虧損之症。如滋陰地黃。益陰腎氣。杞菊六

味加味駐景定志地芝明目各丸皆見眼科書
茲不具贅

按五竅之病惟目最多所以另有專科是書名述
內外數方名案數條以備採取至于全體治法
則當廣求眼科書而探討之風火時眼煎方業
已大備可於書中擇對症之藥酌用可也

