

侶山堂類辯
中卷

亦九主人



癱勞鼓膈為難治之因辨

能醫傷寒即能醫痘疹能醫痘疹即能醫癰毒

辨

乳癰鼠瘻辨

能食而肌肉消瘦辨

奇恒論

利論

中風論

頭痛論

心痛論

腹痛論

消渴論

欬嗽論

砂證論

瘡論 附方

產後論

急濕論

往來寒熱論

傷寒論編次辨

醫學入門

中庸之道

痘論 附五類救逆丹
百祥丸
玄兔丸

胎前論

急下論

汗下論

潮熱論

風傷衛寒傷榮辨

醫以力學為先

雜證論



十干化五行論



癰勞鼓膈為難治之因辯

夫飲入于胃，猶海之行雲氣于天下。穀入于胃，由脾土之轉輸于四旁，是以水穀之津液各走其道。五藏六府皆以受氣，皮肉筋骨咸以資生，故曰清陽發腠理，濁陰走五藏。清陽實四支，濁陰歸六府。是止濁中之濁者，歸于大腸。小腸膀胱而為糞，為溺也。夫勞怯膈脹之證，或久嗽而傷肺，或鬱怒以傷肝，或不得志意而心脾之氣不舒，或過于勞傷而腎藏之精漸絕。

入胃之药食不能输布于五经。惟走肠胃而为穢。故虽久服而毫无效验。即悞服其药。餌亦不效。其有损用参苓之神品。亦不能受其精华。此皆鬱逆之为故。丹以致精神日减。肌肉日消。而渐生无气。头胀满之病。在于肠胃之外。郭郭之中。如脾不运行。则食更不能及。知阴阳升降之理。五行运化之道者。先当理其脾胃。土气化而灌溉四旁。坤德厚而资生万物。津液生而阴火伏。地天泰而否隔消。脾气运行。

則脹滿日減。筋骨濡潤則癱瘓可強。此端本澄源之
大道也。若不知治本。惟以涼潤之藥。歆其降火生津。
潤下飲食。夫脾喜燥而肺惡寒。脾土濕則不能輸運。
肺氣寒則不能通調。以致津液不生。痰涎反甚。陰火
炎而咳嗽頻上下否而隔脹愈劇矣。陰火不可撲滅
生之真精而
后能制之

能醫傷寒即能醫痘疹。能醫痘疹即能醫癰毒。
辯

學士許叔微曰能醫傷寒即能醫痘疹能醫痘疹即
能醫癰毒蓋能醫傷寒者知表裡陰陽寒熱氣血
虛實耳傷寒之邪從外而內痘疹之毒從內而外
若夫癰毒有因於風寒暑濕之外襲者有因於喜怒
飲食之內傷者是以傷寒痘疹癰毒皆當審其表裡
虛實而治之如痘證之表實者當清解其表裡實者
即疎利其裡血熱者涼血氣逆者理氣邪毒盛者急
宜清熱解毒心氣虛者又當兼補其心子氣虛者補



氣血虛者補血。表虛者固表。裡虛者實裡。是以治痘有寒熱溫涼之方。有攻解補瀉之法。蓋瀉者瀉其熱。毒補者補其心虛。昔錢氏痘方多用清涼。謂當清熱解毒。為要。陳氏專用溫補。謂血氣充足。而后能化毒成漿。此皆偏執一見。而不得中正之道者。也。故為不免。醫者當以二氏之方折中。其間審其邪正虛實。而治之。萬無一失矣。至于癰毒之證。与痘證無二。而治法亦同。如陰毒在內。而不起發者。即痘毒之內陷也。根

盤收歛而高聳者即痘之界地兮明而起脹之膿稠者即痘之漿厚也無膿者即痘毒之不化之能食者即痘毒之盡發于外之不能食者毒氣尚壅滯于內也收口者即痘之結痂也臭爛者即痘之壘爛不收之或解或攻或補或浮皆當以治痘之法治之古集瘍醫咸以為痛癢瘡瘍皆属于火惟以寒涼之藥治之或毒反冰伏而不起者或始終用攻利之藥致心氣虛脫而後成不救者噫為兇醫瘍醫者能潛心於

靈素仲景諸書功德無量矣

乳癰鼠瘻辨

一婦人產後乳上發癰腫脹將半月。周身如鍼刺。飲食不進。余診之。六脉沉緊有力。視左乳連胸脇皆腫。予用麻黃葛根荊防杏子甘草石膏。令溫服。取汗。次日復視之。曰。昨服藥後。身有大汗。而周身之痛盡解。乳上之腫脹亦疎。飲食亦進。服藥不啻十有餘劑。毫無效驗。奚此劑有如是之功也。予曰。金匱要畧云。產

後婦人喜中風。生氣通天論曰：開闔不得，寒氣從榮氣不從逆于肉理，乃生癰腫。此係風寒外壅，火熱內閉，榮衛不調，以致腫痛。諸醫止以涼藥治熱，而不
知開闔故也。今毛竅一閉，氣機旋轉，榮衛流行而腫痛解矣。內經云：食氣入胃，散精于肝，此腫屬陽明。厥陰二經是以飲食不進。今經氣疎通，自然能食矣。又一老嫗兩頰浮腫，每邊有核如梅子。大嫗曰：予一姪女因生鼠瘻而死，又一甥女亦患鼠瘻而歿。今心甚

憂之。余診其脉兩寸口皆浮大。其證則頭痛發熱。予
曰：不妨。汝證乃風寒陷于脉中，而為癰。用解肌蘇散
之劑，則愈。与姪女甥女之癰不同。二女子之癰，其本
在藏，其末在脉。原係惡疾，有灸刺之法，載在內經。骨
空篇中，能依法治之，亦不致于死。此緣失于救治者
也。吁！治癰瘍者，可不知內經乎？

能食而肌肉消瘦，辨

胃乃受納之府，脾為轉運之官。故水穀入胃，得脾氣

之轉輸而後能充實于四支資養于肌肉胃為陽脾
為陰脾與胃以膜相連陰陽相交如能食而瘦者陽
與陰絕也夫陽明不從標本從太陰中見之化陽明
乃燥熱之府不得太陰之濕化則悍熱之氣更盛脾
不得稟水穀之氣則太陰之氣愈虛是以胃中熱則
消穀善飢脾氣虛則肌肉日瘦盛者愈盛而虛者愈
虛漸至五五有餘而二不足則死不治矣夫人參甘
半夏橘皮生薑之類乃助胃之品也白朮蒼朮山
藥

黃芪厚朴茯苓乾薑大棗之類。乃助脾之品也。枳實
黃連大黃石膏麻仁芍藥之類。乃抑胃之藥也。經言
強者抑之。弱者扶之。不知藥性之妙。主不分強弱之
資。抑是以強者仍強。而弱者仍弱矣。陽明篇曰。胃氣
生熱。其陽則絕。又曰。浮則胃氣強。其脾為約。麻仁丸
主之。此陽與陰絕。而用抑強之法也。
張開之曰。此外因之。新病故止。用抑強之法。如病久
而肌肉消瘦者。當以助脾之藥為君。宣胃之藥為臣。

使胃氣與脾氣相通。活胃之藥為佐。斯為心治之法。

奇恒論

夫病之生於內傷外感。人亦共知。而奇恒之病。知之者鮮矣。沙謂奇恒者。異於恒常也。乃陰陽偏勝五行逆傳。審證辨脈。大有徑庭。內經之論疾病者。不及二十餘篇。論奇恒之章。有八。學者當用心參究。庶免五過之責。

利論

古文作利
今文作痢

夫利有三因：于外感風寒暑濕而為下利膿血者
有死有生有氣有血宜補宜潔宜寒宜熱具在傷寒
論金匱要畧及千金諸方各宜隨證而分別治之又
有陽中霧露之氣陰中渾濁之邪血凝自下壯如豚
肝陰陽俱取脾氣孤弱五液注下，焦不澀清便下
重令便數難臍築湫痛令將難全詳論辨脉篇中此
外因之下利也有因食飲不節起居不時陰受之而
入五藏則填滿閉塞下為飧泄久為腸澼此內因之