

治法彙

盱江 張三錫 纂

金壇 王肯堂 校

氣一

張三錫曰、作脹膈懣痞塞、上下刺痛、皆濁氣爲患、然一元之清氣、原中和、一或偏傷、氣病立見、隨其所應、以法治之、中病卽止、如伐強暴、稍平卽行安撫、庶黎庶遂生、不傷元氣、善乎古語曰、青皮破滯氣、多服損真氣、枳殼瀉滯氣、過用

損至高之氣、香附散鬱氣、須製過、木香調諸  
經氣、兼瀉肺、橘紅專瀉、陳皮兼補、厚朴  
平胃氣、前胡下氣推陳、沉香升降諸氣、  
烏藥紫蘇川芎、俱能散氣使濁氣從汗散、檳  
榔大腹、能使濁氣下墜、後重有積宜之、蘿菔  
子杏仁、下氣潤燥、氣滯有火、宿滯不下、妙品  
豆蔻沉香丁香檀香麝香俱辛熱能散鬱氣  
暴鬱者宜用、稍久成火、忌之、須炒山梔從治、  
以上皆疎通一切有餘之氣、要藥兼痰火兼積

滯兼經血有餘不足各隨加減

又曰調氣用木香木香性溫氣上升如氣鬱而  
不達固宜用之如陰火衝上阻塞有如氣滯而  
吊之則反助火邪必用黃柏知母少佐木香陰  
虛氣滯四物加玄參黃柏知母稟壯氣實氣  
不順而刺痛當用枳殼烏藥不已加木香若  
肥白人氣刺痛古方用參朮枳殼木香愚意爲  
先用二陳平胃枳殼果氣弱不應脈微弱者卽  
當用之肥人氣滯必有痰以二陳二朮香附



川芎、燥以開之。瘦人氣滯，必有火且燥，宜降以潤之。蘇子、萊菔子、梔子、歸芍之類，婦女性執多偏屬陰，氣易於動，如痞悶、脹痛、上奏心胃，或攻築脇肋、腹中結塊、月水不調，或眩暈嘔吐，往來寒熱，一切氣候正氣、天香散，或四七湯，酌用之。如氣不升降、痰涎壅塞，蘇子降氣湯佳。古方木香流氣飲，治清濁不分、膨脹浮腫，二便不利，藥雖二十四味，無非破氣分利，似難執方，因時制宜可也。



氣本屬陽，內榮臟腑，外克皮毛，生生不息。如五志過極，七情交攻，垂矣失常，清者遽變而爲濁，行者抑遏而反常，表失衛護而不和，內失健悍而少降，隨其所感，疾候應之，爲治者須審虛實新久，起初稍加辛散，後必從治，所謂氣有餘便成火者，以性屬陽故也。

氣不歸元，破故紙爲主，白朮亦可以其能和胃，胃和則氣歸元。

氣不升降，香附炒半斤，橘紅六兩，甘草一兩，爲

肉桂 各一錢 甘草 五分

右薑三片煎服

流氣飲子 治男婦五臟三焦氣壅心腎痞悶  
咽塞不通腹脇膨脹嘔吐不食及上氣喘  
急喘嗽痰盛面目四肢浮腫二便秘塞及  
治憂思太過陰陽之氣鬱結不散壅滯成  
疾又治腳氣腫痛上喘作脹大便不通及  
氣攻肩背胃脇走注疼痛

蘇葉 青皮 當歸 芍藥 烏藥

茯苓

桔梗

半夏

川芎

黃芪

枳實

各七分

防風

甘草

陳皮

木香

連皮大腹子

各五分

右薑三片棗一枚水煎服

橘皮一物湯

治諸氣攻刺及感風寒暑濕初

症通用凡酒食所傷中脘痞塞防悶嘔吐

吞酸

橘皮

洗淨

右用新汲水煎服



解五臟結氣益少陰經血用梔子炒令黑爲末  
以薑汁入湯同煎飲其効如神氣有餘便  
是火此方得之矣

治實熱在內有如氣滯

知母 黃連 黃栢 黃芩 枳殼各一分

右水煎服

鹽煎散 治一切冷氣攻冲膏腹刺痛不已及

脾胃虛冷嘔吐瀉泄

砂仁 甘草炙 茯苓 草果 肉荳蔻

川芎

茴香

炒

澄茄

麥蘖

檳榔

良薑

枳殼

厚朴

炒

陳皮

羌活

蒼朮

各等分

右入鹽少許煎服

正氣天香散

烏藥

錢半

香附

六錢

陳皮

紫蘇

乾薑

各

右白水煎服

青木香丸

治腎膈噎塞氣滯不行腸中水聲

治法彙一卷  
嘔吐痰逆不思飲食常服寬中利膈

黑牽牛

二十四兩炒香取頭末十二兩

木香

三兩補骨脂炒

萆澄茄

各四兩

檳榔

酸粟米飯蒸累

右末入牽末令勻以清水和爲丸菜豆大每

服三十丸茶湯下氣滯濕痰盛者大効

三因七氣湯 治七氣鬱結五臟之間互相刑

尅陰陽不和揮霍變亂吐利交作

半夏

厚朴

白芍藥

茯苓

各貳錢

桂心

紫蘇

橘紅

人參

各壹錢



右水二鍾薑七片紅棗一枚煎至一鍾不遇時服

丹溪曰凡氣在胃臆而爲痞滿刺痛伏梁等症者二陳加枳桔黃連木香瓜蒌之類在下而爲奔豚七疝等病本方加桃仁山查梔子枳核茴香川棟荔枝之類在兩脇攻築作痛本方加醋製青皮柴胡芍藥膽草之類在中焦而痞滿脹急者本方加木香厚朴檳榔枳殼或用平胃散以平其土氣敦阜惟婦人胎前產後一切氣症

須兼四物一二味。養血爲主。兼疎利。

脉結澁。或沉弦急疾收斂。四肢腹脇腰膝牽引疼痛。不能轉側。皆由七情鬱滯。挫閃傷損。謹察其原。隨症疎導。

分氣紫蘇飲 治脾胃不和。氣逆喘促。

五味子 去核 桑皮 茯苓 甘草 炙

草果 大腹皮 陳皮 桔梗

右薑三片水煎服

紫蘇子湯 治思慮過度。邪傷脾肺。心腹膨脹。

及喘促煩悶腸鳴氣走漉漉有聲二便不利肺脉虛數而澁

橘半 枳朮加人參大腹皮蘇子草果厚

朴木香木通并草

四炒枳殼丸 治氣血凝滯腹內鼓脹

枳殼 四兩去穢切指頭大分四處一分蒼朮一兩同炒黃一分茴香一兩炒一分

分蘿藦子同炒一分乾漆同炒止用枳殼爲末將原炒四味煎汁打糊丸桐子大每

服五十丸白湯下

氣病用氣藥不効者氣之所藏者無以收也蓋



肺主氣、腎藏氣。古方木香、順氣丸用木香、枳殼、  
陳皮、香附、牽牛、大腹皮、蘿藦子、青木香丸用牽  
牛、木香、萆澄茄、檳榔俱有破故紙，皆取其壯腎  
氣以收濁氣，下歸膀胱，使施化而出也。

四磨湯 治七情鬱結、上氣喘急、胃膈脹痛、神

効。

人參 檳榔 沉香 天臺烏藥

右四味各磨濃汁，小半盃，頓溫服。本草云：四  
味磨作湯治胃膈殊効。加木香、枳殼爲六

木香流氣飲

治諸氣痞塞不通胸膈膨脹面

目虛浮四肢腫滿口苦咽乾大小便秘

半夏

二斤

青皮

去白

厚朴

薑製去皮

紫蘇

去梗

香附

去毛炒

甘草

各一斤

陳皮

去白二斤

肉桂

不見火

蓬朮

煨

丁香

不見火

檳榔

麥冬

志

木香

不見火

草菓

各六兩

木通

八兩

藿香

白芷

赤茯苓

去皮

白朮

木瓜

人參

蘆

石菖蒲

大腹皮

製各四兩

薑棗煎每服四錢熱服

養正丹

治上盛下虛氣不升降元陽虧損氣

短身羸及中風涎潮不省人事傷寒陰盛

自汗唇青婦人血海久冷

水銀

黑錫

去滓淨秤與水銀結砂子

硫黃

研

硃砂

研細

各壹

兩

右用黑盞壹隻火上熔黑鉛成汁次下水銀以柳條攪次下硃砂攪令不見星放下少時方入硫黃末急攪成汁和勻如有燄以醋洒之候冷取出研極細煮糯米糊丸棗豆大每服叁拾丸鹽湯棗湯任下



三錫曰氣鬱久則中氣傷不宜尅伐補中益氣  
佐舒鬱川芎香附枳殼之類胎產後同法

三錫曰難經云血主濡之氣主煦之一切氣病  
用氣藥不効少佐芎歸血藥血氣流通而愈乃

屢驗者

二陳湯見痰門  
四物湯見血門

平胃散見脾胃門

血

張三錫曰榮血之行各有常道爲火所迫則錯  
亂沸騰而吐衄唾涎等血症作矣有如火急  
湯沸勢不可遏火去斯止善乎丹溪之論曰口