

傷寒溯源集

一

重編張仲景傷寒論證治發明溯源集卷之一

虞山

錢廣天來甫

著

男格壽平

訂

門人孫

葵玉舒

訂

日本

天野俊英子雲再訂

陰陽發病六經統論

內田俊安周齊參考

病有發熱惡寒者。發於陽也。無熱惡寒者。發於陰也。發於陽者。七日愈。發於陰者。六日愈。以陽數七。陰數六也。

此一節提挈綱領。統論陰陽。當冠於六經之首。自叔和無已。諸家錯簡於太陽脉證之後。致下喻氏以未熟。註無熟。悖於立言之旨矣。蓋仲景以外邪之感受。本難知。發則可辨。因發知受。有陰經陽經之不同。故分發熱無熟。

之各異以定陽奇陰偶之愈期也發於陽者邪入陽經而發也發於陰者邪入陰經而發也卽陰陽應象論所謂陽勝則身熱陰勝則身寒陰陽更勝之變也發熱惡寒者如太陽居身之表營衛之所流行也營衛者卽敷之氣所化也衛行脉外本下焦命門之真陽蒸敷氣而布皮膚司開闔而固毛孔者也營行脉中本上焦太陰之真氣降中焦敷氣之精華以滋養灌溉充貫夫一身者也若風傷衛則衛陽受邪故頭項強痛發熱惡風而汗出也寒傷營則營陰受邪故頭項強痛發熱惡寒無汗體痛嘔逆也營衛雖有淺深其發於太陽則一也若陽明之經已在營衛之內肌肉腠理之中雖無關營衛又必由營衛而入故有一日得之不發熱而惡寒者遠邪氣既入陽明則惡寒自罷身熱汗自出不惡寒而反惡熱矣然汗雖多而尚微發熱惡寒者猶爲外證未汗解也若入裏則發潮熱矣故熱不潮者尙未可與承氣湯也少陽爲軀殼之裏層自此以外由陽明而達太陽故屬陽分而爲表少陽猶是三陽之內面故稱半表自此以內則腸胃臟腑也故爲陰分而爲裏少陽乃腸胃臟腑之匡郭故爲半裏蓋統系隸于表而部位接於裏也邪氣犯之非若太陽居表邪之所客者淺近惡寒卽

能發熱發熱卽能惡寒寒熱每多並作唯少陽一經邪
之所入者深遠其出而達於皮膚營衛不易故其發也
則如瘡而往來寒熱矣夫三陽發熱狀雖不同而發熱
則無不同也至於三陰本無發熱之例四逆惡寒其常
也間有反發熱反不惡寒手足反溫其變也如太陰表
証並無發熱者一則曰太陰中風四肢頑疼陽微陰澀
而長者爲欲愈又曰太陰病脉浮者可發汗宜桂枝湯
又曰傷寒脉浮而緩手足自溫者繫在太陰皆太陰無
熱之表證也至少陰病則曰始得之反發熱矣發熱而
日口中和其背惡寒者當灸之而以附子湯主之又如
之表證故以麻黃附子細辛湯主之少陰證得之二三
日反者因無熱者而又發熱故謂之反也則少陰虛寒
少陰病惡寒身踰而利手足逆冷者少陰病四逆惡寒
而身踰脉不至不煩而躁是皆惡寒而無熱之謂也又如
若下少陰病下利清穀裏寒外熱手足厥逆脉微欲絕身
反不惡寒此又以不惡寒爲反也其外熱面赤亦非發
熱之熱乃陰盛格陽於外也至少陰病下利若利自止
惡寒而踰臥手足溫者可治少陰病脉緊至七八日自
利手足不逆冷反發熱者不死此又以手足溫反發熱

爲反皆發於陰而無熱之謂也。謂之不死者以陰邪漸退陽氣將回溫經復陽之治可施也。若在厥陰發熱者極多惡寒者甚少而實陰陽相半然仍以陽氣爲重故熱者必厥厥者必熱而以厥少熱多爲病之退厥多熱少爲病之進也。至若發熱下利厥躁者非真發熱也乃陰盛陽絕陰陽離隔必死之證也。夫發於陰者本無熱故凡有熱者不曰反發熱則曰反不惡寒反之爲言不當得而得當然而不然也。凡此真寒假熱之證悉標舉於三陰見證之中豈非無熱爲三陰之根據乎其所謂發於陰者舍三陰而何指乎。乃成氏舊註謂陽爲熱陰爲寒以發熱惡寒爲寒傷陽無熱惡寒爲寒傷陰固不足以窺仲景之蕃籬而喻氏仍方氏之舊以下風爲陽衛亦陽故病起於陽寒爲陰營亦陰故病起於陰若論邪氣止在太陽一經其說猶可若以此該貫六經則有大謬不然者矣。況又以無熱惡寒句謂下指寒邪初受未鬱爲熱而言少頃鬱勃於營間則仍發熱矣。若以下未鬱爲熟之少頃卽謂之無熱恐仲景立言未必若是其岐也。若必以風傷衛爲發於陽寒傷營爲發於陰則在三陽經之稱傷寒者皆可謂之發於陰矣然則三陰條中亦有以下中風冠之者又可謂之發於陽乎以理燭之豈其

然乎所謂陽七日陰六日者概言其理所當然而非必
然者也七者陽之復少陽之數也六者陰之極老陰之
數也蓋陽數始於二而終於九陰數起於三而極於六
此天地陰陽之至數也然大極之中分陰分陽而爲兩

一

儀兩儀各分太少而爲四象則陰陽各有太少矣何獨
陽取其少而陰取其老乎蓋陽以少爲用陰以老爲極

陽少則爲生氣陰極則爲陽生故皆爲愈期此陰陽消
長之自然也其所以陽七日者陽動而變故能遊行於

經脈之表七日經盡而邪衰如下素問熱論所謂真不兩
感於寒者七日巨陽病衰頭痛少愈也其所以陰六日

者陰靜而守不若陽經之循行週遍至六日而陰極陽
升如下三陰證中之手足溫熱勝於厥而自愈也其有不

應期而愈者則當察其失治誤治或邪盛或正虛或入
裏或犯臟及過等證又不可以常理拘也夫發熱無熱

辨證之源也發陽發陰知治之本也陽奇陰偶收効之
數也豈非貫始終括六經標全論之宗旨乎余讀仲

景書而見其參同於易也夫全易一奇偶也全論一陰
陽也六子之生於乾坤六經之稟於陰陽也六經之淺
深正變旁行疊見形態百出則卦爻之動變象數之精
滑也聖人以言不盡意而圖理於象使二人卽象以窮理

仲景以二法不盡證、而以二寒熱分陰陽、使二入辨證以盡二法、故首標二易、知之寒熱、易辨之陰陽、然後申其證變、出其方法、而後可以言治也。夫證卽象也、法卽理也、三百九十七法不出六經之中、六經不出乎陰陽之外、能讀仲景書者、其唯深於易者乎。

友人周永年識

傷寒論溯源集太陽經綱領

太陽上中下三篇總脉總證

太陽之爲病，脉浮頭項強痛而惡寒。

一此舉中風傷寒之總脉總證而

言乃太陽三篇之太綱也。太陽者，膀胱寒水之經也。膀胱者，爲稱二寒水乎？夫腎者，天一之水也。上古天真論云：腎者，主水，受五臟六腑之精，而藏之者也。蓋以腎與膀胱一臟，一腑，相爲表裏，而爲中一合也。既爲寒水，曷爲又稱太陽乎？腎爲坎水，一陽居於二陰之間，真陽藏於真陰之內。水中有火，穀入於胃，其清氣化而爲營，行於脉中。穀之濁氣降於下焦，而腎中之真陽蒸騰其氣，行於脉外，直達皮膚，而爲衛氣。故膀胱雖爲腎臟，寒水之脉，而寒水之中，其所以蒸騰發越而爲衛氣者，則又腎中之真陽也。故衛氣之行，一日一夜，五十周於身，晝行於陽二十五周，夜行於陰二十五周，平旦陰氣晝陽氣出於目，目張則氣上於頭，循項下太陽矣。故曰太陽太陽者，盛陽也。陽不盛，不足以密腠理，而衛中風寒，故爲六經之首。皮膚營衛之總統，靈樞營衛生會篇云：太陰主

內太陽主外生氣通天論云陽者衛外而爲固也又曰陽因而上衛外者也皆言太陽之統營衛而爲中最外之第一層也脉浮者脉有浮中沈三候浮者其上候也浮脉行於肉上而主表以風寒初入皮毛營衛邪氣在太陽之表故獨盛於上候而脉浮也足太陽之脉起於目內眞上額交顳從顳絡腦還出別下項連風府循肩膊內挾脊抵腰中夾督脈而行風寒客之故頭項強痛也風寒在表則惡寒皮部論云邪之始入也泝然起毫毛開腠理玉機真藏論云風寒客於人使入毫毛畢直皮膚閉而爲熱當是之時可汗而發是也言惡寒而不言惡風者以下惡寒者未必不惡風惡風者未嘗不惡寒舉二卽可該其義也此條見症爲中風傷寒之所並有故總舉之爲篇首至太陽上篇則由此脉證而申出中風諸證以別風傷衛者如此中篇亦由此脉證而申出傷寒諸證以見寒傷營者如此至下篇則又由此脉證而申出風寒兼有之證以辨風寒兩傷營衛者又如此然後各因其證而立法施治也以後凡稱太陽病者皆具此脉浮頭項強痛而惡寒者方是也

太陽病頭痛至七日已上自愈者以行其經盡故也若

欲再作經者。鍼足陽明使經不傳則愈。(二)

頭痛太陽證
也七日已上

謂七日之內也。經者經脉也。太陽之經卽所謂起於目鏡，眴上額，夾顛絡腦，下項連風府，挾脊抵腰貫臀入腹，過髀出外，踝至小指之端者是也。行其經盡者言邪入太陽之表，遊行於太陽經脉之中，經盡而邪氣衰去，卽內經熟論所謂七日巨陽病衰，頭痛少愈者是也。再作經者，邪氣再傳一經也。謂太陽經盡邪氣未衰，欲再傳足陽明其勢正矣也。當下候其邪氣已傳，卽鍼足陽明之經穴以泄其邪，使經邪不傳，則愈矣。此經所謂迎而奪之，以瀉其盛，離合真邪論又云卒然逢之，早遏其路之義也。然不於太陽刺之，而獨鍼陽明者，何歟？蓋胃爲水穀之海，多氣多血，素問熟論云，陽明者十二經絡之長，其血氣盛，靈樞終始篇所謂陽明主胃，大富於穀氣，故可二日取之。他經則或日一取之，或二日一取之，蓋取其可瀉之經而刺之也。前註以爲陽明中土萬物所歸，無所復傳非也。此乃仲景論陽明入裏之邪，胃實可下之證，故曰無所復傳，然非所論於在經之邪也。若邪未入胃，則經經可傳，何獨陽明唯邪入陽明可刺之經而刺之，乃可遏其傳路耳。觀行其經盡，欲再作經使經

不傳之三經字則在
經在裏判然分明矣

卷

太陽病欲解時從巳至未上

(三)

經云邪之所湊其氣必

虛邪既入太陽之經雖

或氣衰欲解然經氣已虛無以自振必待經氣旺時方能決去其邪夫太陽者盛陽也旺於巳午巳爲純陽乾卦主之午雖一陰初生然陽氣旺極之時也生氣通天論云日中而陽氣隆日西而陽氣已虛故曰從巳至未

上

欲自解者必當先煩乃有汗而解何以知之脉浮故知

汗出解也

煩之爲病不一下有表裏陰陽虛實之不同此則表邪怫鬱將解未解之時不得發起而煩

也天地之氣鬱則陽蒸陰而爲雨人身之氣鬱則陽蒸陰而爲汗陽氣鼓動陰液外泄邪氣隨之而出矣脉爲氣血之先邪氣在表則浮若鬱蒸煩悶則氣欲外泄故脉先浮脉浮是以知其必汗出而解也

(四)

巳

太陽上篇

中風證治第一

中風主治

太陽病發熱汗出惡風脉緩者名爲中風

一前總證中所有之脉

浮頭項強痛而惡寒乃太陽經中風傷寒所均有一之脉症而猶未分其所所以爲中風爲傷寒也故此篇卽於上條之脉浮頭項強痛之總證而增入發熱汗出惡風脉緩以別其爲中風者如此也中風風傷衛也風者春令陽氣上騰呼吸而爲風所以發生萬物者也其太過不及之氣乃爲淫慝之邪感之則爲中風矣然非獨春令爲然也四時皆有之唯春時爲當令耳發熱者風邪客於衛而鬱蒸也汗出惡風者風邪襲於毛孔衛氣本能司其開闔之常玄府不閉故汗自出腠理踈而不克任受風寒故惡風也風寒雖可互言此篇則仍重於風也緩者緊之對稱非遲脈之謂也風爲陽邪非勁急之性故其脉緩也此一條爲太陽中風之綱領以下凡言下中

風發熱汗出脈緩之太陽病用桂枝湯者皆同此
脉證上也以風傷衛爲第一層故列爲太陽上篇也

太陽中風陽浮陰弱陽浮者熱自發陰弱者汗自出

畜惡寒浙浙惡風翕翕發熱鼻鳴乾嘔者桂枝湯主之

(二) 阳浮阴弱者卽所以釋前總症中脉浮之義也。熱自發汗自出卽所以申上文發熟汗出也。脉法以浮候屬陽沈候屬陰謂之阳浮者衛行脉外陽邪中之則脉盛於外故陽脉浮也陰弱者營行脉中營未受邪則覺脈弱於內故陰脉弱也若總言之浮候實則沈候虛唯其沈候虛乃見其爲浮脉也蓋以陽受邪而實陽實則陰虛也熱自發汗自出之兩自字皆易詞也言地風爲陽邪衛爲陽氣二陽兼併邪不容主客相爭氣鬱而熱自發非若寒邪之客於腠理至陽氣不得發泄必待鬱甚而始發熱上也衛爲表之表營爲表之裏衛統皮毛風邪中之則毛孔不閉營中陰液內爲熱邪所蒸外無衛氣固密故汗易出又非若寒邪入腠理玄府緊閉陽氣不得外泄而無汗也夫衛陽不能外固則營陰不能自持如人婦之無夫失其蔽護無以自立唇亡則齒寒故

陽浮熱自發則陰弱汗自出也蓋衛主皮毛猶門戶之司開闔也風邪客衛如有物之梗礙於門中而不得闔也不得闔則入者一任其入出者一任其出矣任其入故惡風寒也任其出則汗自出矣嗚嗚猶言颯颯如風寒之侵逼也淅淅猶言淅瀝若風聲之微動也嗚嗚惡寒營陰弱於內也淅淅惡風衛陽疎於外也中風而亦惡寒者衛傷而營弱也陽強陰弱營衛不得和諧故風寒皆惡也翕翕熱從外發覺熱氣烘灼於皮膚之間也肺主皮毛開竅於鼻風在皮毛內通於肺故氣塞熱壅鼻息嘶鳴也乾嘔惡心也胸屬太陽風邪在衛邪氣犯膈而嘔也凡皆風邪傷衛之證當解肌發汗宜桂枝湯主之主者主其治也凡見已上脉證皆當以桂枝湯主其治節有變證亦以此方爲主而損益之如下文桂枝加桂及桂枝加附子湯桂枝去芍藥加附子湯之類是也

桂枝湯方

桂枝

三

仲景云桂枝者取枝上皮也後人不知藥性氣味而曰去

皮誤矣不知桂味皆在皮若曰去皮則木心有何氣味平肉桂亦大樹身皮耳豈亦舍其皮而用其木心耶然

必以下氣味甜辣者方有辛溫發散之功無氣味者非真桂也不可入藥

芍藥

三兩

甘草

二兩

生姜切三兩

大棗十二枚擘

成本作後服當
火促而無役字

右五味㕮咀以水七升微火煮取三升去滓適寒溫服一升服已須臾數熱稀粥一升餘以助藥力溫覆令二時許遍身蟄蟄微似有汗者益佳不可令如水流漓病必不除若一服汗出病差停後服不必盡劑若不汗更服依前法又不汗後服小促役其間半日許令三服盡若病重者一日一夜服周時觀之服一劑盡病證猶在者更作服若汗不出者乃服至二三劑禁生冷粘滑肉麪五辛酒酪臭惡等物桂陽木也生長於東南蓋得東南震巽發生之全氣者故能補

桂枝

助命門生發中州益下焦氣化之功宣通百脉而爲氣血之要藥其枝則得陽氣而暢茂條達者也夫木性之陽春生發爲天地發散其三冬伏藏之鬱結者也况桂爲純陽之木氣味皆厚且又其生發新長之枝乎故能達衛陽之分而散解其鬱滯之風邪是以辛溫發散之陽以解陽分之陽邪也陰陽應象論所謂辛甘發散爲陽也東垣謂桂枝湯爲陰經要藥而能閉衛氣使陰氣不泄方有執謂桂枝固衛而善走陰均失之矣臣之以芍藥者收陰氣而斂津液所以救營陰之弱而滲泄也佐之以甘草者甘以緩之佐桂枝則甘溫能除大熱也使之以姜棗者姜以助其辛散而止嘔棗以和其中氣而調停之也將佐皆得其人操縱各適其用則衛不覺其強而營不患其弱邪解氣平而自和諧矣適寒溫者恐太熱則不能驟進若徐飲則其勢已分太寒則熱氣衰而無內以鼓動其陽氣也歎熱稀粥以助藥力者桂枝不過解肌原非發汗之猛劑恐其力綿故以熱稀粥爲後勁所以助其溫散之功也內經云汗出皆生於穀故以穀充其氣也熱身熱汗欲出貌氣蒸膚潤之情狀也微似有汗言汗微而似有似有而實微也衛在皮毛邪氣浮淺使肌膚暫開僅令衛分之風邪消散而不使

過多，有傷營分之弱陰也。若強逼大過，使汗出如水流濟，是發盡營中之汗，衛邪仍不能解，適足以愈弱其陰。故曰：「病必不除也。」小促役者，方土之語。楊雄、郭璞所謂方言也。謂暫停半日許，如可，令人催促之頃上也。又小促役宋板作小從容，禁臭惡等物者，使清穀入胃，則清濁之升降得宜。營衛之流行無滯，庶漸得安和而無反復之虞也。

太陽病頭痛發熱汗出惡風者，桂枝湯主之。

(三)

頭痛雖見之於

太陽總證而未見於中風之首條，首條雖具脈證，以正中風之名，而尚未顯言其治法。此條雖有證無脉，而前後互見，并詳明其治法矣。其脉症治法於三處互見，仲景立言或詳或畧，忽現忽隱，正神龍見首不見尾，見尾不見首之妙，開後學辨證施治之法門，其爲天下後世慮也深矣。

太陽病外證未解，脉浮弱者，當以汗解，宜桂枝湯。

(四)

脉浮

弱，卽前陽浮陰弱之義也。外證卽前發熱汗出頭項強痛惡寒等證也。言凡見外證未解而脉浮弱者，無論爲