

濟陰綱目

卷十三

卷十四

十三

虛煩

發渴

自汗

發熱

往來

瘧疾

蓐勞

虛羸

痞悶

脹脹

浮腫

積聚

霍亂

嘔吐

吃嘔

咳嗽

喘急

鼻衄

泄瀉

痢疾

大便秘澀

小便不通

遺尿

淋閉

小便數

小便不禁

小便出血

大便出血

產門不

腫痛

乳汁不行

乳汁自出

吹乳癰腫

乳妬

乳懸

乳巖

保嬰經驗方

濟陰綱目卷之十三

關中 武之望叔卿父輯著 白嶽 趙文陸子垣氏訂正

西陵 汪 淇 儋 綺子箋釋 天都 查 望子周文叅閱

產後下

虛煩

凡產後血虛氣無所附則逆而為火火上逆而痰而

太速兼食不相宜之物所致但能依方療之無不痊可

逆之則心煩矣童便降官

薛氏曰四物湯加茯神遠志治產後虛煩十全大補湯尤効論見

也其味苦醜

發熱條

寒其性就下

陳氏曰尋常治諸虛煩熱者以竹葉石膏湯溫膽湯殊不知產後

宜服之所謂

與尋常不同如石膏等藥不宜輕用用必死

也

蒲黃生用性

涼逐瘀桂心

去皮性熱行

血烏梅酸收

滌汚用此方

不可忘此法

前方以熱行

血此方以涼

行血集方皆

涇渭自分用

方者毋得朱

紫不辯

此方看氣行

血不熱不寒

較前方是一

天霽色令人

心曠神怡

金黃散

治產後惡血衝心時發煩躁

玄胡索

蒲黃

各半兩

桂心

二錢半

右爲細末烏梅煎湯調下二錢

荷葉散

療產後七日內宿血不散時時衝心迷悶

荷葉

一兩七錢半

延胡索

二兩

地黄汁

合

右用水二升煮二味取六合下延胡索分三服空心服忌肉食

一日

川芎散

療產後餘血不盡奔上衝心煩悶腹痛

川芎

生乾地黄

白芍

枳殼

各等分

右爲末酒調方寸七日二服

集驗方

產後血氣煩悶

此方清熱簡切

以上四方看

一方有一方

妙用細玩之

真如山陰道

上行令人不

忍捨去

讀治症語便

知用藥宜溫

所謂寒者熱

之留者行之

也

以煩躁二字

生地黃汁

清酒各一升

右二味相和煎一沸分為兩服

經効方

療產後氣虛冷搏於血血氣結滯上衝心腹脹滿

當歸

川芎

桂心

吳茱萸

陳皮

生薑各一兩

白芍二兩

右咬咀以水三升煮取一升去滓空心服

沒藥丸

治產後心胸煩躁惡血不快

沒藥

蠶薑

延胡索

當歸

乾漆炒

桂心

牛膝

牡丹皮

乾薑各等分

右為細末醋煮麴糊丸如桐子大煎麴湯下十丸至十五丸

治血氣煩悶雜方

此溫行破血之藥必不可

醫書附

卷二 虛煩

二

少者也又烏
論其煩而不
用熟藥哉

連瀉數方各
呈如相如化
工天巧有難
描盡
此數方又有
吹粒濃抹之
致

藕汁竹瀝雖俱
治煩然清火則
回而破血稍痰
則異宜則之如
陳白梅薄吳
笑散人皆能之
而羊血之用誠
有奪天之力殆
方者集心者

生藕汁飲二升効竹瀝亦得

一方陳白梅搥碎煎湯飲

一方用蒲黃隔紙炒每服一錢東流水煎湯下

用矢笑散亦佳

一方療產後餘血攻心或下血不止心悶面青冷氣欲絕用羊血
一盞頓服若不定更服立効

○已上治餘血奔心之劑

人參當歸湯 治產後去血過多血虛則陰虛陰虛生內渴以致
心煩短氣自汗頭痛

人參 當歸

熟地黃

門冬 肉桂

各二錢

白芍藥 炒二錢

錢半

種德無涯矣

此方以四物去川芎並散氣

也用肉桂助其

止汗也但與家

葉等分亦須暫

酌而以粳米竹

葉加之治心煩

短氣之良法矣

血熱加生地尤

佳如肉桂所當

去也

以方以小麥補

堂麥門竹葉除

性甘草大棗益

氣安其子併培

其母亦良法也

生姜佐之更有

言裏之方而曰

右用本二鍾粳米一合竹葉十片煎至一鍾食遠服○血熱甚者加生地黃二錢

竹葉湯

治產後短氣欲絕心口煩悶

竹葉切

麥門冬去心

小麥各

甘草兩

生薑二兩

大棗十二枚

右切以水一斗煮竹葉小麥至八升去渣納餘藥煮取三升去

渣溫服○虛悸加人參二兩○少氣力加糯米五合

甘竹茹湯

治產後內虛煩熱短氣

甘竹茹一人參

麥門冬去心茯苓

甘草各一黃芩三兩

右咬咀以水六升煮取二升去渣分三服日三

薤白湯

治產後胸中煩熱逆氣

虛悸加參多
益善糯米用之

爲少力之助又

養陰也

此治虛煩燥氣

神方雖品味數

少而藥力靈專

可法可法

如黃芩又可去

取者也

此治胸膈逆之

變也原方出自

仲景雜白半夏

所以治逆氣痞

麥根麥門所以

治煩熱久參甘

草補虛知母石

膏是加非熱甚

不用益爲虛虛

薤白

半夏

人參

甘草

各一括薤根二

麥門冬

半斤

熱甚加知母石膏

右咬咀以水一斗三升煮取四升去滓分五服日三夜二

芍藥梔鼓湯

治產後虛煩不得眠

白芍

當歸

梔子

香豉

半合

右用水二鍾半先煮前三味得二鍾內香豉煮取一鍾半去滓

分二服溫服

此雖雲岐法不若仲景酸棗湯穩當

○以上治血氣虛煩之劑

仲景二物黃芩湯

婦人在草褥自發露得風四肢苦煩熱頭痛

者與小柴胡湯頭不痛但煩者此湯主之

黃芩二兩

苦參二兩

乾地黄四兩

仲景遺集虛
煩不眠有枝子
鼓湯而此如白
芎藭歸者乃雲
岐黃傷寒法以
治產後也人常
謂傷寒方可通
於雜症有是哉

要在風字上看
以頭痛不痛為
法

此大苦寒之劑

與產後甚宜意
者熱病成煩躁

要以但煩字

上貼

中虛症不可用

石膏煩亂症不

可用桂枝而此

右三味以水八升煮取二升溫服一升多吐下蟲

竹皮大丸 治婦人產後中虛煩亂嘔逆安中益氣

生竹茹

石膏

各二

桂枝

白薇

各一

甘草

右五味為末棗肉和丸如彈子大以飲服一丸日三夜服○
有熱倍白薇○煩躁加栝實一分

○已上治中風煩熱之劑

經驗方

治產後煩躁此重可去怯之義

禹餘糧一枚狀如酸飴者入地埋一半四面緊築用炭一秤
發頂火一斤煨去火三分耗二為度用濕土罨一宿方取出
打去外面一層只用裏內■研水淘澄五七度將紙襯乾再
研數千遍用甘草湯調二錢七只服立効

方以甘草七分

配聚藥六分又

以重而爲丸仍

以二九飲下可

想見其方之

微用藥之確審

慮虛之不易也

仍飲服者尤慮

去虛虛之禍耳

用是方者亦當

深省

若謂去血過多

而用重便以治

虛火是以而以

四物治虛則川

芎之物能不升

散乎以胃氣虛

而渴用白朮宜

矣而以血虛用

○發渴

熊氏曰產後心煩發渴宜清心蓮子飲

薛氏曰前證若出血過多虛火上炎用童子小便或四物白朮麥

門丹皮若胃氣虛而有熱用竹葉歸耆湯若血虛發熱用八珍加

麥門五味若血脫發熱煩躁用當歸補血湯若胃氣虛弱用補中

益氣湯或七味白朮散

一產婦患前證朝寒暮熱肚腹作痛以手按之不痛余以爲血氣

俱虛用八珍之類治之彼反行逐血更加發熱煩躁余用當歸補

血湯熱躁漸止用八珍麥門五味氣血漸復

李氏曰產後煩渴氣虛者生脉散血虛者四物湯加天花粉麥門

冬氣血俱虛作渴頭眩脚弱飲食無味者用人參二錢麥門冬一

必血虛氣弱
者乃可資證明

藥幸毋挑一

此方分兩有注

諸者不可輕放

過

直入以天地之

心為心故其方

亦以重行兩施

之道渴教此方

以治渴補虛之

藥十分為君而

又以淡滲燥血

生渴之藥十之

一分為使佐此

何為也蓋以疾

苓能降天之陰

氣生夏發地之

陽氣脾者土也

天氣過於地地

錢半熟地黃七分天花粉三錢甘草五分糯米薑棗煎服

于金竹葉湯

療產後虛渴少氣力

竹葉升三

人參

茯苓

甘草

各一兩

小麥

合五

麥門冬

兩五

半夏

生薑

各三兩

大棗

十五枚

右咬咀以水九升先煮竹葉小麥薑棗取七升去滓入餘藥再

煎取二升每服五合日三夜一

竹葉歸薈湯

治胃氣虛熱口乾作渴惡冷飲食者

竹葉

一錢半

黃薈

錢一

人參

白朮

當歸

各一錢

麥門冬

去心七分

甘草

炙五分

右剉水煎服

熟地黃湯

治產後虛渴不止少氣脚弱眼眩飲食無味

晉書綱目

卷十三發渴

五

承天氣而施生
故佐養重發旺
氣以通滯滯而
生津經曰氣和
而生津液相成
神乃自生此大
意也真入素有
一体同仁之致
豈不知生夏寒
冬之過而反用
之歟後之妄者
效之去之各存
乎其公焉
少用地黃參用
人參便是妙法
○糯米養陰○
自治中氣虛弱
以致津液短少
者宜之蓋為胃
氣不能致津液

熟地黃

酒洗一錢半

人參

麥門冬

去心各二錢

括蕓根

四錢

甘草

炙五分

右咬咀作一服加糯米一撮生薑三片棗二枚水煎服

七味白朮散

治中氣虛弱津液短少口乾作渴或因吐瀉所致

人參

白朮

炒 白茯苓

甘草

炙 藿香

木香

乾葛

各一錢

右剉一服水煎服

清心蓮子飲

治產後心煩發渴

麥門冬

去心

黃芩

地骨皮

車前子

甘草

炙各一錢半

人參

黃耆

炙

白茯苓

石蓮肉

各七分半

一方加遠志石菖蒲

各一錢

手腫也葛木
香露香皆發脾

氣而木香於小
兒更宜於產後

真量用

方名清心理宜

保肺以生水導

赤以瀉火也該

諸藥性能知其

理

用遠志石菖蒲

以治煩熱有未

當處

大渴妙藥亦有

補土生金之理

血渴者血虛而

渴也茲加生地

此三方不惟產

後宜服與消渴

後宜服與消渴

後宜服與消渴

右另用麥門冬二十粒水二鍾煎一盞水中沉冷空心溫服○

發熱加柴胡薄荷

產寶方

療產後大渴不止

蘆根

切一升

麥門冬

生四兩

瓜蒌根

人參

茯苓

甘草

各三兩

大棗

二十枚

右以水九升煮取三升分三服頓服四劑即瘥忌葷菜

括蕞根湯

療產後血渴

括蕞根

四兩

麥門冬

去心

人參

各三兩

生乾地黄

甘草

各二兩

土瓜根

五兩

大棗

二十枚

右以水八升煮取二升半分三服

黃芩散

治產後血渴飲水不止

証亦相宜

原東垣治脫

血方也移之

以治產後煩

渴非有見者

不能

以下三方一

清心一涼血

一生血如一

山一水一琴

一產各得其

趣

黃芩

麥門冬

各等分

右咬咀每服三錢水一盞煎八分溫服無時

當歸補血湯

治產後血脫煩躁引飲晝夜不息脉洪大而虛重

按全無者

當歸

二錢

黃耆

炙一兩

右剉作一服水煎服

一方

療血渴及產後渴

用蓮子心取爲細末米飲調下二錢効

一方

治產後出血太多虛煩發渴

用真正蒲黃末二錢白湯調下如渴燥甚并花水下

一方

治產後中風煩渴

用紅花子五合微炒研碎以水煎濃徐徐呷之

桃花散

治產後不煩而渴

新石灰

一兩

黃丹

五錢

右為細末渴時用井水調下一錢

○自汗

丹出於絡內
金其水且以飢
堅淨火故能止
渴而自汗最盛
燥烈之物何以
用之而況以產
後乎曰不煩而
渴時用井水調
下一錢須當男
其故也

夫汗者陽之氣

陰氣不復則陽

氣所歸以入於

陰故汗陽上汗

於外而為汗耳

甚常為汗多成

症而失言因而

遇風發汗之理

大全云產後虛汗不止者由陰氣虛而陽氣加之裏虛表實陽氣獨發於外故汗出也血為陰產則傷血是為陰氣虛也氣為陽其氣實者陽加於陰故令汗出而陰氣虛弱不復者則汗出不止也凡產後血氣皆虛故多汗因之遇風則變成瘧縱不成瘧亦虛之短氣身體柴瘦唇口乾燥久則經水斷絕由津液竭故也

薛氏曰按前証屬血氣俱虛急用十全大補湯如不應用參附著

不成瘰而短
氣未瘳者此步
熱也自之有之

亡陽發達用十
全大補參附義

附之類心審其
所以而用母法

汗以為是也
而額汗當分前

位以近于汗睡
症在且詳悉蓋

腎收入心為汗
於理猶究

其始也如存為
在少其維也宜

太劑湯煎服
代茶炒黑之

理可法

附等湯若汗多亡陽發瘰尤當用前藥王海藏先生云頭汗出至
頸而還額上偏多蓋額為六陽之所會也由虛熱熏蒸而出竅謂
前證當以部位分之額左屬肝額右屬肺鼻屬脾頤屬腎額屬心
治者審之

一產婦略聞音響其汗如雨而昏貴諸藥到口即嘔余以為脾氣
虛敗用參附末為細丸時含三五粒隨液嚥下乃漸加至錢許却
服參附湯而痊

一產婦盜汗不止遂致廢寢神思疲甚口乾引飲余謂血虛有熱
用當歸補血湯以代茶又以當歸六黃湯內黃芩連檳炒黑倍加
人參五味子二劑而愈

大全云凡產後忽聞汗出不識人治用鷄子及竹瀝
二法見前血暈

前論汗出因風痿痺之說居優不然即謂之脫陽矣此大補法所當施也

黃耆得防風其功即大為易手

國表也而黃耆

二錢防風五分

大約足矣壯蠶

腎家藥也腎

痠人心為汗故

止汗又宜固腎

其他可意解矣

麻黃氣悍而輕

陽藥也用其根

用其陽中之陰

薛氏曰前證屬大虛宜固元氣為王其汗不止必變柔瘥東垣先生云婦人分娩及半產漏下昏冒目瞑蓋因血暴亡而火上熾他補其血則神自昌若常時血下當補而升舉其氣陽得血而神安則自明矣今立一方以補手足厥陰之血兼益陽氣各曰全生活

血湯

黃耆湯

治產後虛汗不止

黃耆二錢

白朮

防風

熟地黃

牡蠣煨為粉

白茯苓

麥門冬去心

甘草炙各五分

右切作三服加大棗一枚水煎服

麻黃根散

治產後虛汗不止

當歸

黃耆炒

麻黃根

牡蠣粉

耳非從陽引陰
歸根之意乎要

知用藥自有至
理

小麥生于陽至
成于陰至內陽

而外陰也本用
其藥亦用其陽

中陰耳且汗為
心液而小麥然

心用其楚煎液
心也又腎之液

八心為汗而諸
水畜也調以肉

汗能不又歸之
腎乎服無時者

以此藥方緩功
通宜服多服

耳
麻黃根湯

人參

甘藷炙各等分

右剉每服四錢水煎服

止汗散 治產後盜汗不止一應汗多者皆可服

牡蠣煅成粉

小麥炒令黃色碾成粉各等分

右和勻煮生豬肉汁調下二錢無時

當歸二黃湯 治產後自汗盜汗胃氣虛弱服別藥則嘔吐不能入

當歸

黃耆各一兩

麻黃根半兩

右咬咀每服三錢水煎服一方無麻黃根用白芍藥

當歸六黃湯

治血氣虛熱盜汗不止

當歸

黃耆炒

熟地黃各二錢

生地黃

黃蘗炒黑

黃芩炒黑

黃連炒黑各一錢