

午 15
7

治痧全編

發行處上海各書坊

祇取工本
實洋五分



發行處上海各書坊

治痧全編

祇取工本

實洋五分



光緒丁未上海
時中書局代印



原序

嘗考痧疫一症。起于明季。癸未秋。燕京大作。甚者且已發午斃。當時名之謂已午痧。越昭代康熙癸未。流徧寰宇。乾隆壬午癸未。雲貴疫起。恩州張道人。製透關散以治之。活人無算。自是而後。或東或西。時衰時盛。今則且熾於江浙八閩間。輕則少延時日。重則命懸須臾。嶺南瘴氣。無是酷也。余憫之。思所以拯救。憾乏術。爰廣搜方書。泛姚江。以折衷于高先生亭午。先生嘉余濟世心。因出是編以示。較余所藏之郭右陶先生所著。徂來朱蓼莊先生參訂痧症要略之原本。得新增者若干篇。余受而讀之。見其分陰分陽。論表論裏。條分縷晰。明如日星。然後知毒在肌表。可刮而愈。毒在血肉。可放而愈。尤甚者。刮放之外。用藥可愈。且知痧多伏脉。亦無定脉。凡脉與症不符者。即爲痧症。直發前賢所未發。誠爲

醫家未有之奇書。偕余釐定。顏曰治痧全書。付之剞劂。以公之世。以觀世之業醫者。偶獲一方。匿為秘傳。惟恐偶洩於人。其用心之公與私。相去詎可以道里計耶。余正欲發藏書以救世。而先生復出是編。而助成之。後之讀者。果以是編出而活人。則謂是即濟世之寶筏也可。

崑

光緒十四年歲次戊子荷月上院日書于波鏡軒之南窗

東海古杏居士謹啓

姚江	慈谿	定海
高亭午先生增編	郭右陶先生所著	朱蓼莊先生叅訂
陳啟懷先生纂輯	陳啟賢先生謹跋	陳道鄰先生校正
葉鐵漁先生同校	李鐵漁先生同校	



後序

竊惟痧症一書。久乏善本。良工不暇爲。庸醫欲著之。而學疏識陋。不能爲。而是書之流傳於今世者。遂尠。以致夏秋之交。有害斯症者。率束手而無施治策。僕心憫之。因於書肆中。編搜方書。卒不得。偶於友人處。獲治痧全編一冊。披而讀之。其治法大備。僕好之。苦寒素。不克壽梨棗。以廣施於人。勉力而印成若干冊。決算其工若料。所費已覺不貲。不能不求量於購是編者。而取資焉。其何能宏濟衆之願。而博施也耶。特海內有同志。能繙印之。以廣傳佈。是僕之志也夫。

紹興餘姚戚梅舫序

正側人圖

如用針在必須真識其穴

方乃用針如不識其穴如

非步批跌有性命之虞

如




凡挑痧症刺手足臂腿灣間中
央須看紫脾長短粗細粗大者
是正脾短細三分長者是也如
挑別處無血宜刺海底穴卽糞
門前三分少許刺入可也刺足
指俱去爪甲三分如韭菜葉少
許血出不可深入至要

凡刺湧泉穴男左
女右不可妄刺



南京中医药大学图书馆藏



百會穴在耳根直上頭頂中心刺入一分不可多入

兩太陽在兩目外眥角各開五分陷中不宜深入


舌下兩穴左玉津 右液在粗長紫腭傍看短紫腭刺之

喉兩傍左迎氣 右口穴在喉節各開一寸切忌深入

凡刺舌下必須細心若刺時其舌不可動一動手不

準其針必亂若刺正腭必有性命之害切忌切忌





兩手指尖十二穴圖

俱去生指
相齊各開
三分角

少商穴

在大指
內側邊

商陽穴

在食指
內側邊

中冲穴

在中指
中央

關冲穴


在無名
指外側
邊

少冲穴


在小指
內側邊

少澤穴

在小指
外側邊



凡刺十指兩足尖俱去爪甲遠去韭菜許約計三分



挑痧毒血十穴

頭頂心百會穴

即耳根直上頂中央

印堂穴

即眉心中中央

兩太陽穴

外目角各開五分

喉兩傍

左人迎右氣口與喉節開一寸

舌下兩傍

下兩邊細紫腭左金津右玉液

兩乳穴

即墨圈上邊又乳下三指



南京中醫藥大學圖書館藏

治痧全編目錄

卷上

表裏治法

分經絡治法

論痧之所由發

痧症治法

用藥之大法

因症分經

治痧三法

痧兼雜症治法

百病變痧治法

刮放不盡之因

用藥不效之故

暴病怪病爲痧

慢痧輕重辨

放痧不出治法

痧病用藥不厭多

痧症下宜早

論數患痧

寒痧辨

痧筋當識

刺痧筋法

刮痧法

用針法

痧筋不同治法

痧脈訣

痧脈外感內傷辨

論伏脉

痧脈决生死法



驗唇舌法

痧症二便宜通

痧症咽喉爲急

不治痧症

卷·下

痧兼傷寒不同治

諸痛類痧辨

諸暈類痧辨

論痧脹

論疫痧腹痛不吐瀉及腹痛吐瀉症

論四季番痧

論痧班

論凝壅結聚治法

痧類雜症辨

痧症不可悞投藥

痧前禁忌

痧後禁忌

治悶痧

治落弓痧

治弔腸痧

治禁口痧

治硃砂痧

治撲蛾痧

治咳嗽痧

治呃逆痧

治盤腸痧

治倒經痧

治紫泡痧



治眼痛痧

治時痧

用藥總論

脩急四方

十二經絡論

治痧瘋

鬼箭痧

湯散丸方

放痧十處

六脈圖

治痧塊

刺毛痧

便用十方

銅人痧穴圖



南京中醫藥大學圖書館藏

治痧全編卷上

表裏治法

人當暑熱之初起也。外感湊於肌表。忽而不治。則漸入於半表半裏。於是胸中作悶。或嘔吐瀉痢不安。所謂痧也。此尙可以刮之而愈。刮之不愈。用荊芥防風湯之類以解之。若復忽而不治。則必漸入於裏。欲吐不能吐。欲瀉不能瀉。而腹痛由是而生焉。其毒升於上。則心悶胸塞。其毒鬱於下。則腸盤筋弔。此尙可以放之而愈。放之不愈。用陳皮厚朴湯之類以清之。若夫入裏而復忽而不治。則氣爲痧阻而不達。血爲痧阻而不行。氣血無權。則刮放無效。甚且立時昏暈。危在旦夕。即脉亦伏而不起。無從診辨。至此惟有用寶花散。礞紅丸之類以降之。令其甦醒。候其氣血流動。再行刮放。遲則不救。此痧分表裏之治法也。

