

痘疹萃精卷三

而反害之



痘疹萃精卷之二

儲巖雷天棟鳴盛輯

痘分順險逆證治

發熱順證

痘瘡發熱三日時熱時退熱勢和緩毒輕也通身微微
有汗表和也飲食二便如常裏和也神氣清爽睡
安寧足徵精神氣血俱屬太和之象故爲順證
治療若醫人心存居功妄施藥餌恐蹈實證
徒無益而反害之

發熱險證

發熱三日見點乃是常候若見點熱不退者毒盛也更兼煩躁口渴頻頻咬牙面色紅赤驚悸多啼身體戰慄乳食甚少不能安眠等證此是毒盛伏鬱難出其爲險證明矣急宜隨證施治庶或從險化順也

發熱逆證

發熱神昏悶亂妄言毒伏於心喘滿喘急毒伏於肺腹疼毒伏於脾腰疼足輿不能起立毒伏於腎不食不眠毒伏於胃驚搐不止毒伏於肝不時乾嘔失血尿

血是毒已內攻也皆爲逆證

發熱證治

痘本火毒自內達外未出必先發熱或因四時不正風寒邪氣或因外觸異物跌撲驚嚇或因內傷食滯抑或內熱積久皆能誘使之發熱也內外既有所因之邪又當以表裏虛實隨證叅詳治之表熱者發熱惡寒而無汗裏熱者發熱有汗小便澀而大便燥形氣不足者發熱微輕形氣有餘者發熱必盛誠能悉心詳察因證施治則汗下清補之法自得其宜矣

一初出發熱當以升麻葛根湯爲主以其能發表邪透痘疹兩得之良方也然必隨證加佐使之品斯爲盡善如身熱無汗者此表實也本方中加紫蘇薄荷荆芥防風如遇冬寒閉塞腠理固密又當量加蜜炒麻黃如大小便秘腹作痛者此裏實也本方中加大黃查肉形氣怯弱者本方中加人參生者內熱熾盛者本方中加犀角黃連荆芥牛子防風小便短澀者本方中加木通滑石車前子心肝有熱發驚搐者本方中加黃連羚羊角鉤藤鉤荆芥防風熱盛煩渴者本

方中加石膏麥冬花粉咳嗽喘急者本方中加前胡
桔梗杏仁蘇葉桑皮傷食腹皮熱者本方中加山查
麥芽枳殼腸胃熱滯而下利者本方中加黃連黃芩
胸膈有痰飲而作嘔者本方中加半夏生薑火在上
焦咽喉痛者本方中加桔梗牛子外襲風寒遍身痠
疼者本方中加羌活獨活冒感風寒頭痛者本方中
加川芎白芷荆芥羌活此治發熱之大畧又貴臨時
參詳融會貫通焉

驚搖發不止則急用升麻葛根湯加荆芥牛子甘草主之或用導赤散
牛黃丸相兼治之不可投涼藥蓋心涼則氣隨散毒無從出也

一發熱初無風寒表邪證毒火太盛痘未見點壯熱不

已血熱凝滯爪甲色紫熱深厥深四肢厥冷同陽證

並見內熱上蒸頭汗如雨火迫津液通身汗出腸胃

熱結大小便秘胃中有熱不時譫語火擾心神煩躁

狂亂以及大渴引飲唇口焦裂舌生芒刺口中失血

小便尿血等證皆毒火肆虐之象甚至腰如杖被毒

攻腎位已上諸候非險則逆急用歸宗湯峻攻毒火

庶可挽回少有逡巡瞻顧後悔無及矣

生軍 荆芥 牛子 木通
生地 赤芍 山查 青皮

一痘欲出而發驚搐者蓋以心火熱盛肺金受尅不能

制伏肝木熱則生風風火相搏神氣不安故發驚搐

一發不止急用升麻葛根湯
芥牛子主之甘草多煎雖生
日瘡者亦用之

紫瀉青導赤湯

羌活 防風 當歸 川芎 炮製

木通 生地 薄荷 鈎藤 生薑 肉

甘草 淡竹葉 燈心

小兒發出痘發熱三日全無影止

忌然發驚搐伏與驚風一樣者

此毒氣壅遏不能宣發所致宜

用清解散以宣

荆芥 防風 蟬蛻 桔梗 川芎 炮製

葛根 升麻 前胡 炮製 黃芩 炮製 赤芍

黃連 炮製 紫草 炮製 連翹 炮製 各等分

山查 炮製 甘草 三上生薑 水煎

煎五下並服

不可遽投涼心之劑苟不審而概以驚藥治之則心

寒而肌斂毒氣內陷痘何由而出也治法當平肝木

利小便為主瀉肝則風散利小便則心熱退風熱既

平痘隨出而搐自定矣以加味瀉青導赤湯主之搐

發不止當用燈火按穴焯之隨服古方抱龍丸或秘

傳抱龍丸方附卷末如毒火盛痘雖漸出其色紫豔兼見煩

渴而驚搐者又當用加味瀉青導赤湯去歸芎羌防

加犀角黃連治之大便秘者微利之若從吐瀉而發

形氣虛怯神倦熱微者急須溫補脾土則肝木自寧

小香大安丸
 香三秋仁桂白木一兩蒸服于
 神曲炒查肉炒川連
 炒連翹志懷皮
 為細末水送為丸煨陳倉米湯
 量兒大小用之

凡發驚搐者隨發隨止為吉倘連發不已此毒伏心
 肝二經宜隨證治之不得概以為吉至痘後驚搐總
 由氣血虛極使然也最為惡候有屬後胃弱飲食不
 化食蒸發搐者必面黃潮熱大便酸臭宜用木香大
 安丸有真氣虛弱火邪內攻而發搐者寧神湯主之
 又有心脾陽氣虛寒則神怯而易為驚搐以六氣煎
 加棗仁辰砂治之

人參 麥冬 生地 梔仁 煨黃連 歸身 炙草 石菖蒲 辰砂 燈心
 人參 炙草 白朮 當歸 肉桂 炙草

葉天士曰週歲小兒初熱即現驚搐昏迷之狀最多世

俗謂驚痘最好此言未必皆然方書云先驚後痘者

溫中益氣湯

人參 生芪 泉 歸身 川芎

茯苓 炙草 白芷 防風 查肉

木香 官桂 姜炭

吉先痘後驚者凶頻頻驚厥最多悶痘勿驟施涼瀉
一發熱雖輕至三四日怠倦嗜臥不思飲食所出之痘
淡白隱隱點粒不明不可認爲毒輕痘少乃氣血虛
弱不能送毒外出宜用溫中益氣湯托之甚者連服
三四劑始得出齊其痘必重若因安靜而不急爲托
出五六月後毒攻難救然則熱輕痘輕之說旣難盡
憑而六日前有言痘未出齊勿用溫補亦未可執也
葉天士曰余治程氏女甫半歲初發身無大熱佈痘極
密吐瀉肢冷形栗色淡前醫僉用荆防勞蟬紅花查

理中湯

白朮 炙甘草 乾姜

參 歸 鹿茸 湯

參 歸 鹿茸 黃芪 湯

異功散

白朮 茯苓 炙甘草 陳皮

肉木通芫荇笋尖之屬方雖立而示以凶危三朝始

延余視余曰毒重氣虛法在不治但身無熱見證虛

寒不因瀉氣表邪焉用表藥考萬密齋始終以脾胃

為主以理中湯加丁桂與服一劑肢煖嘔止再服利

減痘起隨用參歸鹿茸二服以錢氏異功散而愈

一發熱初妄有見聞譫妄恍惚如見鬼狀此毒氣內攻

心神不清所致也宜導赤散加犀角連翹黃芩木通

合琥珀抱龍丸治之大便秘結者牛黃清心丸主之

予每用家製牛黃八寶丹尤佳

方附生地 木通 甘草 犀角
卷末 連翹 黃芩 木通

一寬中透毒飲

葛根 桔梗 前胡 青皮 厚朴

枳殼 查肉 麥芽 蠶殼 連翹

牛子 黃連 荆芥 甘草

加味龍胆瀉肝湯

胆草 生地 歸尾 甘草 澤瀉

黃芩 黃柏 梔子 槐花 木通

抽薪飲

黃芩 黃柏 木通 澤瀉 炒梔

鮮石斛 枳殼 甘草 木賊 蟬蛻

發大黃

一發熱之初便有咳嗽者肺為五臟華

蓋虛癰之火挾君相之火上薰乎肺

肺逆而咳也或至手厥宜用

參蘇飲去人參主之即感風寒

而咳嗽者亦宜此方
蘇葉 桔梗 乾葛 前胡 陳皮
茯苓 枳實 半夏 甘草

一痘出發熱嘔吐煩渴胸膈不寬口中噤腐大便酸臭

者此兼傷食也以寬中透毒飲主之若二便結澀腹

熱悶痛者此兼熱滯也本方中加大黃木通以利之

一發熱時眼胞焮腫流淚多眵目珠赤紅癰澀難開此

毒火上攻也急用黃柏膏從耳前至眼眶連次厚敷

之內服加味龍膽瀉肝湯或抽薪飲加木賊蟬蛻便

秘加大黃以利之如瘡不透出或兼表邪宜用清涼

發散不可概施辛熱之劑至七八朝漿不起灌必須

補助亦宜甘平之藥補養氣血仍當佐使清涼以防

目疾

一保目忌食如蔥韭薤蒜薑菜菔蒿芥等菜並鮮魚活蝦牛羊鷄鵝俱勿入口卽鷄鵝鴨卵皆足妨目亦不可食也

一發熱時葷素油膩魚蝦等物概宜忌食惟清淡發物可與食之至熱退痘出方藉葷食以助胃氣如鮑魚母鷄燕窩之類皆可用也

一發熱證治前載各條已備大要至變幻多端又在醫者隨證詳察耳但前哲云初熱時只有二者惟去邪

扶正而已。邪熱盛則去邪而正氣自旺。正氣衰則扶正而邪熱自退。正氣盛而痘自發。熱爲痘用則不爲害矣。邪氣退而正氣不受燥血脈充足則痘自泰矣。須於此時看明下手拯治。遲則無濟矣。

見點順證

發熱三日。毒已宣發透徹。熱減身和。如期現點。先自頭面。次及週身。漸次而出。顆粒稀疏。根腳鬆動。其形頂尖而體圓。其色紅活而滋潤。言笑自若。飲食如常。不煩不渴。能寤能寐。乃知內無熱壅。五藏安和。皆屬見

點順證

見點險證

痘已見形熱猶不退毒氣未盡透也稠密不疎連絡不分色雖紅而帶黯滯痘卽稀而色却嬌嫩隱於皮膚摸之不甚撞指人事困倦精神短少皆見點險證有痘出雖順而或兼雜病亦作險治

見點逆證

發熱一朝或半朝卽見點者乃毒火太迅不循次第也或一齊湧出者乃毒火太重不受領載也或一見色

黯焦紫乾枯或已出復隱內陷堪虞通身累累顆粒不分密如蠶種碎似鍼砂若熱之痲寒之粟者皆屬見點逆證

見點證治

痘已見點形色昭然形色既呈吉凶可斷而寒熱虛實一見分明治之不可差也若妄汗則成癰爛誤下則爲陷伏苦寒錯用元氣大傷辛熱混施毒火益熾虛寒失補癢塌堪憂實熱不清焦紫可慮惟貴觀形察色審證明確始治無失度克保赤子而成全功焉

蘇解散

荆芥 浮風 舊 升麻

根 羌活 牛子 川芎 前胡

梗 木通 甘草

宗湯

荆芥 牛子 木通 山查

皮 赤芍 生地

一見點太早，乃血熱毒盛也。原非順證，予每見發熱一
日二日，未及三朝而見點者，亦獲起灌收結，功臻十
全何也？必由兒體素強，痘出甚稀，復遇醫藥克當，食
健神安，亦可化險而歸順。勿概以見點早而爲逆也。
一痘發熱三朝，期應見點而不見點，則爲應出不出。若
有表邪風寒外鬱，不出宜用蘇解散發之。表開痘自
出。若無表證而有裏熱者，此爲毒火內伏，不出宜用
歸宗湯攻之。裏和痘自出。若形氣不足，應出不出，無
表裏證者，是正氣虛而不能外發，毒輕熱微，宜保元