

續名醫類案

十



續名醫類案卷二十四

錢塘魏之琇編集

妊娠

王顯字世榮。文昭皇后之懷世宗也。夢爲日所逐。化爲龍而遶后。后寤而驚悸。遂成心疾。文明太后敕召徐謩。及王顯等爲后診脈。徐謩言是微風入臟。宜進湯藥。及加鍼灸。顯診云。按三部非有心疾。將是懷孕生男之象。後果如言。

汪石山診一婦。形畏色紫。妊五月矣。求脈之以別男女。汪曰。右脈大於左脈。訣云。左大爲男。右大爲女。今脈右大。當是女耶。彼則喜曰。我男胎矣。往歲有妊時。尊甫先生診之。亦謂右脈浮大。當是女。孕後生男。今妊又得是脈。可知爲男矣。後果生男。汪曰。脈書但道其常。莫能盡其變。此醫所以貴乎望聞問切也。張子和診一婦人。年四十餘。得孕。自以爲年衰多病。故病復作。醫亦不察。加燭針於兩臍旁。又以毒藥攻磨。轉致腹痛。食減形羸。已在牀枕。張診其脈曰。六脈皆平。惟右尺洪大有力。此孕脈也。兼擇食。爲孕無疑。左右皆笑之。不數月生一女。兩目下各有燭針痕。幾喪其明。凡治病婦。當先問孕。不可倉卒。

王翳之妻。病臍下積塊。擇食面黃肌瘦而不月。或謂之乾血氣。治之無效。張視之曰。孕也。其人不信。再三求治。乃與之平藥。以應其意。妙否則別求人治。或致誤事。終不肯下毒藥。凡攻病之藥。皆曰毒藥。後月到果胎也。問何以別之。



海昌王士雄孟英同校
定州楊照藜素園



曰尺脈洪大也。亦有尺脈微弱而孕者。見求子門注石山案。素問陰陽別論所謂陰搏陽別之脈。

崑山周知縣景星家一婦病腹中塊痛。專科診之曰氣積。投以流氣破積之劑。又命人以湯餅軸戛之。不效。聞有巫峯神廟頗靈。往問之云。此胎氣也。勿用藥。信之。彼果生一男。南京戶部主事韓文光妻病腹中作痛。按之。若有物在臍左右者。適浙中一名醫至京。請診之云。是癥瘕。服三稜蓬朮之劑。旬餘覺愈。長亦以其不效乃止。後數月生二男。此皆有命而然。可不慎哉。客中問集

程氏光治一有胎婦。兒啼腹中皆不治。乃傾豆於地。令婦低頭拾之。兒啼止。江西通志

萬密齋曰。兒啼腹中。此證臨月將產。婦人有之。師母錢氏嘉靖戊子有娠九個月。兒在腹中哭。錢大驚。令

作男子拜而止之。過二十日生師兄邦孝。師母以下似萬門人。語邦孝似萬之子。

李有懷妾高氏懷妊二十七月。舉子後亦長成。雲間雜誌

朱丹溪曰。懷孕受物。乃一臟之虛。假如肝臟虛。其肝氣止能養胎。無餘用也。不能榮肝。肝虛故愛酸物。治

邢氏亡其名朱勝非婦偶小疾。命視之曰。小疾爾。不藥亦愈。然不宜孕。孕必死。其家以為狂言。後一歲朱

婦得子。其家方有抱孫之喜。彌月婦疾作。急召之。堅不肯來。曰。去歲已言之。無可療之理。越宿而婦卒。

人共奇之。錢塘縣志

薛立齋治一妊婦。胎六月。體倦嬾食。面黃晡熱。而胎不長。因勞欲墜。此脾氣不足也。用八珍湯倍參朮茯



苓三十餘劑。胃漸健。胎安而長矣。

一妊婦因怒寒熱往來。內熱晡熱。脇痛嘔吐。胎至八月而不長。此因肝脾鬱怒所致。用六君加柴胡山梔。枳殼紫蘇桔梗。病愈而胎亦長。

胎動

薛立齋治鴻臚張淑人。痢疾後胎動。心神不安。肢體殊倦。用八珍散二十餘劑。漸愈。因勞加煩。熱頭痛。以大劑補中益氣湯。加蔓荊子治之。熱痛頓止。仍用前散。又五十餘劑而安。其後生產甚易。

一妊婦八月胎欲墜。如產臥久稍安。日晡益甚。此氣血虛弱。用補中益氣湯。加茯苓半夏。隨愈。更以八珍湯調理而安。

一妊婦小便作痛。其胎不安。氣攻左右。或時逆上。小便不利。用小柴胡湯加青皮山梔。清肝火而愈。後因怒小腹脹滿。小便不利。水道重墜。胎仍不安。此亦肝木熾盛所致。用龍膽瀉肝湯一劑。諸證頓愈。乃以四君子加柴胡升麻。以培脾土而安。

孫文垣治張溪亭子室。娠已七月。夢見亡過祖母。揮拳在背。打一下。卽覺胎動不安。血已下。大小便皆急。腰與小腹脹痛者。五日診之。兩寸俱短弱。此上焦元氣大虛。當驟補之人。參阿膠黃耆白朮各二錢。當歸白芍條芩桂枝各一錢。砂仁香附各五分。苧根嫩皮三錢。葱白六錢。一劑而血止。再劑諸證悉除。四

劑後。減去葱白。苧根。調理旬日。足月產一女。

吳孚先治孫氏妊婦。六月作瀉。欲小產。診之曰。此水胎也。四君子加炮薑製附。十餘劑而安。

陳三農治一孕婦。腰痛甚如欲小產。用杜仲一兩。薑汁拌炒。續斷一兩。二味爲丸。白湯送下。遂安。

薛立齋治一婦人。胎下墜。或動。身體倦。飲食少思。此脾氣虛弱。用補中益氣湯。倍白朮加蘇梗。三十餘劑而安。產後眩暈。胸滿欬嗽。用四物加茯苓半夏。桔梗而愈。

一妊婦內熱晡熱。或兼寒熱。食飲少思。其胎或下墜。或上攻。此肝經血虛而火動耳。先用加味逍遙散數劑。次用六君子加柴胡枳殼。各數劑而愈。

一婦人每受胎。三四月作痛欲墜。此爲胎痛。用當歸二錢。熟地黃三錢而愈。

張飛疇曰。古人用條芩安胎。惟形瘦血熱。營行過疾。胎常上逼者相宜。若形盛氣衰。胎常下墜。非人參舉之不安。形實氣盛。胎常不運者。非香砂耗之不安。血虛火旺。腹常急痛者。非歸芍養之不安。體肥痰盛。嘔逆眩運者。非二陳豁之不安。此皆治母氣之偏盛也。若有外邪。仍宜表散伏邪。時氣尤宜急下。惟忌芒硝。切不可犯。雄按條芩。但宜於血熱之人。若血虛有火者。余以竹茹桑葉。絲瓜絡爲君。而輔以他藥。極有效。蓋三物皆養血清熱。而息內風也。物之堅強莫如竹。皮肉之緊貼。亦莫如竹。實爲諸血證之要藥。觀其塞丹不漏可知矣。桑葉蠶食之以成絲。絲瓜絡筋膜聯絡。質韌子堅。具包羅維繫之形。且皆

色青入肝。肝虛而胎系不牢者。勝於四物阿膠多矣。

子懸此證即胎上逼也附子滿

嚴氏子蘇散。許叔微云。治懷胎近上。脹滿疼痛。謂之子懸。陳良甫曰。妊至四五月。君相二火養胎。熱氣逆上。胎湊心胸。腹滿痞悶。用此加黃芩山梔之類。一方無川芎。名七寶散。紫蘇一兩。腹皮人參川芎橘皮白芍當歸各三分。甘草一分。剉分三服。水一盞。生薑四片。葱白煎去渣服。注畝菴曰。此方每服止用蘇葉一錢。當歸七分。腹皮以下

皆五分甘草二分無葱白

沈堯封治郁姓婦。懷妊九月。偶因勞動。遂覺腹痛。胎漸升至胸中。氣塞不通。忽然狂叫咬人。數人扶持不住。卽子懸之最重也。用旋覆代赭湯去參棗。連灌兩劑。胎墮得生。又一婦證亦如之。服前藥胎墮而死。又陸檢修正室。子上撞心。江穩婆教磨代赭汁服。遂產兩子。一子在上橫於心下。一子撞著上子。故經一晝夜不止。撞心得不死。產下遂安。

陳良甫曰。一婦孕七個月。遠歸。忽然胎上衝作痛。坐臥不安。兩醫治之無效。遂云胎已死矣。用蓖麻子研爛。和麝香貼臍中以下之。命在呼吸。陳診之。兩尺脈絕。他脈和平。陳問二醫作何證治之。答云死胎。陳問何以知之。曰兩尺沈絕。以此知之。陳曰。此說出何書。二醫無以答。陳曰。此子懸也。若是胎死。却有辨處。面赤舌青。子死母活。面青舌赤吐沫。母死子活。唇舌俱青。母子俱死。今面不赤。舌不青。其子未死。是

胎上逼。宜以紫蘇飲連進。至十服。而胎近下矣。雄按戊申秋荆人。妊八月而患欬嗽。礙眠。鼻衄如射。面浮指腫。諸藥不應。余思素屬陰虛。內火自盛。胎因火動。上湊心脈。肺受其衝。欬逆乃作。是不必治其嗽。仍當以子懸治之。用七寶散去參芍生薑。爲其胸滿而內熱也。加生石膏。以清陽明之火。熟地以攝根蒂之陰。投七卽安。今年冬亦以八月之妊。而悲哀勞瘁之餘。胎氣衝逆。眩暈嗽痰。脘脹便糖。舌黃口渴。予燭飲六神湯。去膽星茯苓。加枳實蘇葉大腹皮。以理氣開鬱。黃芩梔子竹茹。以清熱安胎。一劑知二劑已。凡子懸證。因於痰滯者。余每用此法。無不應如桴鼓。

薛立齋治一妊婦。每因恚怒。其胎上逼。左關脈弦洪。乃肝火內動。用小柴胡加茯苓枳殼山梔而愈。但體倦不食。用六君子加枳殼柴胡山梔而瘥。

孫文垣治費少垣。乃眷。妊已九月。痰多喘嗽。胎氣上逆。眼撐不能起。兩太陽微疼。此子懸證。兼痰火也。以紫蘇飲爲主。纔服一帖。卽不上逆。胸膈頓寬。惟喘咳不止。與七製化痰丸而安。紫蘇飲紫蘇腹皮川芎白芍陳皮當歸生薑人參甘草葱白。

陸祖愚治梅養中子婦。孕七月。其夫出外經商。患胎上衝心。不時昏暈。或與紫蘇安胎飲。數劑不效。脈之寸大於關。關大於尺。俱帶弦數。此血虛極而火上炎之故也。用清氣養榮湯。磨沉香四分。牛黃二分。煎就徐徐灌之。不終劑而甦矣。

萬密齋治徐太和之妻。娠八月。得子滿病。或作子懸治不效。腹滿轉甚。胎墜下迫。玉門大張。胞形外露。但仰臥不能坐。其脈兩手俱堅大搏指。謂曰病無害。乃雙胎也。胎肥氣弱。不能束約。故下墜耳。用束胎利氣主之。加人參一錢。升麻炒三分。服三劑。胎復上而安。後生一男一女。

楊乘六治我修姪婦。妊八月。一日胎忽上搶。塞至心口。喘滿不思食。自汗悶絕。僵臥。口噤目直視。面色不赤。舌色不青。按其兩手脈息尚有。急取丸子兩許。滾水研化灌之。灌至兩酒杯。胸口鬆動。口開睛轉。手足運動而甦。問何藥。乃爾神效。曰八味丸也。又問此何病而用此丸。曰此子懸也。由下元虛冷中無火。以養嬰兒。故上湊以就心火之溫。如人睡被中。足冷則上縮也。後用耆朮芎歸煎送前丸。服至兩月而產。沈堯封云此是百中僅一非實見虛寒脈證熱藥不可嘗試

子腫

一孕婦遍身皆腫。或以爲白火疸。或以爲鼓脹。治俱不效。產科郭大生曰。此名琉璃胎。至將產一月前。必飲食大進。產卽腫消矣。後果然。彼蓋閏歷多故耳。然病之所以然。究未之知也。

一婦孕七月。先下體發腫。漸及面目。閏數日。忽子戶內突出一水泡。皮薄而光亮。於是身體悉消矣。然起臥不便。困苦非常。後復皮破出水。恆不得乾。偶一內親自言。昔嘗患此。有醫教用王不留行。及明礬等藥煎洗而痊。如言試之。苦於螫痛。如此月餘。比前稍愈。而終不除。詢產科亦罕知者。但云此似不妨必

所謂琉璃胎也。產時自消。後果然。雄按此證恐是氣虛挾水

一孕婦遍身發腫。既產仍不消。只向裏牀臥。終日昏迷。不省人事。有時少醒。卽又狂躁不甯。如此二十餘日。絕口不食。諸醫束手。偶有村媼聞而告曰。無憂。我兒媳亦曾如此。不餓死也。但用陳年白蠶。向病人前炙熱。以米醋沃之。彼聞香自然飲食。如言果愈。腫亦遂消。

薛立齋治一妊婦。每胎至五月。肢體倦怠。飲食無味。先兩腿腫。漸至遍身。後及頭面。此脾肺氣虛。朝用補中益氣湯。夕用六君加蘇梗而愈。

元豐中淮南陳景初名醫也。獨有方論治妊婦子腫病。其方初謂之香附散。李伯時易名曰天仙藤散。王荊公居金陵舉家病。以詩贈景初曰。舉族貧兼病。煩君藥石功。到家何所有一。一問征鴻。因此見方得於李伯時家。溥方錄於臨川張右丞宅。

薛立齋治一婦子腫。用紫蘇飲三服而愈。

轉脬

鍾大延治一貴家孕婦。小便祕腫痛。面赤發喘。眾醫莫效。大延診之曰。是可弗藥。乃胎壓膀胱耳。令其周

身運轉而瘳。寧波府志

孫卓浮梁人。素精岐黃。正德間。邑令以宸濠之變。先輿送其夫人避山中。病前祕五日。腹大如鼓。仰而張



目息已微。急召孫。孫曰。此盛暑急驅。飲水過度。羞溺而轉脬也。法以猪尿脬吹氣貫滿。令女婢投入衝之。而溺淋淋下。遂起。江西通志

孫文垣治一富家婦。大小便秘者三日。市師以巴豆丸二帖。大便瀉而小便愈秘。脹悶臍突二寸餘。前陰脹裂。不可坐臥。啼泣呻吟。欲求自盡。孫曰。此轉脬病也。植樹東行根皮一寸。滑石三錢。元胡索。桃仁。當歸。瞿麥各一錢。臨服入韭菜汁半杯。服後食頃。小便稍行。玉戶痛甚。非極用力努之。則不能出。改用升麻。桔梗。枳殼。元胡索。煎成調元明粉二錢。乃提清降濁之意。服後大小便俱行。始不脹急。次日報云。每便時腹先痛。有淡血水。小便短。再以丹參。丹皮。當歸。白芍。甘草。青皮。香附。元胡。茯苓。山梔。山查。兩帖而安。

孫君又有四卷七十七頁一案。亦轉脬病。治法大抵如前。惟多令患者橫臥。昇有力婦人。以患者兩腿膝彎架肩上。將下體虛空提起。搖擺數回。則尿脬倒上。徐徐放下。患者去衣不及。小便箭射而出。熱如湯。黑如墨。頃刻盈盆。按轉脬病古人但令患者橫臥榻上。高其下體。良久其尿自通。殊不費力。

黃履素曰。予窗友賀立菴方伯。常言其伯父賀岳精於醫。曾治一孕婦。將坐草。患小便不通。百藥不效。愈飲愈飽。束手待斃。賀君診之曰。此乃脾氣虛弱。不能勝胞。故胞下壓塞膀胱。以致水道不通。大健其脾。則胞舉而小便自通。以白朮二兩土炒。加炒砂仁數錢。別加一二輔佐之藥。服一劑。小便立通。其神如

此予常記此言於懷中。壬寅歲內人有妊。臨月竟同此病。醫療無效。危甚。余以此法告醫者。喜。醫虛心。如法治之。立效。遂舉長子寅錫。余若不聞此言。母子均殆矣。雄按今夏錢希敏室人患此甚危。速余視之。脈甚滑數。睛赤口乾。與車前子滑石血餘。栝蒌知母。梔子牛膝。紫草沙苑。大劑投之。溺仍不行。竟產一男。既而胞下。搜滿其中。蓋兒已出。胞頻飲湯水。盡貯於中也。余雖初不料其如此。然設非開泄導下。則胎不卽下。而再加健脾燥補之藥。則百凶不可知矣。臨證不亦難乎。

李時珍嘗治數人。小便不通。及轉脬危急者。令將葱管吹鹽入莖內。極有捷效。又小兒不尿。乃胎熱也。用大蔥白切四片。乳汁半盞。同煎片時。分作四服。卽通。不小便者。服之卽通。不飲乳者。服之卽飲乳。若臍四旁有青黑色。皮口撮者。不可救也。本草綱目

薛立齋治司徒李杏岡仲子室。孕五月。小便不利。諸藥不應。薛曰。非八味丸不能救。不信。別用分利之藥。肚腹腫脹。以致不起。

儒者王文達室。患小便不通。小腹腫脹。幾至於殆。用八味丸一服。小便滴瀝。再以前藥一料。加車前子。一劑卽利。肚腹頓寬而安。

陸養愚治方思桂女。年十四。患大小便不通。已三日。村醫與丸藥數十粒。如芝麻大。服之。大便立通。而瀉。小便仍祕。又二日。脹悶。臍下突出。脹時抽痛。不能坐臥。啼泣呻吟。欲求自盡。服之。沈數。而兩尺尤甚。曰。此轉脬病也。時尙炎熱。以六一散并水調服之。小便稍行。行時陰中極痛。後仍點滴不暢。大便努責而。

無積腹痛時作。痛則如刀刺。再診脈仍沈數。乃用升麻三錢。柴葛甘桔各一錢。以提清降濁。服後二便俱行。小便純血。大便亦帶血水。其家猶危之。曰。今無恙矣。向者丸藥必巴豆也。病本熱鬱。而以極熱之藥攻之。向之刺痛。今之溺血。皆巴毒使然也。以犀角地黃湯加黃連山梔而愈。

萬密齋治一娠婦。小便淋瀝不通。醫作轉胞。治之不愈。乃用檳榔赤芍二味研末。順取長流水煎湯調服。效。此方治男婦一切血淋及淋瀝水道疼痛。用之無不神效。

馬元儀治沈氏妾。妊娠八月。下利二十餘日。利後患小便淋閉。渴而引飲。飲畢方去滴許。澀痛異常。已三晝夜。診得肺脈獨大。餘脈虛濇。曰。下利經久。脾陰必耗。燥火自強。今見肺脈獨大。是火據肺位。金被火制。氣化不及。州都便溺何由而出。經曰。病在下者治上。令上竅越則下竅自行矣。且妊婦之體。脈見虛澀。氣血不能養胎。可知。若再行趨下。不惟病不除。且有胎動之患。因與紫苑五錢。專理肺氣。下及膀胱。乾葛一錢。升發胃氣。數布津液。火鬱則氣燥。以杏仁蘇子潤之。燥勝則風生。以薄荷清之。加枳殼桔梗。開提三焦之氣。一劑小便如泉。再劑利下亦止。

吳橋治趙氏婦。素孱弱。有身七月。病不得大小溲。醫者遞以四苓利之。卒不利。久則小腹前後脹急痛楚。燥亂昏憤。殆將不勝。橋診之。則以補中益氣湯加黃連為劑。一服小溲稍行。明日為湯液五斗。呼絮壺者口授之。扶病者坐。臨盤遞引湯沃病者腹。沃已。口授產嫗。舉手捧其胎。大小溲即行。病愈矣。病得之

食砒而吐未盡其遺毒觸胎病者故內虛胎氣下墮而壓脬矣。或曰胎壓脬而不得小洩誠是也。大洩何爲橋曰小洩塞則鼓膀胱是將墮大腸其氣亦爲不利故爾。聞者曰善。太函集

胎墜

薛立齋治一婦人墮胎昏憤。不時吐痰。自用養血化痰之劑。昏憤不省。自汗發搐。痰涎涌出。彼以爲中風。欲用祛風化痰之劑。薛曰此屬脾氣虛寒所致。遂用十全大補湯加炮薑二十餘劑尋愈。一婦人年二十餘。疫疾墮胎。時咳服清肺解表喘急不寐。薛謂脾土虛不能生肺金。藥損益甚。先與補中益氣加茯苓半夏五味炮薑四劑漸愈。又與八珍加五味及十全大補湯全愈。

龔子才治一婦人每懷孕至三個月必墮。不肯服藥。教以四五年老母雞煮湯。入紅殼小黃米煮粥食之。不數服而胎固。至足月生男。

方節菴之夫人朱氏。屢受產難。因就醫乞墮胎方。服之無效。復求方於鄭氏。鄭云墮胎不下必貴兒也。今後宜服安胎藥矣。一日方閒步阡陌間。見一道人手攜竹筐。坐於橋下。與之語。道氣盎然。因設齋留之。到家問筐中何物。曰此濟療病人丹藥也。因授一方。名曰回生救產丹。并勸修合普施。朱夫人誕彌厥月。時服一丸。則果如達矣。遂連生二子。長名鵬字矯亭。次名鳳字改亭。後一爲宮詹。一爲御史。張氏薛立齋治一婦苦於生育。孕及三月。以面粉燒酒調服墮胎。胎去下血不止。嘔吐湯藥不納。六脈細小欲

絕作毒藥傷胃氣。胃氣虛不能司納。以人參二錢。甘草五分。水煎。徐徐與服。嘔止。用八珍湯調理而安。

又治一孕婦。用前藥。患前證。胸腹飽滿。嘔吐不止。用萊豆甘草湯飲之而安。

一婦懷孕三月而墮。墮後發熱自汗。四肢軟弱。曰。氣血虛。不能榮養其胎。故墮。墮後益虛。陰虛則發熱。陽

虛則自汗。以十全大補湯去桂加五味子而安。

吳橋治程應兆妻。素多病。三月不月。已忽微行。諸醫以爲積血而力導之。惡乃大至。舉身汗溢。垂絕而甦。則又爲虛極。而重劑補之。上視反張。驚搐昏冒。飾巾待盡。橋診之。脈雖離經。按之不絕。曰。此妊娠也。誤謂積血。迫之大行。胎離經而欲下。則血竭而途窮。陽氣無陰血可依。則浮騰而上。越胎墮陽上逆而觸心。故上視反張。驚搐昏瞽。法不當死。乃予順胎散。始進甚艱。既及半而藥力行。啞焉而寐。諸醫目橋曰。死矣。橋曰。藥中病乃寐。諸公待之頃之。呻吟始云頭痛。諸醫以爲餘燼也。夜分乃終。橋曰。中夜陽生。比當來復。時至而圍圍乃少舒。詰朝爽然。俄仆臥。諸醫目攝橋曰。真死矣。橋曰。胎欲下而血垂盡。壅關不得行。尋以順胎散下之。則血塊大如拱。諸醫攝橋曰。吾儕固以爲積血。果然。橋徐應曰。非積血也。胎也。立引水澆而濯之。外紫而中白。具人形。病者漸安。諸醫乃服。

太函集

徐靈胎曰。婦科之最重者二端。墮胎與難產耳。世之治墮胎者。往往純用滋補。治難產者。往往專於攻下。二者皆非也。蓋半產之故非一端。由於虛滑者十之一二。由於內熱者十之八九。蓋胎惟賴血以養。故

得胎之後。經事不行者。因衝任之血。皆爲胎所吸。無餘血下行也。苟血或不足。則胎枯竭而下墮矣。其血所以不足之故。皆由內熱。火盛陽旺而陰虧也。故古人養胎之方。專以黃芩爲主。又血之生。必由於脾胃。經云營衛之道。納穀爲實。故又以白朮佐之。乃世之人。專以參耆補氣。熟地滯胃。氣旺則火盛。胃濕則不運。生化之源衰而血益少矣。至於產育之事。乃天地化育之常。本無危險之理。險者手不得一世之遭厄難者。乃人事之未工也。其法在乎產婦不可令早用力。蓋胎必轉而後下。早用力則胎先下墜。斷難舒轉。於是橫生倒產之害生。又用力則胞漿驟下。胎已枯澀。何由能產。此病不但產子之家不知。卽收生穩婦。亦有不知者。至於用藥之法。則交骨不開。胎元不轉。種種諸證。各有專方。其外或宜潤或宜降。或宜溫。或宜涼。亦當隨證施治。其大端以養血爲主。蓋血足則諸證自退也。至於易產強健之產婦。最多卒死。蓋大脫血之後。衝任空虛。經脈嬌脆。健婦不以爲意。輕舉妄動。用力稍重。衝脈斷裂。氣脫血崩。死在頃刻。尤忌舉手上頭。如是死者。吾見極多。不知者以爲奇異。實理之常。生產之家。不可不知也。

胎死

章虛谷治陳姓婦。年未三十。懷妊已六月。腹滿及胸。飲食不進。大便艱燥。小便不利。左膀間與小腹掣痛如錐刺。日夜坐不能寐。醫用五苓散方。章診之。左脈弦強。關尤甚。右關弦滯。曰凡溫邪脈必濡細。今脈

象如是。乃血少。肝氣犯脾胃也。彼以小便不利。故認爲濕邪。不知經云。肝主遺溺。癰閉。此肝火鬱結之癰閉也。風火煽動。故膀胱刺痛。若用利水藥。反傷津液。其燥愈甚。必致瘵厥之變矣。乃重用大生地爲君。佐以當歸白芍黃芩紫蘇生甘草。稍加厚朴木香等。服兩劑。脈稍和。滿略減。惟小便仍瀉。猶有刺痛。於前方加黃柏車前。服兩劑。小便暢行。其痛若失。乃去黃柏紫蘇。又服兩劑。胸寬食進。惟腹滿不能全消。至第三夜。忽於睡夢中震響一聲。落下死胎一個。滿床皆水。始悟水在胞中。其胎早經泡死。利水之藥。斷不能泄胞中之水。反耗其陰。必致瘵厥而死。病情變幻。有非常理所能測者。同時章姪女亦患此證。爲醫用利水藥而致瘵厥。又妄認爲中寒。用附子理中湯一劑。乃至陰陽脫離。章用大劑滋陰攝陽之藥。晝夜急進。竟不能救。延三日而卒。

許裕卿治邵涵貞內子。孕十七月不產。不敢執意憑脈。問諸情況。果孕非病。但云。孕五月以後不動。心竊訝之。爲主丹參一味。今日服七錢。兩旬餘。胎下已死而枯。其胎之死。料在五月不動時。經十三月在腹。不腐而枯。如果實在樹。敗者必腐。亦有不腐者。則枯胎之理可推也。雄按此由結胎之後生氣不旺。未過數人矣。若胎已長成。豈能死於腹中而不爲大患哉。惜許君言之未詳也。故及之。

張路玉治馬雲生婦。孕十三月不產。脈來微結。爲處十全大補湯。服至二十餘劑而下。胎枯色白。治雖異。而胎枯則一也。

喻喜言治顧季掖乃室仲夏時孕已五月偶爾下血醫以病經一月用阿膠勉強其胎又身腫氣脹血逆上奔結聚於會厭胸膈間飲食纔入觸之痛楚轉下甚難稍急卽嘔出全似噎證數更醫皆謂胎氣上逼延至秋計孕已八月病已造極中之極呼吸將絕診之不云病狀其脈尺部微瀼難推獨肺部洪大無倫其喘聲如曳鋸其手臂青紫腫亮如毆傷色乃駭曰似此凶證何不早商然不必明言以滋驚恐姑以善藥投之通其下閉上壅可也季掖必求病名曰上壅者以肺脈之洪大合於會厭之結塞知其肺當生癰也下閉者以尺脈之微瀼合於肉色之青腫知其胎已久壞也善藥者瀉白散加芩桔之苦以開之不用硝黃等厲藥也服一大劑腹卽努痛如欲產狀問欲產乎曰肺氣開而下行多時閉拒惡穢得出可也奚產之云再進一劑身腫稍退上氣稍平下白汚如膿者數斗裏朽胎而出旬餘尙出白汚並無點血相間可知胎朽腹中已近百日陰胎之血和胎俱化爲膿也病人當時胸膈卽開連連進粥神思清爽然朽胎雖去而穢氣充斥周身爲青腫者未去也胸膈雖寬而肺氣壅遏爲寒熱咳嗽者未除也乃一以清肺爲主旬餘獲痊

然則肺癰未成乃穢濁之氣上攻而然耳

立齋治一穩婆之女勤苦負重妊娠腹中陰氣重墜口中甚穢意其胎必死令視其舌果青黑與朴硝半

兩許服之隨下穢水而愈

濟陰綱目是薛案

一婦胎死服朴硝而下穢水肢體倦怠氣息淹淹用四君子爲主佐以四物薑桂調補而愈

雄按未可卽投大補恐穢