


大便不通 小便不禁 遺精
赤白濁 痃飲 欬嗽 喘

醫宗必讀



醫史以計卷之九

雲間李中梓士材父著

門人董爾正季父叅

姪孫李廷芳蘅伯父訂

大便不通

經曰北方黑色入通於腎開竅於二陰

腎主五液津液盛則大便調和若飢飽勞後損

傷胃氣及過于辛熱厚味則火邪伏於血中耗散真陰津液虧少故大便燥結又有年老氣虛津液不足而結者腎惡燥急食辛以潤之是也

愚按內經之言則知大便秘結專責之少陰一經證狀雖殊

之津液枯乾一言以蔽之也分而言之則有胃實胃虛熱秘冷

秘風秘氣秘之分胃實而秘者善飲食小便赤

麻仁丸七胃虛

而秘者不能飲食小便清利厚朴湯熱秘者面赤身熱六脈數實

腸胃脹悶時欲得冷或口舌生瘡四順清涼飲潤腸丸木香冷秘

者面白或黑六脈沉遲小便清白喜熱惡冷藿香正氣散如官

氣秘者氣不升降穀氣不行其人多噫蘇子降氣湯如枳殼

枳榔風秘者風搏肺藏傳于大腸小續命湯去附子倍芍藥

左更有老年津液乾枯婦人產後亡血及發汗利小便病後血

氣未復皆能秘結法當補養氣血使津液生則自通誤用硝黃

利藥多致不救而巴豆牽牛其害更速八珍湯加蘇子廣橘紅

若病証雖屬陰寒而脈實微躁宜溫煖藥中畧加苦寒以去熱

躁躁止勿加如陰躁欲坐井中者兩尺按之必虛或沉細而遲

且理中湯特極冷方服或服藥不應不敢用峻猛之藥者官

有熱者猪膽汁導之久虛者如常飲食法煮猪血臍湯加
酥食之血仍潤血臍仍潤臍此妙法也每見江湖方士輕用硝
磺者十傷四五輕用巴豆者十傷七八不可不謹也
或久而愈結或變為肺癆吐膿血或飲食不進而死

醫案

少宰蔣恬庵服五加皮酒遂患大便秘結四日以來腹中脹悶
服大黃一錢通後復結余曰腎氣衰少津液不充誤行疎利是
助其燥矣以六味丸煎成加入乳一鍾白蜜五錢二劑後即通
十日而康復矣

文學顧以貞素有風疾大便秘治風須治血乃大法也用十全

大便不通

大補湯加秦艽麻仁杏仁防風煨皂角仁半兩而效三月以後
永不復患以手書謝曰不肖道力僻處窮鄉日與庸人爲伍一
旦櫻非常之疾困苦經年靡劑不嘗反深沉痼遂不遠百里就
治神良作聆指教肺腑快然及飲佳方如吳味之授百日以來
沉疴頓釋今幸生歸矣凡仰事俯育儔非意外之慶則儔非台
翁之賜哉全家額手尸祝湛恩乞附名案之尾以誌感悰幸甚

麻仁丸 治腸胃熱燥大便秘結

厚朴 去皮蘇
汁浸炒 芍藥

枳實 麩炒各
半觔 大黃 蒸焙
一觔 麻仁 別研
五兩

杏仁 去皮炒
五兩半

右爲末煉蜜和丸桐子大每服二十九臨卧溫水下 大便秘
利卽止

七宣丸 治風氣結聚實邪秘結

甘草炙四兩

大黃麵裹煨十五兩

右為末煉蜜丸如桐子大每服二十九食前臨卧各一服米

飲下以利為度

厚朴湯 治胃虛秘結

厚朴薑汁浸炒透 陳皮

甘草各三兩

白朮五兩 半夏麴

枳實楚炒各二兩

右為釐末每服五錢水一鍾半薑三片棗一枚

煎至八分食前大溫服

四順清涼飲 治血燥內熱大便不通

大黃蒸

甘草炙

當歸酒洗

芍藥各一錢

水鍾半薄荷十葉煎至七分服

大便秘不通

潤腸丸 治風結血秘胃中伏火

羌活

歸尾

大黃

煨各五錢

麻仁

桃仁

去皮尖各

一兩右為末除麻仁桃仁另研如泥外為細末煉蜜丸如桐子
每服五十九空心白湯送下

木香檳榔丸

疎導三焦快氣化痰消食寬中

木香

檳榔

枳殼

炒

杏仁

去皮尖炒

青皮

去穢各二兩

半夏

皂角

酥炙

郁李仁

各二兩

右為末別以皂角四兩用漿水一碗搓揉熬膏更入熟蜜小

許和丸桐子大每服五十丸食後薑湯下

大承氣湯

大黃

芒硝

厚朴

去皮

枳實

各二錢

藿香正氣散

小續命湯

養正丹

八珍湯

俱見中風

蘇子降氣湯

治氣滯妨悶痰盛便秘

蘇子炒

半夏

湯泡各二錢半

前胡

甘草

炙

厚朴

薑汁浸炒

陳皮

各一錢

當歸

一錢五分

沉香

七分

水二鍾薑三片煎至一鍾服虛人加五分黃耆一錢

牛蒡子

治老人虛人冷秘

熟半夏

為細末

硫黃

研極細用柳木槌子微過

以生薑自然汁同熬入乾蒸餅末攪和勻入柏內杵數百下

丸如梧子大每服十五丸至二十丸溫酒或薑湯下婦人醋

湯下俱空心服

大頭下量

橘杏湯 治脉浮氣秘若脉沉為血秘以桃仁代杏仁

杏仁湯泡去皮尖 橘紅去白淨 水一鍾生薑三片煎七分服

益血潤腸丸

熟地黃六兩 杏仁去皮尖炒 麻仁各三兩以土 枳殼麩炒

橘紅各二兩 阿膠炒 肉蓯蓉各一兩半 蘇子

當歸三兩 為末以前三味膏同杵干餘下仍加煉蜜丸桐

子大每服六十九空心白湯下

穿結藥 治大實大滿心胸高起便秘

蟾酥 輕粉 麝香各一錢 巴豆五分另研

右研極細末用孩兒茶乳汁和丸如黍米大每服三九薑湯

送下

小便不禁

經曰督脉生病為遺溺又曰肝所生病為遺溺

督與肝二一並

病則營衛不至氣血失常莫能約束水道之竅故遺失不禁

又曰膀胱不約為遺溺又曰手

大陰之別名曰列缺其病虛則欠欬小便遺數

由此二節觀之不獨病在陰器

迂孔而已三焦為決瀆之官失其官則遺溺何也三焦之脉從缺盆布膻中下鬲循屬三焦膀胱之脉從肩膊內挾脊抵腰中入循膂屬膀胱凡三焦虛則膀胱亦虛故不約也肺從上焦通調水道下輸膀胱而腎又上連于肺兩藏為子母母虛子亦虛此言上中下三焦氣虛皆可以致遺溺也

愚按世俗之治小便不禁者但知補澀而已不知內經論肝腎

膀胱之病不指為何邪所干則知七情六氣皆能為病也又言

手太陰虛者為子母相關之病則知所生所勝所不勝之五邪

皆足以為病也總其大要而言肺者主氣以下降生水以下輸

小便不禁

膀胱者津液藏焉氣化則能出水泉不止者膀胱不藏也此兩

經者實為總司肺虛者為上虛當補氣補中益氣湯不愈當以黃蘗生地麥門冬清其

熱膀胱虛者為下虛當溫脫桑螵蛸雞肝丸之類挾寒者家並子丸固腎丸白茯苓散免絲子散

之類補脫者牡蠣丸挾熱者白薇散或雞腸散更有睡則遺尿皆責之虛所以嬰兒腎

氣未固老人下元不足多有此證在嬰兒挾熱者十居七八在宜大免絲子丸猪脾

老人挾寒者十居七八此又不可不辨也炙研碎煎湯送下更

須審寒熱而為之活法

姪娘尿出不知用白礬牡蠣為末酒調服二錢或雞毛灰米酒

服一七或炙桑螵蛸益智仁為末米飲下薛立齋云此證若用

中有熱加味道遙散若脾肺氣虛補中益氣湯加益智若肝腎

金匱六未

胞者八珍湯兼進補脾飲若膀胱氣虛而小便頻數當補脾肺
若膀胱陰虛者須補肺腎

醫案

方伯張七澤夫人患飲食不進小便不禁余曰六脉沉遲水泉
不藏是無火也投以八味丸料兼進六君子加益智肉桂二劑
減數劑而安

文學俞玄倩憂憤經旬忽然小便不禁醫皆以固脾補腎之劑
投之凡一月而轉甚余謂之曰六脉舉之則軟按之則堅此腎
肝之陰有伏熱也用牡丹皮白茯苓各二錢苦參八分甘草稍
六分黃連一錢煎成調黃雞腸與服六劑而安矣適有吳門醫

者云既愈當大補之數日後仍復不禁再來求治余曰肝家素有鬱熱得溫補而轉熾遂以龍膽瀉肝湯加黃雞腸服之四劑即止更以四君子加黃連山枝一月而愈

家韭子丸 治遺溺夢遺白濁

家韭子

炒六兩

鹿茸

四兩酥炙

肉苁蓉

酒浸去甲

牛膝

酒浸

熟地黄

當歸

各二兩

兔絲子

酒浸

巴戟

各一兩五錢

杜仲

炒

石斛

去苗

桂心

乾薑

各一兩

右爲末酒糊丸桐子大每服三十丸加至百丸空心食前鹽

湯溫酒任下

固腎丸

熟地黃二兩 補骨脂二兩 杜仲二兩 鹿茸二兩 肉苁蓉二兩 牛膝二兩 巴戟二兩 當歸二兩 兔絲子二兩 石斛二兩 桂心二兩 乾薑二兩

附子

炮去

桑寄生

大黃

黃連

山枝

二錢

白茯苓散

白茯苓

龍骨

乾薑炮

附子炮去皮臍續斷

桂心

甘草炙各一兩

熟地黃

桑螵蛸微炒各二兩

右剉碎每服四錢水一盞煎六分食前服

鹿茸散 治小便不禁陰痿脚弱

鹿茸

二兩去毛酥炙

韭子微炒

羊躑躅

酒拌附子炮

桂心

各一兩

右為細末每服二錢食前粥飲調服

兔絲子散 治小便不禁或過多

兔絲子

二兩酒浸三日晒乾另搗為細末

牡蠣

附子

炮去皮臍

五味子

各兩

雞胍

去黃皮微炒

肉蓯蓉

各二兩

右為末每服二錢粥湯送下

牡蠣丸

牡蠣

白者三兩入磁瓶鹽泥固濟赤石脂三兩搗碎醋拌勻

炭伍斤煨半日取出研細

酒糊丸梧子大每服五十丸空心鹽湯下

白薇散

白薇

白斂

芍藥各等分

右為末每服二錢粥飲下

雞腸散

黃雞腸

雞者四具切破洗淨炙令黃

黃連

去鬚

肉蓯蓉

酒洗切焙

赤石脂

另

白石脂

研

苦參

各五兩

右為末每服二錢食前酒下日二夜三

大烏絲子丸

治腎虛小便不禁

桑絲子酒浸

肉桂去粗皮

附子炮去皮各一面

石斛去根

熟地黄

白茯苓去皮

牛膝酒浸一宿焙乾

續斷

山茱萸去核

肉蓯蓉酒浸切焙

防風去蘆

杜仲去荒皮炒去絲

補骨脂去衣酒炒

華澄茄

沉香

巴戟去心

茴香炒各三兩

五味子

桑螵蛸酒浸炒

覆盆子去枝

芍藥各半兩

或鹽湯任下

右為細末酒煮麵糊丸如桐子大每服二十九空心溫服酒

逍遙散 治血虛小便不禁

白茯苓

白朮土炒

當歸身

白芍藥

酒炒

柴胡各一錢

甘草五分

水一鍾煨薑三片煎至六分服

補中益氣湯

八珍湯

六味丸

俱見虛癆

補肝飲 治產時傷脾小便漏出

生黃絲絹

一尺剪碎

白牡丹

根處用千葉者

白芨

各一錢

右為末水一碗煮至絹爛如飴空心頓服服時不得作聲作

聲即不效

桑螵蛸散

治陽氣虛弱小便不禁

桑螵蛸

三十箇炒

鹿茸

酥炙

黃耆

各三兩

牡蠣

煨

人參

赤石脂

各二兩

右為末每服二錢空心粥飲調服