

三十九

第四六二冊

博物彙編  
藝術典  
醫部

四七  
四九  
(卷)

痘疹一門全四之二、

姜仲

古今圖書集成

中華書局影印



萬氏家傳痘疹心法

始終發熱渴妄

腹痛驚狂

腰痛

吐利嘔吐噦洩利大小便閉咳嗽

喘急

自汗失血

煩躁

火炎

痰癥

瘡瘍

瘻瘍

如瘡已出或起發或收臍一向渴不止者人參麥門冬散主之

如能食而渴者肺熱也經曰心移熱於肺傳爲膈消由心火上炎乘於肺金熏蒸焦膈傳耗津液故渴也在上焦人參白虎湯加黃連

如不能食而渴者脾虛也叔和云口乾饑飲水多食亦饑虛由脾素弱不能爲胃行其津液故渴也治在中焦參苓白朮散主之

如自痢而渴者邪傳腎也正理論云自痢而渴者屬少陰虛故引水自救蓋腎主五液其脉絡於肺繫舌本邪傳於腎則閉合不司故自利自利則津液下走腎水乾不能上潤於舌故大渴也治在下焦宜溫之陳氏異功散主之

如渴而大便祕者宜利之四順清涼飲主之

### 腰痛

瘡疹發熱先腰痛者最宜忌之經曰腰者腎之府也又曰太陽所至爲腰痛蓋足太陽膀胱經爲十二經之首其脉俠脊入循膂終腎瘡疹之毒起於右腎之下循足太陽膀胱散於諸經乃邪由裏傳表也如初發熱時其腰即痛此邪由膀胱直入於腎故關節不利而腰痛亟解毒以瀉少陰之邪發表以通太陽之經使邪氣不得深入瘡雖稠密或可愈也治若少緩則太陽之邪由表以傳於陽少陰之邪由裏以傳於陰表裏受病陰陽俱傷營衛之脉不行臟腑之氣皆絕或爲黑陷或爲癲瘍終莫能救之矣

凡發熱更腰痛者先服人參敗毒散大服五苓散加鵝鴨主之

**腹痛**

內經腹痛皆屬於寒惟有一證爲熱瘡疹腹痛皆屬毒熱也訣云發熱壯中痛班瘡腹內攻發多防不透發少更防癰是已或有兼食積者

如初發熱便腹痛者此毒氣內攻須急治之不可遂巡以貽後悔便調者四君子湯去白朮加青皮木香山楂肉枳殼便閉二三日未行者承氣湯主之

如發熱腹痛大渴煩躁大便祕狂妄者三乙承氣湯主之

如發熱腹痛大便如常者化毒湯主之

如發熱腹痛大便自利者黃芪建中湯主之

如瘡已出至收臍時原無腹痛忽然作痛此必有飲食也消息審問曾因飲冷水者五苓散主之或用黃芪建中湯加白朮乾薑人參曾傷食者問傷何物丁香牌積丸主之用原物湯下

如瘡已出至收臍原無腹痛忽然作痛亦未傷飲食但觀其大便何如若便祕者此燥屎也以三黃丸微利之大便自利者此虛痛也黃芪建中湯主之

如因寒而痛者理中湯加白芍桂枝王之

如發熱時心腹綻痛煩悶叫呼或瘡陷伏眼滿疼如喘促者此乃毒惡之氣攻刺腸胃燔灼臟腑必不可治

### 譖妄

譖多言也妄虛妄也譖妄者妄有聞見而語言無倫也皆邪氣熾盛正氣虛弱神識不清之所致夫言爲心聲心熱則多言睡中呢喃者熱之微也寤而語言差謬熱則甚矣亦有胃熱而譖語者大便必秘數日不更衣方是妄有聞見而譖語者其候難治蓋腎志開竅於耳在目爲瞳子毒邪入腎則志喪志喪則耳目妄有聞見故曰失志者死難經云脫陽者見鬼初發熱時譖語者此毒邪犯心心爲熱冒其神浮越宜瀉火鎮神導赤湯牛黃清心丸兼而治之

如腹中有燥屎三五日未更衣者宜瀉腸解毒以四順清涼飲三黃丸主之

骨節開張腠理疏解中存發散之義瘡出而驚即止若一向發而不已此則可惡乃毒內伏於心故耳狂者心爲火而主神腎爲水而主志火起於內濁亂擾動心神不守腎志不寧故發爲狂也亦有大便祕硬而狂者此謂有燥屎爲陽明病但數日不更衣是久難經所謂重陽者狂也如昏不知人起臥不定又爲不治之證

如初發熱驚搐者導赤散加辰砂兼羌活湯主之若發熱不休小便利者可治小便不利者難瘳以導赤散牛黃清心丸相兼治之

如瘡疹收臍之後又發驚者此真氣虛弱火邪內攻宜急治之恐久成癪以貽終身之害寧神湯抱龍丸主之

如初發熱大便自調狂亂者五苓散加辰砂主之如大便祕者輕則三黃丸甚則承氣湯主之

如腹中聞見故曰失志者死難經云脫陽者見鬼初發熱時譖語者此毒邪犯心心爲熱冒其神浮越宜瀉火鎮神導赤湯牛黃清心丸兼而治之

南京中医药大学图书馆版权所有

如起發成漿欲曠之時忽然神昏譖語者此由瘡本  
稠密精血外耗不能養神宜養血瀉火安神丸主之  
如昏不知人語言無倫者死經曰衣被不斂言語不  
避親疎者神明之亂也故不可治  
如初發熱便妄有聞見狀如見鬼而恐怖者不治此  
證自始至終皆不可有乃神志俱喪軀殼徒存不過

叶禾

瘡嘔吐利常候也經曰諸嘔吐暴注皆屬於熱蓋三焦爲水穀傳化之道路熱火內迫則傳化失常而吐利並作火性燥動迅歛故也邪在上焦但吐而不利邪在下焦但利而不吐邪在中焦則上吐下利又裏氣上逆而不下則吐氣下而不上則利瘡疹初發熱時有吐利者不可驟止令邪氣上下得出也吐利久不止方可治之更宜消息

如初發熱自利一日只三四行者此不必治痘出利  
如初發熱自利清白色者此裏有寒也理中湯主之  
如自利久不止此有濕也宜分利小便固澀腸胃恐  
虛裏氣致生陷伏也以五苓散豆蔻丸相兼治之  
如初發熱暴吐不止此火氣上逆也茱連散主之

仲景云聲物兼出爲嘔物獨出爲吐聲獨出爲乾嘔  
乾猶空也明其無物也然乾嘔與嘔皆聲之獨出者

乾嘔其聲輕小而短噦其聲重大而長嘔吐痰痘疹疔最惡候也蓋胃爲水穀之海上通乎咽內而不出如初發熱有是證此火邪犯胃其氣上逆治之則易若自出現以至收醫有是證者乃瘡集於咽門攻於胃腕吞咽不利治之則難由於不知預解咽喉之法漸變爲失音噲水而不可救矣

大小便門

如因飲冷水自利者所出必酸臭乃飲食自倍腸胃乃傷也宜先去積丁香脾積久後補脾胃益黃散主之如利久不止者先服陳氏木香散兼荳蔻丸主之更甚者陳氏異功散主之此藥太峻不可猛服如結癥之時暴泄不止者消息所出之物肺皮膿血者順水穀不分者逆如利膿血不止者此熱毒下流也香連丸主之

大小便閉

凡瘡疹小便欲其流而長大便欲其潤而實則邪氣不伏正氣不敗經曰小便數者大便必硬雖二三日不更衣無苦也如覺小水少則病增進蓋心主瘡而屬火心移熱於小腸小腸移熱於膀胱膀胱爲津液之府氣化則出氣爲火食不能傳化而津液不出故小便閉也瘡疹發熱大便欲潤若二三日不行宜急利之恐腸胃不通營衛不行瘡出轉密也惟瘡起發之後大便却宜堅實如能食而大便常行者不須忌之若過四五日不行則熱盛生濕其瘡難醫亦宜微利之設使大小便俱不通則邪毒內蓄二焦阻絕經曰一息不運則機絶窮故大小便不通者死凡瘡疹小便少者熱微導赤散加山梔仁熱甚八正散主之

如起發至收醫大便不行熱微者三黃丸甚則承氣湯主之

凡瘡疹小便欲其流而長大便欲其潤而實則邪氣不伏正氣不敗經曰小便數者大便必硬雖二三日不更衣無苦也如覺小水少則病增進蓋心主瘡而屬火心移熱於小腸小腸移熱於膀胱膀胱爲津液之府氣化則出氣爲火食不能傳化而津液不出故小便閉也瘡疹發熱大便欲潤若三日不行宜急利之恐腸胃不通營衛不行瘡出轉密也惟瘡起發之後大便却宜堅實如能食而大便常行者不須忌之若過四五日不行則熱盛生濕其瘡難醫亦宜微利之設使大小便俱不通則邪毒內蓄三焦阻絕經曰一息不運則機絶窮故大小便不通者死凡瘡疹小便少者熱微導赤散加山梔仁熱甚八正散主之

如起發至收醫大便不行者用膽導法不可遽用利之

藥但瘡乾黑陷大便祕煩躁者以百祥丸牛李膏主之如無此藥以承氣湯代之

### 咳嗽

肺主氣其變動爲咳嗽者肺證也瘡疹發熱之初便有咳嗽者肺爲五臟之華蓋瘡疹之火挾君相二火之熱上熏乎肺肺氣焦舉故氣逆而咳也瘡疹既出其咳更增者此喉嚨有瘡溼淫如瘻習習如梗故咳也瘡疹收後而咳者此衛氣虛弱腠理疏開風寒外襲肺氣逆而不收故亦咳也

如初發熱咳嗽甚者先以參蘇飲發之次以甘桔湯合鴉白散加牛蒡子治之

如瘡已出咳甚者甘桔湯加牛蒡子治之

如瘡光壯收營身熱咳甚者人參清膈散主之

如瘡已醫咳嗽者不問形寒飲冷所致並宜人參清膈散主之

如斑疹咳嗽身熱而渴者生地黃散主之

### 喘急

諸喘皆屬於火肺者藏之長也爲心華蓋心火炎上則肺焦葉舉氣逆不利而喘也有因風寒而喘者有

因傷食而喘者惟瘡疹之喘獨屬於火若加洩利腹脹煩躁則不可治

如初發熱便喘者前胡枳殼湯主之大便祕者可用服此不止以葶苈丸治之

如喘而大便自利者黃芩湯加五味子人參主之

如瘡正盛忽然喘急者此惡候也當詳審之如因傷食穀氣蒸而爲熱上乘於肺作喘者宜利之丁香脾積丸主之食去熱除喘自定也

如因感冒風寒而喘者麻黃湯主之  
如泄瀉內虛腹脹而喘者陳氏木香散主之利止喘定者生滑利不禁喘滿增盛者此氣脫候也  
如瘡內伏不出或已出復陷腹脹悶亂而喘者必死

### 自汗

自汗者不因發散而自然汗出也衛氣者衛護皮膚肥實腠理禁固津液使不得妄洩也瘡疹之火由裏達表干於衛氣皮膚爲之緩腠理爲之疎津液外洩故自汗也凡病自汗宜速止之瘡疹自汗實爲美證

乃陰陽氣和營衛通暢邪氣不留易出而解也又心主汗諸瘡皆屬於心自汗出者毒氣外洩也雖然熱之甚者亦爲汗解身復清涼此毒散也若汗出不止

其熱反劇此邪氣併於陽而陽虛宜斂汗固表清熱解毒使衛氣充實無瘡潰爛之患如瘡已收較痂皮脫落自汗者此氣虛也宜補陽救陰使氣無洩睡中汗出心有熱也其汗上至頭下至頸不過晝者乃六陽虛汗也不須治之上至頸下至瘡者此胃虛也

手足熱者胃熱也宜止之如汗出如油髮潤如洗喘不休者此爲肺絕之候

如汗大出不止壯熱者當歸六黃湯主之

如瘡收後汗出不止者十全大補湯主之若更不止

調敗蒲散同服外用溫粉撲法

胃熱手足自汗多者人參白虎湯加黃連主之  
氣爲陽血爲陰陽主動陰主靜人身之血不可妄動  
也經曰陽絡傷則血外溢血外溢則衄血陰絡傷則

血內溢血內溢則便血今瘡疹之火熏灼於裏迫血妄行血亦隨火而動陽絡傷則血從上焦出或溺血或嘔血陰絡傷則血從下焦出或溺血或便血陰陽俱傷則血上下出也諸失血惟從鼻出者或有內治元參地黃湯主之其餘皆死證也亦有痘瘡灌爛不能收較出血不止者此陽瘡出血亦不可治

### 煩躁

煩者擾擾而煩躁者憤躁之躁合而言之煩躁皆熱也析而分之煩陽也熱之輕者躁陰也熱之甚者難知集曰火入於肺煩也火入於腎躁也瘡疹煩躁須宜忌之若吐利厥逆腹脹喘促而煩躁者皆不知人譖妄狂擾而煩躁者謂之悶亂皆不治之證

如肺熱而煩者坐臥不安審如何時若初發熱便煩者此毒火內鬱人參白虎湯加梔子仁主之若瘡發見瘡煩者此毒伏於內未盡出也消毒飲奪命丹合而服之若瘡出盡又皆起發瘡煩者此內熱也牛黃清心丸主之

### 之

如腎熱而躁者必曾自利輕則陳氏木香散甚則陳氏異功散主之

如揚手擲足欲去衣被者此熱甚於裏也羌活湯主

之如神識昏迷反覆顛倒者此熱甚於裏也導赤散牛黃清心丸合而治之

吐利不食而煩躁者正氣虛也陳氏木香散主之

如六七日不大便腹滿而煩者內實有燥屎也輕則用三黃丸微利之甚則承氣湯下之

如晝日煩躁夜則安靜者此陽甚於晝至夜則陽氣

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongren.com

退而安靜也人參白虎湯加梔子仁主之  
如晝日安靜夜則煩躁者此陽陷入於陰夜則陰盛  
陰陽交爭故煩躁也四物湯加梔子仁主之

### 夾疹

疹一名麻子君火所爲也或曰脾爲疹經曰少陰所  
至爲瘡疹在人則心火主之夫心火亢甚則制已所  
勝焚灼肺金肺主皮毛故疹毒見於皮膚之間如蚊  
蚤所咬之狀痘瘡只出一般者善若與疹毒並出謂  
之夾疹其候極惡惟痘本稀疎而夾疹者庶乎可治  
痘本稠密與疹並出彼此相混瑣碎莫辨急用辛涼  
之藥發而解之如疹毒漸消痘本磊落者亦可治也  
疹痘相伴毒不少減此危惡之疾孰能料其生乎

如瘡收靨後復出疹者此餘毒解散之兆不須治之  
活人書云傷寒下之太早熱氣乘虛入胃發斑下之  
太遲熱留胃中發斑胃爛亦發斑者乃熱毒鬱遏  
煎熬陰血血得熱而不解浮於肌肉爲斑足陽明胃  
主之痘疹初出皮肉紅腫片片如錦紋者此夾斑也  
以辛涼之藥解之其斑漸退痘本堅實者吉否則皮  
膚斑爛瘡易癰癧所謂皮嫩易破者是也如赤斑成  
塊其肉浮腫結硬者又名丹癟其毒最酷瘡未成就  
此先潰爛工不能治

### 痘瘡

#### 夾斑

痘疔者熱毒蓄積氣血腐壞而成也狀有數種乃疫  
毒之氣最爲惡候宜謹察之有肌肉微腫狀如堆粟

痘疔者熱毒蓄積氣血腐壞而成也狀有數種乃疫  
毒之氣最爲惡候宜謹察之有肌肉微腫狀如堆粟

不分顆粒者此氣滯血凝毒氣鬱結也有初出紅點  
漸變黑色其硬如石者此肌肉已敗氣血中虛不能  
載毒而出反致陷伏也有中心黑陷四畔突起戴漿  
者此血隨毒走氣不爲用也有中心戴漿四畔乾陷

焦黑者此氣附毒出血不爲使也有頭戴白漿自破  
潰爛者此氣血不充皮膚敗壞也有爲水泡溶浴易  
破者此火濕並行氣虛不能斂束也有爲血泡色紫  
易破者此血熱妄行不能自附於氣也有瘡頭針孔  
漿水自出者此衛氣已敗其液外脫也此數證者於  
五六日間候之但見一證卽不可治

凡痘瘡起發之時但見乾燥其根焦黑者卽內服奪

命丹外用四聖散塗之

如原有瘡疥或灌瘡未愈或瘡將膿較癩嫩者至痘  
出之時其處痘本攢聚形色黑潰急以針刺破之吮  
去毒血外以四聖散塗之內服加味四聖散調無價  
散並奪命丹主之

如瘡焦黑渾身皆是者看大便何如若大便祕者內  
服承氣湯調無價散外用木楊湯浴法大便利者內  
服十全大補湯陳氏木香散調無價散合奪命丹外  
用木楊湯浴法

### 痘癩

痘癩者熱毒拂鬱氣血虛弱肌肉敗壞經云熱勝則  
肉腐者是也正理論曰脈浮而大浮爲風虛大爲氣  
強風氣相搏必成癩瘡身體爲癩瘡者名爲泄風久  
久爲大癩凡氣血充實者外無虛風內無強邪必無  
是病惟氣血虛者不能榮衛於身易感天地肅殺  
之氣皮肉之內虛風居之兼以痘疹疫癥惡氣擊搏

燔灼流散四布隨空而出所以瘡本稠密身無完膚  
癩瘡難任肌肉潰爛而痘癩成矣急用大補氣血清  
熱解毒之法庶可求全若待敗面墮鼻脣崩目盲肢  
體殘傷不致殞命亦爲廢人矣

凡瘡破成癩者用十全大補湯苦參丸合而服之外  
用滅癩救苦散塗之

### 癩瘡

訣云虛則癩實則痛此大概言之痘瘡之癩其候不  
同有方出而身癩者初見紅點遍身作癩此邪氣欲  
出皮膚閉密其火游移往來故癩也與傷寒太陽經  
病身癩者同論可發之使皮膚縱緩腠理開通邪氣  
得泄瘡出而癩去所謂火鬱則發之者是已有將收  
較而癩者其膿已成其瘡將回邪氣散而正氣復榮  
衛和暢故癩也與癩瘡將瘡而癩者同論不須服藥  
俱護之勿令擇招以致腫灌所謂美疢者是已有  
起壯泡漿而癩者當血已化水水未成膿之時其毒  
未化渾身癩瘡搔擾不寧此惡候也與傷寒陽明經  
病皮中如蟲行者同論所謂虛風外搏邪氣內強癩  
而不止爲泄風者是已此視瘡之乾濕以風藥佐之  
必令癩去方爲佳兆若癩甚不休瘡壞皮脫其毒復  
陷謂之癩瘡必不能治矣大抵出形而皮肉紅艷起  
如初出身癩者可發之桂枝葛根湯加製麻黃牛蒡  
子主之

如瘡乾而癩者宜養血潤燥以四物湯合消風化毒  
如瘡乾而癩者宜養血潤燥以四物湯合消風化毒

湯奪命丹主之外用茵陳熏法

如瘡濕而癢者宜養血去濕以四君子湯合消風化

毒湯奪命丹主之外用茵陳熏法

如瘡將收而作癢誤犯破損不肯乾較者用白龍散

貼敷如瘡癢潰爛粘衣被席難任者以十全大補湯加防

風合奪命丹主之外用敗草散

### 陷伏

伏者毒蓄於裏而不出也陷者毒出而復陷入也此皆惡候伏惟一證陷有數種伏候於見形之時其人瘡出熱不少減煩渴悶燥此皆伏毒未得盡出也陷則見形之後其血漸乾而變黑者謂之黑陷漿水未成破損瘡者謂之倒陷膿成復化爲水不肯結痂者謂之倒屬亦陷類也其瘡黑色皆謂之黑陷凡班疹黑色皆不治之以腎爲水其黑色乃腎之真臟色見也粗工不知變黑歸腎之理妄謂腎不可實欲瀉腎而使之虛不知人之一身大言陰與陽小言心與腎即方家所謂真水真火也瘡疹之火發於中賴此一點真水以制其亢苟欲瀉之則火無所制本先撥矣豈治之要哉然謂歸腎者以腎主骨骼又主閉藏也蓋瘡疹穢毒由骨骼而達於筋肉皮毛之間乃自內而外其毒得洩今既陷伏則自外而復入於骨骼謂之歸腎也又初出形之時春氣發生之令也出形而黑是春行冬令矣起壯之時夏氣長養之令也起發而黑是夏行冬令矣養榮之時秋氣成實之令也農乾而黑是秋行冬令矣故皆謂之逆結瘡之時冬氣閉藏之令也此腎之正候若不著瘀膿水浸潤此

各行春夏之令亦謂之逆惟知造化之機可以語歸

腎之說其色黑者火化也觀物之乾者其色黑出於

火者色亦黑豈可謂之水乎經曰火發而熏昧知此可以語黑陷矣

凡瘡伏而不出者雙解散主之

如倒陷者看其六腑何如大小便祕四順清涼飲合

奪命丹主之

泄利氣弱者十全大補湯合奪命丹主之外以胡荽酒水楊湯並用之

如將起發瘡亦有水但色黑黯者以十全大補湯調無價散主之或以快斑湯奪命丹合而用之

如倒屬者亦視其大便何如大便祕宜利之三黃丸四順清涼飲泄利者宜補之輕則十全大補湯甚則

陳氏木香散並外用敗草散主之

### 壅腫

瘡出盡應期起發頭面以漸浮腫者此毒火發越聚

經曰熱勝則腫大抵毒之盛者必腫毒微者不腫凡

瘡出盡應期起發頭面以漸浮腫者此毒火發越聚

於三陽之分欲作膿血故宜皮肉掀腫也設當起發

之時頭面不腫者必瘡本磊落毒氣輕淺雖爾作膿

根不占處所以不腫不須治之如瘡本模糊起發不

腫者此毒伏於內不卽發洩不可以毒輕論也如起

發腫大皮肉如常瘡尖而員粒粒分明者此佳兆也

若皮色鮮紅瘡本成串粘聚平塌者若瘡色灰白成

餅如錫面者若瘡焦紫無水者皆凶兆也有先起發

頭面預腫者此兼疫毒之氣名大頭瘡者是也腮領預腫者此名蝦蟆瘡也須兼疫氣而治多凶少吉大

腫不腫應消不消者謹隄防之

凡瘡腫脹面浮目閉者急與解毒護目救咽喉相兼

治之內用消毒化斑湯外用神應膏護目

凡瘡腫脹切防瘡瘍正面之中不可少有破損者苟

生瘡破沙崩之勢漸不可爲邪氣內傷真氣外洩腫

消而死矣但得破者復灌消者復灌飲食如常大小

便自調者變凶爲吉用十全大補湯苦參丸合而治

之如瘡色灰白面腫如錫餅者但看其人臟腑何如若

能食大便調小便長無他苦者多吉若不能食吐利併作或生瘡瘍者多凶

如頭面預腫或腮頰預腫者此時行疫毒也並用羌活救苦湯主之

### 潰爛

痘瘡所貴者堅實不破圓淨成痂也其有潰爛者火

勝也經曰熱勝則肉腐火之爲用猛虐峻暴近之則

燥癩不寧迫之則焦痛難忍灼之則糜爛成瘡故敗

物者莫如火也火生於空非虛不燃乘之以風其焰

益烈痘瘡潰爛由肌肉素虛邪風侵襲風者善行數

變行諸脈俞散於榮衛之間一旦毒發於裏風應於

表風火相扇肌肉墳填皮膚決裂而瘡壞矣如膿成

而潰則毒已化但粘衣漬席不能乾較古方以敗草

散主之誠良法也膿漬未成其毒未化癥破潰爛者

則衛氣暴洩津液不榮譬諸草木剝削其皮枯萎而

死矣經云根於中者命曰神機神去則機息根於外者命曰氣化氣止則化絕此之謂也

逆者四肢逆而不溫也厥者冷也又甚於逆四肢者諸陽之本常宜和緩如指頭微寒者陽氣衰也

陽氣起於十指之端

足心冷者陰氣盛也

陰脈集於足下而趨於足心

如瘡本焦黑煩渴煩悶喘促而厥逆者此陽毒內陷

熱氣逆伏手足爲之令所謂熱深厥亦深火極似水

者如瘡本灰白泄利而厥逆者此元氣虛憊陰陽不

相順接而手足爲之冷也瘡疹之候頭常欲涼足常

欲溫故頭溫足冷者不治厥逆乃瘡家惡證也

如因熱深而厥者大便不通三乙承氣湯主之瘡黑

如因泄利氣虛而厥者陳氏木香散異功散主之

但十指頭微寒者四君子湯理中湯並加桂主之

如瘡始出手足便冷者其人先有吐利四肢者皆稟

氣於胃脾胃氣虛弱不得至經理中湯加桂主之

寒戰咬牙

戰者森然若寒振振然動搖也咬牙者上下片牙相

磨而鳴也經曰諸風振掉皆屬肝木寒戰而振振搖

動風之象也火氣冲物亦然錢氏曰肝主風虛則咬

牙多欠又曰上竄咬牙心熱也然則寒戰咬牙心肝

二臟主之或以寒戰爲氣虛咬牙爲血虛或以咬牙

爲齒槁謂津液不足者皆不知此意痘瘡所惡者寒

戰咬牙或單見一證或二證並見若瘡已壞加之喘

促悶亂者死無日矣

如瘡初出寒戰者此邪氣將出外與正爭故振振搖

動火之象也瘡出乃定柴胡桂枝湯主之

如瘡本稠密掀發腫痛經脈動搖時時振動者不可謂之寒戰待膿成痛去而解

有筋惕肉瞤者經絡之血爲瘡所耗不能榮養肌肉

主持筋脉故惕惕然而手足自跳躍然而膚肉自

動也不可謂之寒戰但養其氣血十全大補湯主之

咬牙呵欠者肝熱也肝屬木臨官於寅寅爲相火火

盜木之氣故肝熱證形焉陽引而上陰引而下則開

而欠也陽上極而下陰下極而上則合而噦也十全

大補湯主之

上竄咬牙者心熱也諸瘡皆屬心火上竄者火炎上

之象也咬牙者火氣動搖之象也導赤散加酒炒黃

連牛蒡子主之

如瘡本潰爛寒戰咬牙者此手少陰心火也經曰熱

勝則肉腐寒戰咬牙火氣動搖之象也

如寒戰咬牙併作者則少陰專主之觀其瘡本

如瘡本焦黑寒戰咬牙者此足少陰腎水也腎色黑

爲主鬱封藏之本乾黑者真臟色見也腎氣寒在變

動爲慄寒戰者腎本病也腎主骨牙爲骨之餘寒戰

則鼓領而兩牙相軋咬牙者腎寒所發也此二證者

言曰瘡已出而聲不變者形病也瘡未出而聲變者

氣病也瘡出而聲不出者形氣俱病也其候有三要

須識得

有心火刑肺而失音者肺屬金主聲中有二十四空

凡發諸語言者皆其空中之氣鼓動也五行金空則

鳴實則啞瘡瘍之火起於心上熏於肺肺氣脹鬱故竅塞而無聲也以導赤散合甘桔湯加炒牛蒡子主之或加天花粉蘇葉主之

有心虛而語聲低小不出者叔和心臟歌云聲言來

氣清蓋心主血痘瘡稠密其瘡都要貫串得到血爲

虧損故也血去舍空故聲不揚以導赤散加人參麥門冬石菖蒲主之

有毒歸腎而失聲者經曰足之少陰上繫於舌絡於

橫骨終於會厭會厭者音聲之戶也舌者音聲之機

也橫骨者神氣所使主發舌者也瘡黑陷伏則毒入

腎邪氣上客於厭則厭不能發發不能開合不利

故猝啞也

有喉舌潰爛而失聲者咽喉者所以司呼吸納飲食

發音聲猶管籥也毒火上熏咽喉先受貢門會厭舌

腭之位皆瘡所聚初出之時失於調治以致咽喉腫

塞管籥窄狹古本強硬呼吸不能飲食不入音聲不

出矣此上二證治之則難

呻水吐食

難經云會厭爲喉門胃爲貢門病痘之人毒火上熏

於肺灼於胃肺與胃之上口皆有瘡而傷矣水入則

喰者貢門傷則水不得入溢入會厭會厭掩而不納

故氣逆噴出而喰也食入則吐者貢門傷則門戶隘

塞食物不能直奔於胃緩則汨汨而下急則阻而吐

出矣此其惡候鮮有生者其或舌上有瘡爛破如蜂

窠之狀舌痛強硬不能爲用延納水穀亦使水入則

嘔食入則吐待舌瘡平則安矣

論曰輕者頭面稀少用胡荽酒洗不欲噴頭面以諸陽之會在於頭心之華在於面痘爲陽毒而心主之故痘瘡頭面稠密者重頭面預腫者凶頭面瘡破爛腥臭者凶故占瘡之輕重吉凶莫如頭面也

人之一身內則心爲君主外則頭爲元首病有真心痛真頭痛以見不可輕犯也經曰頭者精明之府頭傾視深精神棄矣故占人之生死者亦莫如頭凡瘡初出從他處先見漸登於頭起發收醫皆然他處皆有瘡而頭獨稀此佳兆也若於頭額之間先出先戴漿先乾收先破損其瘡稠密無縫肉下浮腫皮上濺起粗膚者皆凶惟瘡遍身俱收而頭上不收或熟自破或膿出結聚堆積者不須怪蓋天地之化孤陽不生孤陰不長陽變陰合彼此相成頭者諸陽之會無陰相濟所以難收也又病閉目搖頭者死此陽脈不治謂之心絕也

經曰十二經脉三百六十五絡其氣血皆上走於面而走空竅又肝開竅於目肺開竅於鼻脾開竅於口心腎開竅於耳又修真家云面有七竅內應乎心又相術但觀人之面以知福禍可見面不可敗也凡瘡稠密七竅閉塞敗面者凶以臟腑經絡之氣皆病也又諸陽皆聚於面痘爲陽毒初出之時必先於面然面有部位其候不同額屬心離火之位火性急烈不可輕犯凡瘡出現泡漿乾收先從額上起者凶左頰屬肝震木之位右頰屬肺兌金之位二處不論先後但瘡欲磊落堅厚若模糊成塊浮嫩易破潰爛灌腫者凶蓋肝藏魄肺藏魄肝肺俱取魄魄以離故凡病痘兩腮冷或木硬者死頰屬腎坎水之位此處先出

先壯先盛者吉蓋瘡疹出於腎則吉入於腎則凶也鼻屬脾坤土之位亦不論先後但不欲模糊早乾收也若未成漿鼻頭先乾黃者凶此脾土將敗真臟色見也

人中爲陰陽之分故南村輟耕錄以秦卦象之人而上分爲三部人中而下亦分爲三部髮際之上陽之上也兩眉之間陽之中也山根之下陽之下也自口至兩乳間陰之上也自心蔽骨至陰毛際陰之中也自陰而下陰之下也凡瘡之出現起發收屬自人中而分上下循序陰陽和暢雖多且密亦可言吉若或舛錯雖是稀少亦可言凶此有伏也

發熱之時面色明瑩者吉面赤若塗硃者重此邪氣拂鬱於陽明及胃與大腸也陽明之經上循於面故面赤也宜以清涼解毒之藥少通利之面垢慘黯者凶瘡疹之火發自少陽面垢者少陽候見也針經云少陽病甚則面微塵宜表裏雙解蓋少陽從中治也驗耳目鼻

經曰腎通竅於耳耳者腎之外候也腎之爲臟水臟也天一生水受氣之初先生兩腎而一陰藏焉又有相火存乎命門之中瘡疹發熱耳獨涼者瘡疹爲火腎不受邪存水之主以制陽光也如耳反熱則水不勝火將有歸腎之變痘疹之候先觀耳後有紅縷者水竭皆死候也

經曰肺通竅於鼻瘡疹發熱之初噴嚏者火邪上干蓋手少陽三焦之脈從膻中上出缺盆繫耳後直上出耳角紅者火色也此瘡疹之火發自少陽自見於其經也凡瘡自耳先出未及成漿耳輪先醫者漸萌

不欲開者痘也目中汪汪若水者疹也諸瘡皆發於心故候見於目也目赤者熱甚也心惡熱急解之經曰肝通竅於目瘡疹發熱目連劄者肝有風也風人之睛爲絡氣之精爲白睛肉之精爲鉤束裏擴痘瘡之毒發於五臟六腑毒之甚者眼必受之古人留護眼之法其意深矣凡瘡出太甚兩眼常出淚者肝熱也此時眼中無瘡但內服瀉肝火之藥蓋眼中之痘常在收腎不齊之後有之如瘡入目成瘡翳者切不可用點藥損睛破瞳成廢人矣痘瘡收後目不可開者肝熱則目澀不敢開明暗皆然心熱見明則合暗處則開謂之羞明此有餘熱在心肝也如瘡未成膿腫去目閉者瘡已過期收醫不齊目閉不開者瘡壞欲變目上竄者心絕也直視不轉者腎絕也非泣而泪自出者肝絕也微瞑者氣脫也血貫瞳子者火勝

經曰肺通竅於鼻瘡疹發熱之初噴嚏者火邪上干於肺外應於鼻而癢則嚏鼻乾黑燥者火刑於金體本燥得火反甚急宜清金瀉火以解其毒鼻衄者血得熱而妄行故衄出於鼻急與涼血瀉火以解其毒鼻流清涕者疹也疹發於心心肺相連以火鍊金熱極而反化爲水也瘡出之後鼻塞不通者熱也火歸腎之勢矣

南京中医药大学图书馆版权所用

主膿瘍已成漿收醫之時鼻塞不得息者此鼻內有瘡涕粘結可用金銀小簪子以通之如瘡未成漿鼻端先乾者凶經曰藏真高於肺以行榮衛陰陽也邪火刑肺敗不能輸精於皮毛故皮毛焦枯先見於鼻榮衛不行陰陽不續以漸遍身皆乾枯而死矣凡瘡變壞鼻中血出者涕自流出者鼻孔開張喘急者肺絕之候皆死證也

#### 驗脣口牙齒

脾之竅通於口其華在唇四白脉訣云應唇通口氣痘瘡初發熱口中氣和脣色紅潤者吉如口燥脣裂其毒必甚急解之瘡出稠密脣口瘡子相粘諸瘡未發此瘡先已戴漿諸瘡未收此瘡先已焦黑者凶面瘡腫灌脣上瘡裂成塊乾濺者重如瘡出太密口中臭氣者臟腑敗壞故臭出於口也瘡欲變壞脣上縮者脾絕也脣下自呻者魚口也口中涎如膠粘者脾津竭也皆不可治疹家脣口生瘡聲啞者狐惑證也不急治之殺人

上片牙隸於坤土乃足陽明胃脈之貢絡也下片牙隸於乾金乃手陽明大腸脈之貢絡也瘡疹發熱之初口開前板齒燥者裏熱也宜以清涼之劑微解之咬牙者牙乃骨之餘腎主骨寒顫咬牙毒歸於腎必死如發熱咬牙者有久則爲肝熱有上竄則爲心熱此欲作搐也瘡已收屬牙齦潰爛者此內瘡未得平復也勿作走馬瘡治之疹後牙齦潰爛血出肉黑氣臭者此乃是走馬瘡也

#### 驗喉舌

咽者胃之系主內而不出所以司飲食也喉者肺之

系主出而不內所以司呼吸也人之咽喉乃緊要橐籥門戶也經曰一陰一陽結謂之喉痹一陰者手少陰君火心主之脈氣也一陽者手少陽相火三焦之脈氣也二脉並絡於喉瘡疹之毒君相二火主之其火上蒸咽喉最爲先受故發熱與出形之初必問其咽喉痛與不痛先與發散解利之令毒得出不留連於咽喉間也若不知此義以解利於先則咽喉腫塞飲食不入呼吸不能死在旦夕矣如瘡出太甚審察咽喉若內無瘡又不痛者此毒已盡出不須慮之如內多瘡又加痛苦者切防收屬之時脣水吐食失聲之變如病益甚喉中氣響汨汨如水聲者死

舌者心之候脉訣曰外應舌將榮又脾之脈絡於舌舌之在人延納飲食主持聲音其用亦大矣瘡疹發熱其舌紅潤者吉舌燥如芒刺者裏熱甚也急解之針經曰熱病口乾舌黑者死吐舌者脾有熱也脾臟微熱則舌絡微緊時時舒舌勿用冷藥及下之或飲水者醫疑爲熱而下之誤也飲水者脾胃虛津液少故耳瘡出之後舌上稠密如堆粟破如蜂窠者危更加飲水則喰食物則噦聲啞不出者必死之證瘡出太甚弄舌者凶

#### 驗頸項

經曰東風生於春病在肝俞在頸項頸項者生氣之本也又曰天氣通於肺地氣通於嗌天食人以五味者氣之所由也故喉主天氣地食人以五味咽者氣之所由也故咽主地氣頸項者咽喉之管束也又三陽之脉自頸而上三陰之脉自頸而還頸項者陰陽之道路也痘疹之候頸項欲疎若纏項而出稠密

太甚者謂之鎖項廢其管束阻其道路上不得降下不得升內者不出外者不入經曰出入廢則神機化減升降息則氣力孤危此死之徵也凡病深項軟者死骨敗也不治

#### 驗胃腹

經曰凡刺胃腹者必避五臟胃腹者臟腑之郛也又曰鬲肓之上中有父母蓋言心肺也故痘瘡輕者胃前無胃腹出太甚者必重也其中於臟各有期日凡病深喘急胃骨扇動者肺焦脹也左乳下動脈突出者宗脈絕也皆不可治瘡疹腹痛者毒未盡也更宜詳審

#### 驗手足

四肢者諸陽之本瘡出欲疎其發欲透其膿欲齊如應出不出應發不發應收不收此脾胃氣虛不能旁達四肢也發熱手尋衣領亂捻物者肝熱也手掐眉目鼻口者肺熱也手足搗撓者心肝風火相搏也各隨其臟而瀉之足涼者此常候也瘡疹腎不受邪腎主足故足宜涼手足冷者脾臟怯也四肢皆裏氣於胃而不得至經必因於脾乃得稟也脾怯不能爲胃行其津液故冷耳宜溫之瘡已出現手足多水泡者此肝勝脾衰爲鬼賊宜急治之不久便生瘡瘍也如遍身皆發手足不透是空殼者此脾胃虛弱津液耗竭榮衛凝滯故其毒亦鬱而不發也不能食者死能食必發癰疽瘡勢太甚手足冷者不治瘡未成漿手足皮脫者必死瘡已正臍惟足不收者足爲純陰無陽相濟所以收遲玉函經云孤陽寡陰即不中譬諸鰥夫及寡婦如瘡始成漿他處未收手足心先臍者

**其後必生怪疾也**瘡臍之後手足關節腫痛者必發癰也瘡癰手足搔亂者凶

驥  
卷四

人之常也瘡疹發熱便昏睡者心主熱脾主困心受氣於脾故發熱昏睡此常候也起臥不時者內有熱也必多陷伏之變合面臥者裏熱也大抵瘡疹始終安寢者吉蓋氣血強盛榮衛流行邪氣出於表而不  
在裏則神安神安則志定是以得安寢也若氣血衰弱榮衛滯澀邪在於裏而熱心惡熱則神不安神不  
安則志不寧是以煩悶悶亂譖妄而不得眠也亦有  
毒伏於中神喪氣脫僵臥如尸呼之不應飲食不知  
者不可以嗜臥論乃死證也

經曰人以水穀爲本故人絕水穀則死仲景曰水入於經其血乃成穀入於胃脈道乃行可見水穀之悍氣爲衛精氣爲榮水去則榮敗穀消則衛亡矣凡瘡能食者雖重亦吉不能食者雖輕亦危也然有不能食而生能食而死者何也蓋不能飲食者臟腑內實大便不行有平日之穀氣以爲之主瘡成之後自消穀氣而思食矣其能飲食者邪氣殺穀卽叔和所謂口乾饑飲水多食亦饑虛者是也將不久而變生焉惟疹家多不能食以口中不和不思食也

夫治痘者必先視其人之勇怯文審其邪之盛衰又參以時之寒燠逐日加深臨時消息而施方治自無不效世俗治痘者偏執首尾不可汗下之說喜補而

治瘡要略

疫攻取溫而舍涼不知形之盛衰邪之表裏時之寒燠而妄施治習以成俗莫之救正也久矣經曰諸痛癢瘡皆屬心火又曰少陽所至爲瘍疹則痘爲火毒昭昭矣苟皮膚閉密應出不出非用汗劑以微發之則瘡子何以得出耶火鬱則發之是汗劑亦可用也毒伏於裏焚灼腸胃六臟閉結大小便不通非用洩劑以微利之則毒氣何以得解耶是下劑亦可用也

壞證不治

治痘之法常須識毒有雖病近而奪之勿使滋蔓致成壞病也病至於壞治之無及如發熱吐利並作者此毒火內攻令其上下得出也勿驟止之瘡出而吐利不止宜急止之恐其內虛毒伏而不出也自此以後吐利不止者壞病也發熱驚妄者內熱也急止之瘡出之後反加譖妄者壞病也發熱腹痛者毒也急攻之攻之不止其瘡乍見乍隱者壞病也瘡出模糊者急攻之顆粒不成但加虛腫者壞病也瘡出皮紅者急解之紅齷不退瘡皮嫩薄者壞病也瘡出焦黑者毒深也急攻之紅潤不回反見乾沒者壞病也瘡出帶水者肝病也急解之若生瘡癰者壞病也瘡癰破損急治之破者不灌空中無痘壞病也瘡敗成瘻急救之痴皮不結深潰出血者壞病也頭面預腫毒也急解之其腫忽消者壞病也又如喘急而悶

調護保愛常恐有雜證以介乎其間人之血氣只有此許苟添一證則虧一分虧一分則於痘上增一分病矣謂之雜證者不過內外傷而已故天地之氣感則害人皮毛謂之外傷外傷則表病表病則或出不快或發不透或醫不齊是因外傷而貽患於瘡也須從外傷之證攻之但發散中兼救表解毒之藥水穀之氣感則傷人腸胃謂之內傷內傷則裏病裏病則或吐或利或腹痛或喘滿以致爲伏爲陷是因內傷而貽患於瘡也須從內傷之證攻之但消導中兼補中托裏之法亦有不因內外傷而生異證者此則毒之所爲專從痘證論之亦須急治勿使毒氣滋蔓以成大戾也

亂不寧者肺絕也直視搖頭心絕也泄利水穀不化  
脾絕也手足搐搦肝絕也溲便遺矢腎絕也寒顫咬  
牙手足厥冷咽啞失聲皆壞病也

飲食所禁

經曰飲食自倍腸胃乃傷言平人也病痘之人腸胃  
先困飲食可不謹歟故五味之入各有所宜各有所  
禁如芳草之氣美酒氣盛而慄慄肥者令人內熱甘  
者令人中滿魚者使人熱中食毒負毒者其毒必發  
乘氣伏氣者其氣必靈以至偏熱偏寒動風動火一  
切辛酸炙燭油膩之物不知禁口若食之則腸胃  
僅存冲和之氣不但爲之傷而乖戾之渣滓又能助  
毒爲虐矣所可食者糜粥淡菜間以獐猪精肉飼之  
使腸胃常實血氣常充以助痘之成就仍無太飽無  
太饑熱無灼灼寒無滄滄以致傷脾胃也吾見痘中  
喜飲酒者多日疾喜飲甘者多齒疾喜酸鹹者多喘  
咳之疾貽禍終身詩曰爽口物多終致疾邵子豈欺  
我哉

起發不透

痘瘡所喜者起發成漿斯無留毒也瘡出疎者亦易  
起發瘡若稠密則難起發矣然應起發而不起發者  
氣虛也應作膿而不作膿者血虛也會未起發作膿  
一向空虛者謂之伏將欲起發作膿而忽平塌者謂  
之陷身起發手足獨遲者脾胃不足也起發將半  
不能充頂者元氣素弱也此皆留毒於內日後必有  
餘毒也惟背瘡平塌不須責之

收醫不齊

痘瘡膿成之後應結痂而不結痂者氣虛也蓋氣主

外虛則不能約束皮毛收斂津液也或因內實便祕  
不能成痂者或因內虛便洩不能成痂者或因飲水  
太過濕傷脾胃不能成痂者或因蓋覆不謹冲冒寒  
熱不能成痂者或尋招反覆潰爛不能成痂者其  
候各不同也惟頭足收斂獨後此常證也蓋天地之  
化生於陽者成於陰生於陰者成於陽頭爲諸陽之  
會自額以上陽之陽也陰氣不達於諸陰者集於足  
自膝而下陰之陰也陽氣不盛所以收遲如遍身收  
屬不齊不能成痂者此倒屬也日後必有餘毒手足  
不能成痂彼此串連成泡此膿已化毒已解外泡未  
破內膚已生用針破之無妨也間有不能收較反增  
潰爛膿水不乾者此疳蝕瘡也久而不愈必成陷瘡  
爛見筋骨而死如正面灌爛膿血痂皮結成一片焦  
裂濺起者能食則吉不能食則凶

差後餘證

痘後餘毒

痘瘡已屬其痂不脫此脾胃弱也其人少食血氣不  
充不能填滿肌肉滋益皮毛令痂不得脫也如痂已  
落發熱作渴者陰陽俱虛也蓋陽虛則外熱陰虛則  
內熱由瘡出太甚氣耗血虧津液枯涸故熱而渴也  
微熱不可妄治甚者以補藥求痊亦不可多用涼藥  
也痘瘡差後臟腑未實血氣未平瘡瘍未老肌肉尚  
嫩腠理尚疏風寒易感若出風太早或因澡洗則風  
寒乘虛而入爲寒熱爲喘嗽爲腫於補藥中微發之  
可也如內傷飲食腸胃新虛不勝水穀氣留薄則  
成內傷或飽悶或煩躁或吐或利或腹中痛於補藥  
中消導之可也戒勿因循釀成壞病此大虛之後不  
任病者也

明癮難開

如毒留於心則爲驚搐癲癇爲斑瘡爲諸血證

再攻

如毒留於肝則爲目病或目腫痛或數晝內障或羞

明

如毒留於肺則爲癰瘍出於手足骨節之間

如毒留於腎則爲喘爲咳

如毒留於腸胃則爲利膿血

如毒留於腎則爲敗瘡而死

如毒留於肺則爲喘爲咳

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

醫部彙考四百六十八

痘疹門十

萬氏家傳

**萬氏家傳痘疹心法** 治痘歌括引 治痘總歌  
熱證治歌括 發熱時辨生死訣 出見證治  
歌括 出痘時辨生死訣 起發證治歌括  
起發辨生死訣

藝術典第四百八十八卷

醫書彙考四百六十八

明萬氏家傳痘疹心法

治痘歌括引

治痘節要諸家

治痘節要諸家論之已詳大抵臨病應變因時制宜其用歸于使人正氣不損邪氣得釋而已後世不知古人制方一以中和爲貴曲學偏見滯于一

隅喜行溫補者既昧乎解毒之巧專用涼瀉者又

失其中和之旨妄投湯餌僥倖成功設遇脈證乖

當時勢差異惟束手待斃而已況虛虛實實令人

六指半之絲然立，其間若予因此懼乃竟轉往哲

庶臨病之工閑而取之一繫詳審審料的施治以文

十全之功幸無得魚而忘筌也

治痘總歌括

**痘疹原因**胎毒成發生須是待天行如逢疫癟將行候須解湯丸最可憑

痘疹之病皆由父母胎毒蓄于命門之中命門者右腎相火也爲人身生化之本故毒藏焉如遇冬令溫和陽氣暴洩人則感之觸動相火至春夏生長之時其毒乃發傳染相似是謂天行疫癘也未出痘疹者但覺冬溫或天時不正猶邑痘瘡盛發卽當預防宜服解毒之藥如辰砂散消毒保嬰丹代天宣化丸皆可用也頻頻與之使痘疹之毒輕減自然易出易收無陷伏鬱遏留連之患其辰砂散消毒保嬰丹代天宣化丸以解時行疫癘之毒則可或因父母精血不足者或其人素有他疾者或發熱之時別臟形證發見者並宜兼而治之不可徒使解毒而竟忘其本也如脾胃素弱者宜以養脾爲重解毒次之養脾丸服三之二解毒三之一如因父母奉養過厚精血蓄毒多胎病者宜一二毒并解以遯源解毒湯代天宣化丸相間服之不病先知是上工能言輕重吉和凶不離氣色分清寒熱腑精微阿堵中

色心火尅肺金宜瀉肺中之火邪瀉白散加黃芩  
山梔仁天花粉桔梗主之如黑氣色見者此腎之  
真臟色見水尅火爲賊邪不治  
預知瘡疹吉凶機氣色都於面部推年上山根尤緊  
要紅光可喜黯青疑

心火尅肺金宜瀉肺中之火邪瀉白散加黃芩  
真職色見水冠火爲賊邪不治  
預知瘡疹吉凶機氣色都於面部推年上山根尤緊  
安紅光可喜黯青疑

五臟皆屬於面左頰爲肝右頰爲肺額上爲心頸  
下爲腎鼻爲脾又目爲肝之竅鼻爲肺之竅口爲  
脾之竅耳爲腎之竅舌爲心之苗若未出瘡疹之  
先面部諸位明潤者吉暗燥者凶又相書分山根  
爲命宮年上管疾厄若一宮黃紅光晶者吉青黑  
昏暗者凶故二處尤緊要也凡大行痘疹之時傳  
染流布男女大小有未出痘疹者視其形色情性  
可以預言輕重吉凶也此吾家傳祕訣賢於命十  
遠矣蓋五臟精華皆見於面而臟獨氣盛者色亦  
應之故肝氣盛者色青心氣盛者色赤脾氣盛者  
色黃肺氣盛者色白腎氣盛者色黑但欲明潤不  
欲枯槁吉凶之兆於此決矣一觀其色紅白明潤者  
與平日同無改變者吉如紅赤而太嬌晃白而無  
采頓然改變異於平時者凶又如額有青紋目有  
赤脉口有黑氣耳有塵痕者大凶之兆也二觀其  
形精神爽暢動止便利言語清亮者無病也吉如  
精神衰弱動止遲畱言語低微異如平時者凶又  
笑語無情聰慧太早肉浮骨軟者凶之兆也三觀  
元脚細不能任身目無精采或精露神啼聲斷續  
其情性未發熱時忽生喜心若與父母愛戀不忍心  
舍者及聞見怪異言語妄誕者凶之兆也

發散爲陽收斂陰始終一氣自流形試觀春夏多蕃秀纔到秋冬少發榮

譽論痘疹之證乃人身中一陽之氣始於發生終於收斂流行遞變以致於盡辟諸草木春生夏長秋實冬藏皆此一陽之氣自爲始終者也故治痘者先要識得此氣其來不可禦其序不可紊盡其裁成輔相之道以左右民然後謂之良醫也所謂

道者明於陰陽和於術數也蓋天食人以五氣寒熱溫涼平也地食人以五味辛甘酸苦鹹也天有陰陽故溫熱爲陽而寒涼爲陰地有陰陽故辛甘爲陽而酸苦鹹爲陰一物之中亦有陰陽故氣薄者陽中之陽厚者陽中之陰味薄者陰中之陽厚者陰中之陰清陽升浮發腠理而實四肢濁陰降沉走五臟而歸六腑所謂明於陰陽者此也至於立方之旨如辛甘發散爲陽則用辛涼甘寒之劑味雖陽而氣則陰也酸苦瀉洩爲陰則用酸熱苦

溫之劑味雖陰而氣則陽也氣味相和陰陽相濟必使陽毒之氣順其流行之勢而不失其遞變之之醫症者辛甘溫熱之羣聚偏於陽而不知濟之以陰酸苦溫涼之合同偏於陰而不知濟之以陽使痘毒之氣有春無秋有冬無夏是皆昧於陰陽之理不知術數之奧以天人命醫云乎哉

首尾汗下爲不宜尋常執著豈通醫若分虛實能權變可奪乾坤造化機  
可汗下之言設遇外感寒邪腠理閉密者其出不

快其發不透與辛甘發散之劑寧無壅遏之患乎又如大小便祕結者不與苦寒洩利之劑寧無脹滿煩躁乎但察其虛實與時權變可汗即汗可

下卽下中病則已勿過其制然後謂之通醫

痘瘡無病勿服藥實實虛虛不可錯幾多在瞽昧經文壁上安鼠翻成惡

痘瘡一科自始至終如無病者不可服藥古人云無病服藥如壁中安鼠誠確論也蓋治病之工只有補瀉一法果虛則補之可也若元氣素厚穀氣數強者而復補之則有實實之變果實而瀉之也可若元氣素薄穀氣素弱者而復瀉之則有虛虛之變如此之類豈不爲壁中安鼠者乎今之業醫者但思醫不用藥何以爲功而取利也不論虛實妄投藥餌幸而中病則大言以彰其功一有誤焉則掩飾其過而推托於命矣

痘瘡傷寒疑似間古人分證可相參莫將汗劑先輕試發散惟令表裏安

宜預解肝之毒羌活湯加青皮柴胡肺證毒多者必增喘咳渴不止手抬肩目鼻面竝預解肺之毒瀉白散合桔梗湯加牛蒡子天花粉心證毒多者必伏不起謂妄飲水煩哭咬牙宜預解心之毒瘍吐利宜預保養脾胃以解其毒四君子湯調元湯加白芍藥防風連蘿蔴不見平證耳孰俱熱者死候也痘瘡主治解表和中解毒三法也解表兼發散之義使邪氣盡出於外不使留伏於中如防風白芷荆芥穗升麻葛根柴胡桂枝之屬和中專主脾胃兼助血氣使裏氣常實血氣不虧助養痘瘡以待其成不致癰瘍倒陷如黃芪人參白芍藥當歸木香陳皮之屬解毒瀉火涼血清氣使毒邪有制不爲正害如山豆根大力子紫草連蘿蔴黃連梔子之屬

痘瘡發熱疑似時傷寒傷食莫辨之試將解法真良劑入口能令解却疑

痘瘡發熱與傷寒相似但傷寒只見一經形證若之藥服之若是痘證則痘子卽出不是痘證則熱退而解矣如證似傷寒者面赤柴葛敗毒散主之證似傷食者面黃香薷敗毒散主之

始終清便自調佳便溺阻難事可嗟腹脹喘煩多壅渴急施疏導解留邪

痘瘡始終要小便長而清大便疎而潤謂之裏氣和若有阻滯卽毒邪留伏於裏腸胃壅遏不得運化但見少有阻滯須微利之小便滯者導赤散五苓散連翹湯大便鞭二三日不更衣者柴胡飲子

凡瘡疹五臟見證要察何臟之證爲甚卽主其臟之毒多如肝證毒多者必發水疱生瘡并成目疾首尾不可汗下古人必有所爲而發今徒拘執不可汗下之言設遇外感寒邪腠理閉密者其出不

良膽導法大小便俱不通者八正散得利即止如  
遠巡隱忍不能早治以致腹脹喘氣煩躁者治無

及矣宜大利之二乙承氣湯此救急之劑

瘡瘍爲陽待熱成微微發熱始和平假如大熱身猶

火解毒常教小便清

瘡瘍屬陽非熱不能成就故治不可盡除其熱但

微發熱不渴大小便自調此肌表瘡本之熱非裏

熱也謂之表裏無邪不可妄治若身熱如火瘡勢

稠密其毒必盛宜解毒兼利小便連翹升麻湯連

翹湯主之始終能食最爲良平日其人脾胃強食少却防中氣

弱淹留引日變瘡瘍

瘡瘍始終以脾胃爲主故人能飲食者氣血充實

自然易壯易醫食少者起發收屬不能快易治痘

之工於食少者必須詳審若平日能食今因痘出

而食頓減或咽痛飢欲食而不能宜解利咽喉甘

桔湯加牛蒡子或咽痛或咽不痛不飢不欲食又

看大便何如大便軟此賴平日穀氣以爲主雖數

日不便無妨不可妄補以增內熱亦不可妄解毒

以損脾胃大便一日一行則內之穀氣有限而氣

血益衰須用和中四君子湯加炙黃芪木香青皮

香散異功散此二藥太峻非內虛瀉甚不可輕用

也若向能食一旦食減不咽痛但腹中滿或痛此

必傷食以養脾丸木香大安丸消導之甚則以丁

香脾積丸原物湯下以微利之復食以四君子湯

合勻氣散或養脾丸調養之

最宜安靜號和平表裏無邪志自寧忽然煩擾互詳

審外怕神亡轉悶昏

痘瘡以安靜爲貴飲食坐臥如常此表裏無邪號

曰和平忽然煩擾不安多哭宜審視瘡勢形色如

瘡起發光壯不渴大小便調此瘡正發毒邪散佈

氣血彌急而痛謂之痛煩不須施治待膿成毒化

痛止而煩去矣如瘡正色間之不痛但覺心煩不

安此內熱也心惡熱謂之熱煩以導赤散加梔子

仁麥門冬或以牛黃清心丸燈心湯下如瘡紅紫

乾燥壯熱口渴狂亂昏悶譫語如見鬼狀者退火

回生丹如瘡瘍痒此欲陷也瘡乍見乍隱此有伏

也目閉言妄謂之神喪不治

瘡塌方將倒陷時急憑妙劑強扶持空中痘出無番

次損去多膿功可施

痘瘡喜厚實堅牢尖圓飽滿若頂平皮薄色淡忽

然癟瘡損塌者此肺胃肌肉虛欲變倒陷也宜

十全大補湯加防風荆芥穗服之外用茵陳熏法

如痘空中原無痘處復出大小不一等作三四番

若痒不止皮脫瘡乾或利或大便祕悶亂者此已

陷也不可再治

凡痘疹內者不出謂之伏外者復入謂之陷陷伏

之證有實有虛如大熱渴大小便不通煩躁譫語

妄有見聞狂亂腹脹者此實也實者邪氣壅遏侵  
蝕正氣宜內服百祥丸牛李膏或宣風散東變百  
祥丸外用水楊湯浴之得利瘡出者佳更以宣聖  
散加味四聖散並加燒人尿調之如因吐瀉不正

渴喜飲水腹脹手足冷或寒顫咬牙者此虛也虛  
者正氣虛弱不能制伏邪氣令得反覆互內服狀

斑湯合勻氣散奪命丹甚則陳氏木香散勻功散

外用水楊湯浴之泄止瘡出者佳更以十全大補

湯加燒人尿調之此上二證並用神應奪命丹如

法施治瘡不出反加煩躁昏不知人者死證也太

抵看痘之法其出欲盡出不盡者伏也其發欲透

發不透反平塌者倒陷也其收欲淨膿潰皮破收

不乾淨者倒醫也陷伏之證謂之逆證非衝擊猛

峻之劑安能成起死回生之功哉輕者奪命丹甚

者神應奪命丹如倒盤之證氣實者解毒內托散

氣虛者調元湯加白芷桂防風當歸主之服藥之

後有三驗法原瘡先平後腫以成膿者一驗也原

瘡已乾別於空中復出一層起發養膿但如正痘

收斂者二驗也不腫不出只變自利下膿血者三

驗也有此三驗者吉無者凶

四時分治候須明暑濕風寒不可輕異氣莫教相觸

犯致令翻變亂其真

瘡發熱之時其初發表解肌四時各有主方春

用羌活湯夏用五苓散秋用參蘇飲冬用五積散

四時通用人參敗毒散又如春肝旺風木主事調

養之法宜四物湯加防風黃芩木香青皮羌活以  
折風木之勝又以四君子湯加白芍藥桂心以補



肉腰痛加獨活北細辛頭疼加羌活藁本蔓荆子  
驚搐加木通生地黃燈心小便少加木通車前子

瞿麥大便祕加大黃䗪血加山梔仁元參生地黃  
發熱三四日熱甚不減加解毒藥大力子連翹紫  
草桔梗瘡不出加防風蟬蛻荆芥穗紅花子眼痛  
加密蒙花柴胡龍膽草瘡出後太稠密加人參當  
歸木香紫草大力子防風桔梗咽痛加桔梗連翹  
瘡乾或帶紫或赤者血熱也加當歸梢生地  
黃紅花地骨皮牡丹皮瘡灰白色平陷者氣虛也

加人參黃芪防風木香官桂手足瘡不起脾胃不足  
也加防風官桂人參黃芪瘡太密起發不透又渴者  
此津液不足加人參麥冬天花粉泄瀉者裏虛也  
加人參白朮訶子白茯苓瘡不著瘍者濕熱也加  
防風黃芪官桂白朮

解表升麻湯最良紅斑雖見有何妨時師膠柱無通  
變纔見紅斑不敢嘗

古人謂但見紅點便不可服升麻葛根湯恐發  
表虛也此蓋爲痘疎毒少者言後人不達立言之  
旨遂謂凡出痘子纔見紅點真不可服殊不知升

麻葛根湯四味乃發表解毒疏通血氣升降陰陽  
之劑痘出太密正宜常服以解之令陷者升之燥  
者潤之鬱者疏之過者平之陰精不衰而陽毒不亢  
也苟謂痘疎毒少者雖他藥不可服況葛根湯

痘疹未形先發熱吉凶輕重何如別熱微毒少吉堪  
言熱甚毒多凶可決

痘疹熱氣甚者其毒必多痘出自密宜連翹升麻  
此冷痛也理中湯加桂心或因多食而痛者此食

湯或如聖湯解毒快斑湯並合代天宣化丸主之

或有熱微痘出反密者其人必口燥渴脣焦裂小  
便赤少大便祕身雖不大熱卻蒸蒸然此毒深熱  
亦深故表不大熱而裏熱也宜急解之柴胡飲子

或有熱甚痘出反疎者其人必不渴脣潤目無赤  
脉大小便調身雖大熱但熇熇然此毒淺熱亦淺  
故表熱裏氣和也只以升麻葛根湯

發熱大渴熱在中舌燥脣焦毒氣攻莫比尋常些小  
渴養陰解毒有神功

此心經出痘證也痘疹發熱有小渴者但與陳廩  
米作湯飲之若大渴臨乾脣焦舌燥此心火炎上

腎水不升毒火妄蒸血枯液耗宜急解之葛根解  
毒湯大劑飲之不止更加黃連以瀉心火之有餘

黃蘖知母以滋腎水之不足舌潤則生舌如芒刺  
則死蓋舌乃心之苗少陰之脉榮於舌也如發熱  
自利而渴者此津液不足也黃芩散加人參白朮  
麥門冬主之

熱時腹痛陣難禁臤腑之中毒氣侵發散疏通如痛  
減切防陷伏變非輕

此脾經出痘證也訣云發熱肚中痛斑瘡腹內攻  
火莫待流殃却痛嗟

此腎與膀胱二經出痘證也痘瘡初發熱便腰痛  
其後多不可治之證蓋由膀胱傳入於腎乃陷於  
至陰之下而不得升伏於骨髓之中而不能出故  
瘡疹歸腎者死但覺腰痛便急發散令毒化解復  
出於太陽而行順道也人參敗毒散或五苓散加  
獨活細辛主之

腰痛雖云大不祥女輕男重更消詳未婚可許真元  
固已娶堪憂相火狂

經曰腰者腎之府也乃人身之樞紐諸骨之根柢

痘疹腰痛最爲大忌陽道常饒陰道常乏故男重

心風火相爭多不足

此肝經出痘證也以導赤散加辰砂末與瀉青丸  
合而治之如再不止小便利者可治以導赤散送

牛黃清心丸或紅粉丸小便不利者勿治其有  
不作搐只多叫哭者肝熱也目必直視瀉青丸

積痛也微則木香大安丸甚則承氣湯丁香脾積  
丸原物湯下已上俱可下者若脾胃素弱之人不  
可與下反傷脾胃宜補中益氣湯主之原無腹痛  
皮或化毒湯主之如瘡乍出乍隱此伏也七物升  
麻丸瘡出盡者再以神應奪命丹大發之瘡不出  
者勿治

發熱腰痛最可訝膀胱傳腎變凶邪急宜解散陰中  
火莫待流殃却痛嗟

此腎與膀胱二經出痘證也痘瘡初發熱便腰痛  
其後多不可治之證蓋由膀胱傳入於腎乃陷於  
至陰之下而不得升伏於骨髓之中而不能出故  
瘡疹歸腎者死但覺腰痛便急發散令毒化解復  
出於太陽而行順道也人參敗毒散或五苓散加  
獨活細辛主之

腰痛雖云大不祥女輕男重更消詳未婚可許真元  
固已娶堪憂相火狂