

傳信適用方下
衛濟寶書

當歸草堂醫學叢書二



傳信適用方卷四

治婦人衆疾

治婦人經寒月閉湛濁無時血滯四肢時或結痛

宮久冷諸虛不足並宜服此益血溫補調經養氣思

進飲食大效琥珀散

王推川傳

琥珀

半兩不見火

南木香

半兩紙裏煨熟

血竭

半兩不見火

延胡索

半兩

川當歸

一兩

川芎

半兩不見火

肉桂

半兩不見火

赤芍藥

半兩

荊芥穗

半兩

枳殼

一兩溫湯浸去瓢麥麩炒黃色

生地黃

二兩用生薑一

兩切同炒黃乾



右爲細末每二錢用麝香紅花酒調下空心日午
各一服

治婦人偏頭痛香附子炒去毛末之每服二三錢建
茶調下

露華湯治婦人赤白帶下神妙

乾蓮房

隔年者良

右爲細末每服二錢以麝香米飲下空心食前日
三服不數日見效去麝卽不效切勿減去

治孕婦風秘大便不通

川當歸酒

浸

枳殼

去瓢炒

甘草

炙以上各一兩



川芎半兩

右件爲末每服二錢水一大盞煎至七分去滓空心午食前服忌動風物如未通加少防風通即不用

治產難等方

慶育集所論及集驗方所載甚詳可參用之

一滑胎榆白皮爲末每服一錢空心白湯調下自入月每日三服令易產兒生下藥皆塗身上

一催生並死胎不下草麻子三個巴豆四個研細入麝香少許貼臍心上須臾間便下

一難產方黃蜀葵子二十一粒細研熱酒調下或只

以蜀葵花爲末每服二錢熱湯放溫調下併進三服亦佳

一難產三兩日不生以蠶種紙半張燒灰熟水調下

係已出蠶種紙
亦名馬明月

一治橫生逆生炙產婦右腳小指尖頭如麥大三壯

立產

又方蛇退皮燒灰酒調二錢面東服

又方鹽塗兒足底急去之

又車前子末酒調服二錢

一妊娠煩悶胎熱臥睡不得并腹中痛及難產知母

新白者焙乾爲末煉蜜圓如小彈子大每服一圓溫酒調下

一妊娠偶因所觸或墜高傷打致胎動不安腹中痛不可忍者縮砂不以多少和皮炒令熟透去皮爲細末每服二錢熱酒調下胎卽安神效

一胎動日夜叫呼口噤唇青及下痢不止者熟艾一兩酒五盞煮四盞去滓再煎至二盞服口閉者灌之亦治腰痛下血

一胎動及下血心腹脹者當歸二兩川芎一兩爲麤末水四盞酒五盞煎至五盞分三服若胎未死卽安

已死卽便下

一產後血暈五靈脂炒令烟盡爲細末溫酒調下

錢童子小便尤佳

又方乾荷葉爲細末每服一錢溫酒調下

又方生半夏爲末一大豆許吹鼻中

又方紅花或蘇枋木酒水濃煮汁飲

一產後中風眼上視四肢搐搦荆芥穗爲末每服二

錢溫酒調下如不飲酒只濃煎湯服

治婦人產後發狂每用大香附子去鬚皮淨爲細末

每用二錢入研極細真辰砂末一錢以燒通紅秤硃



浸好酒調藥服之神妙

催生靈符治一切產難橫逆於端午日以露水或雨

飛好朱砂至誠書龍字勿令筆畫連接每臨產時卽

旋圓一字以溫水吞下隨男左女右持符出是驗然

須直候腰作陣痛上草欲產時方服不可太早

甲子庚申

日亦可書

治產婦渴疾神效

杜仲文傳

縮砂皮不拘多少煎湯百沸候通口飲之不過

一盞渴疾自止

芎藭湯治婦人產後血迷血暈及失血過多虛懸瞤

問

當歸

切洗
焙乾

川芎

各等
分

右爲麤末或剉如麻豆尤佳每服五錢水二盞慢火煎至一盞去滓溫服如熱悶冷喫亦得若婦人胎產危惡用半兩作一劑以水二盞酒一盞慢火煎至一盞半溫服一切不順自然安適

治產後惡心

白朮

一分

生薑

減半

右並咬咀水一盞煎至七分溫服神效

治婦人癰癰痛甚無比散

右用蛇蛻皮燒灰一錢炒甘草末半錢同和煖酒下如破用生油調塗

治小兒衆疾

烏蛇圓治小兒慢驚風

徐成和
需傳

烏蛇

一兩酒
浸一宿

天漿子

三十個
去殼

天麻

半兩

乾蝎

一分

天南星

半兩
炮

白附子

半兩

川附子

一兩
炮

防風

半兩

半夏

半兩洗
七次用

以上并酒浸七日焙乾爲細末入後藥

牛黃

朱砂

麝香

雄黃

以上各
一錢

右並研膩以糯粥圓如黃米大每服十圓不計時
候煎荊芥湯下以風搖止爲度

治小兒因驚中風角弓反張及慢脾風追風散

舊本
椿老

傳三
方

全蝎

一個

母丁香

二個

瓜蒂

七枚

赤小豆

四十粒

右爲細末小大加減一字許米飲調灌之吐出風

涎方可治然後服後藥

天麻圓

天麻

一錢

白附子

一錢

大附子

炮去皮
臍一錢

赤腳蜈蚣

錢一

白花蛇項肉

錢一

羌活

錢一

麻黃

半兩槌碎水煎
去滓熬成膏

右爲末以麻黃膏搜爲圓如梧桐子大每服一圓

薄荷湯酒磨化嚙下立愈

治小兒急慢驚風

天南星

個一

全蝎

個一

右爲末用父母津唾調膏稀稠得所塗顙上看顙
大小塗之移時驚住不須塗之若未住再塗之

治慢驚風

附子

炮去皮
尖臍

右用半箇切片用生薑三片丁香五粒水一盞半煎半盞灌之令睡醒來安樂神妙急切無丁香亦可

人參膏治小兒泄瀉煩渴嘔逆

但季良傳

人參

雨一

白朮

雨半

丁香

雨半

藿香

雨半

白扁豆

分一

右爲細末蜜圓如棗豆或麥粒大量兒大小以生

薑湯下五七圓至十圓

益中湯治小兒嘔吐泄痢

丁香

雨半

草果子

三枚去皮炒去

人參

雨半



青皮

兩半

訶黎勒

分一

桂心

分一

右爲細末每服半錢或一錢米飲調下

益胃湯治小兒胃虛身熱嘔吐不止

丁香

人參

桂心

阿膠

右各等分爲細末每服一錢水六分蓋生薑二片

同煎至四分溫服

人參豆蔻散治小兒霍亂煩渴

藿香葉

兩一

肉豆蔻

兩一

甘草

分一

白扁豆

兩半

人參

兩半



右爲細末每服一錢水六分入生薑二片煎至四分溫服

治小兒驚瀉不止

蝎稍

七箇

胡椒

四十粒

右爲細末每服半錢荊芥湯調下

三和散治小兒吐利津液燥少

茯苓

一錢

烏梅肉

半錢

木瓜

半錢

右爲細末每服半錢水半盞煎至三分溫服

肥兒圓治小兒五疳入痢陰陽氣不順虛痞腹脹嘔逆腹痛瀉痢消化乳癖積聚肥肌退面黃瘦殺虫安



胃蟲進飲食此藥應有小兒疳病累服藥未效者不

問虛實便與數服卽安

荆南候
醫專

檳榔

用麪劑裏煨
熟去麪剉焙

陳皮

洗去
白

青皮

洗去
白

胡黃連

宣連

去鬚剉
碎微炒

白蕪荑

炒去
扇

史君子

煨去
皮

肉豆蔻

如檳榔
法煨

人參

去
蘆

夜明砂

微
炒

赤芍藥

龍膽草

洗淨
剉炒

右十二味各等分爲末薄麪糊爲圓如蘿蔔子大

每服三五十圓用紫蘇木瓜湯下瀉痢米飲下不

計時候日二三服

傳信遺方
姑熟李氏小兒保生要方三卷其論議治療之法甚
詳審兼有錢氏所未及言者予家常用之無不取效
今摭其間論證及八方附見於此
常用朱砂膏安神鎮驚心去痰退熱

人參

茯神

防風

山藥

甘草

黃耆

蜜炙

麥門冬

去心

以上各半兩

朱砂

六錢研

麝香

半字

右爲細末研勻煉蜜圓如櫻桃大金箔爲衣每服
半粒或一粒薄荷湯化下不拘時