

痘疹萃精卷三



痘疹萃精卷之四

儲巖雷天棟鳴盛輯

痘中雜證

頭痛

連翹 防風 荆芥 牛子 當歸 黃芩 蟬蛻 車前子 柴胡 滑石 炒梔 赤芍 淮木通 甘草 荆芥 牛子 防風 升麻 葛根 桔梗 川芎 山查 前胡 黃連 黃芩 柴胡 蟬蛻 連翹 木通 甘草

經曰頭者精明之府又曰春氣病者在頭可見頭乃人

真元會聚發生之本也痘疹頭痛乃邪氣與真氣相

搏壅遏毒氣而成凡毒熱上騰與風熱鬱閉皆為害

如頭面痘出稠密身體壯熱悶亂昏痛者乃毒火上

騰也宜用大連翹飲若頭面痘出稀疎微覺身熱頭

連翹 防風 荆芥 牛子 當歸
黃芩 蟬蛻 車前 柴胡 滑石
炒梔 赤芍 甘草 淮木通

荆芥 升麻 牛子 葛根
川芎 蒼朮 前胡 黃連
平蠟 蛇 連翹 木通 甘草

補中益氣湯

炙甘草 升麻 白芍 生地 川芎

四物湯 升麻 柴胡 白芍 川芎

白芍 生地 川芎

升麻 柴胡 白芍 川芎

痛者乃風熱鬱閉也宜用清解散又有傷食頭痛胸

滿嘔酸惡食矢氣升發劑中加消導之品至氣虛頭

痛者惡勞動其脈大宜用補中益氣湯加白芍川芎

血虛頭痛者善驚惕其脈芤宜用四物湯加薄荷

腹痛腹脹

枳殼散大便秘燥熱生脹者此方主之。枳殼生地紫草生軍水煎。四至散小便赤胃熱生脹者用此方。熱甚痘色紫加黃芩黃連紅花倍加紫草主之。大便秘加枳殼。紫草 黃芩 甘草 木通

痘疹腹痛者由毒鬱於三陰臍以上屬太陰當臍屬少

陰小腹屬厥陰須分別之腹脹者毒聚於腸胃也治

法俱當升發解利痘毒兼分利小水使毒氣上下分

消則痛與脹自止故曰痛隨利減脹以利消若但以

厚樸行滯氣非其治矣亦有乳食停滯腹脹者當審

其寒熱於升發解利劑中量加消滯各味如有數日

不大便者通利而痛脹自止未可驟施硝黃也

一痘瘡停食腹痛與毒氣腹痛不同停食痛者其痛多

急而啼叫必甚多在臍上面青唇淡手足或冷毒氣

痛者其痛微緩時作時止多在臍下或連腰俱痛或

面紅唇紫手足不冷宜分別治之停食作痛為裏鬱

用平胃散加山查神麩麥芽香附毒熱鬱於陰分作

痛者為陰鬱用桂枝大黃湯風寒鬱結痘出不快而

平胃散

蒼朮 厚朴 陳皮 甘草 神麩

桂枝大黃湯

香附 麥芽

大黃 桂枝 白芍 甘草

防風 升麻 川芎 陳皮

貫厚朴 桔梗 甘草

食生冷腹痛者理中湯加

皮砂仁主之

中湯

白木 甘草 乾姜

感冒氣作痛者升麻葛根湯

施蟬蛻羌活主之

麻葛根 白芍 甘草

作痛者乃表邪所鬱也用芍藥防風湯

張景岳曰腹痛當以可按拒按宜饑宜飽參脈審證辨

其虛實寒熱不得謂痛無補法概行消伐妄用寒涼

也大都熱鬱者間有寒滯者更多若虛不知補寒因

寒用為害不小腹脹之證有因毒陷而作者亦有氣

虛而作者亦不得謂脹以利消盡用寒涼攻毒也實

因毒陷作脹惟宜和解或兼托散勿混施攻伐矣

六味地黃丸

腰痛

大懷地 山萸肉 二錢 懷山藥 三錢 杜澤瀉 一錢五分 白芍 一錢五分 丹皮 一錢五分 荆芥 牛子 赤芍 木通 青皮 山查 生地 天黃 羌活 元參 歸尾 穿山甲

凡痘發熱而腰痛者最為惡候蓋腰為腎之府也毒火

羌活當歸湯身背痛者主之

羌活 獨活 當歸 卷芩 柴胡

防風 丹皮 川芎 黃柏

桃仁 紅花 此活血清熱

散之方邪在肌肉間宜用之

亢極真陰不能勝邪初熱作痛先服人參敗毒散

服五苓散加獨活主之若便結煩渴體實內熱盛者

須用歸宗湯加羌活元參歸尾穿山甲速瀉其毒不

使傳於腎經或可慶生至有目睛多白因稟賦腎虛

相火內爍而腰痛者宜連服地黃湯壯水以制火故

凡小兒平素面白目睛多白行遲語遲者必須預為

滋補腎氣以培先天庶患痘時免致毒歸於腎此薛

氏心法也

人參

川芎 羌活 獨活 柴胡 前胡 枳殼 桔梗 茯苓 甘草 猪苓 茯苓 澤瀉 肉桂 蘇合

生軍 荆芥 青皮 山查 木通 赤芍 牛子 生地 羌活 元參 歸尾 川山甲

煩躁

連翹 紫茸 升麻 牛子 甘草 葛根 人參 黃芪 炙草 白芍 麥冬 杏仁

當歸 生地 紫茸 丹皮 紅花 連翹 黃連 白芷 桔梗 甘草 白芍 生地 人參 麥冬 炒梔

用清毒飲如蟬蛻燒人糞王之
草各等下 木煎此全用清解
未發越而熱甚者用之極地
連番 甘草 牙麻 葛根
通赤枝

煩者擾擾而煩躁者憤躁之躁合而言之煩躁皆熱也
分而辨之煩陽也熱之輕者躁陰也熱之甚者故曰
火入於肺則煩火入於腎則躁又曰煩向心生躁從
腎發痘證始終以安靜為吉但有煩躁必生他變皆
因毒火太盛神不能靜也痘未出而煩躁是為表鬱
用六味消毒飲加生地黃連赤芍痘已出而煩躁是
為血熱用涼血解毒湯若養漿時頂平清稀而煩躁
是氣虛也用保元湯加當歸白芍麥冬棗仁收靨後
而煩躁是血虛也用四物湯去川芎加人參麥冬炒

人參 知母 石羔 甘草 糯米

炒梔

生地 木通 甘草 炒梔 麥冬

羌活 川芎 防風 胆草 炒梔

當歸 甘草 薄荷葉 淡竹葉

生地 木通 甘草

當歸 白芍 生軍 甘草

當歸 蘇合草 桂 黃連 生軍 芒

甘草

梔此其大要也。更宜兼參後條則變通多方矣。

一煩躁兼喘者。火毒在肺也。宜人參白虎湯。加炒梔。煩

躁多驚者。火在心經也。宜導赤散。加炒梔。麥冬。或七

味安神丸。煩躁氣悶者。心肝火鬱也。以服蠻煎。加川

貝母主之。
歸身 黃連 麥冬 雲苓 甘草 煨礞石 龍腦 下產
生地 麥冬 白芍 石菖蒲 石斛 茯神 枳殼 陳皮 麩 粉丹皮 知母 木通 小川貝

一煩躁手揚足擲。欲去衣被者。熱在表也。羌活湯主之。

若神識昏迷。反覆顛倒者。此熱盛於裏也。導赤散。牛

黃清心丸。兼用之。或服牛黃八寶丹。尤佳。至大便秘

結而煩躁腹脹者。四順清涼飲。或當歸丸主之。甚則

山查 生地 牛子

枳实 厚朴

枳 參 知母 石蜜 糯米 甘草

歸 熟地 芎藭 炙草 熟枣仁

芍 人參

歸宗湯或承氣湯攻之若陷伏煩躁二便不通者惟百祥丸可以拯治也

一晝則煩躁夜則安靜此陽邪盛於陽分也宜人參白虎湯加炒枳如晝則安靜夜則煩躁此陰中之陽虛也宜三陰煎如有火邪亦加炒枳若晝夜煩躁兼吐利厥逆喘促譫妄昏不知人者謂之悶亂乃棄證也

譫妄

生地 木通 甘草 牛黃 芩 兼用之 口 當歸 白芍 大黃 甘草 黃連 黃芩 大黃 川朴 枳實 生軍 生軍 荆芥 赤芍 牛子 木通 生地 青皮 山查 歸身 黃連 麥冬 云苓 甘草 殊砂 龍腦

譫多言也妄虛妄也譫妄者妄有聞見而語言無倫也皆邪氣熾盛正氣虛弱神識不清所致也夫言為心

黃連 黃芩 大黃 三黃丸
生軍 枳實 厚朴

聲心熱則多言睡中呢喃者熱之微也寤而語言差
謬熱則甚矣如發熱時譫語者此毒邪犯心心爲熱
冒其神浮越導赤散牛黃清心丸兼用之或服牛黃
八寶丹尤佳亦有胃熱而多譫語內有燥屎三五日
不更衣者宜滌腸解毒輕則四順清涼飲或三黃丸
甚則歸宗湯或承氣湯酌用之自起發至成漿收釐
時忽然神昏譫語者此由瘡本稠密精血外耗不能
養神宜清火養血七味安神丸主之若妄見妄聞妄
言如見鬼狀目無精光昏不知人乃神志俱喪軀殼

徒存不過引日而已。

厥逆

人參 肉桂 白木 茯苓 半夏 木香 煨丁香 肉豆蔻 炙草 訶子 肉桂
人參 白木 乾姜 炙甘草 附子 薑連 黃芩 黃柏 大黃 梔子 厚朴 枳實 人黃。

痘見厥逆證有因氣血虛寒發厥者有因毒熱鬱閉發

厥者如爪甲色白吐瀉不食小水清利痘色更見厥

白此外陽衰內陰盛乃寒厥也宜用加減陳氏木香

散寒甚者理中湯加附子若爪甲色紅煩躁不安小

便赤澀痘色更見焦紫此陽毒內攻熱極反寒乃熱

厥也宜用梔子金花湯主之裏實者承氣湯攻之

一痘起脹灌漿時手足厥逆此陽氣欲脫也必嘔吐自

利脈見沉細微弱或浮大而虛速宜溫補元陽輕則
六氣煎加肉桂甚則六味回陽飲服藥後四肢轉溫

方可有救

人參 炙草 肉桂 白朮 當歸 炙芪 加肉桂
人參 熟附子 炮姜 炙草 熟地 歸身

一痘後厥逆者因氣血大虛脾胃已困也宜保元湯或
六氣煎六物煎加桂附之類治以溫補庶可望生倘

妄用清解立戕嬰命矣

人參 黃芪 炙草
熟地 當歸 炙草 川芎 白芍 人參

作痛

升麻 葛根 白芍 甘草 羌活 蠅蛭 生查肉
當歸 白芍 川芎 生地 連翹 丹皮 荆芥 防風 牛子 紅花

經曰諸痛為實又曰熱盛則痛皆緣痘瘡毒火未能盡
解故不時作痛也痘初出而痛因毒未透發宜用升

羌活當歸湯
羌活 當歸 桂枝 芍藥 川芎 黃柏
紅花

麻葛根湯加羌活蟬蛻生查肉痘出稠密而痛乃毒

盛血瘀所致也宜用四物湯加連翹丹皮荆芥防風

牛子紅花或因感冒風寒作痛者宜用升麻葛根湯

加紫蘇防風羌活生查肉有身背皆痛者羌活當歸

湯主之收靨痛甚又兼悶亂治之不愈者凶
升麻葛根湯加紫蘇防風羌活生查肉

張景岳曰痘瘡作痛有實有虛雖曰諸痛為實然亦未

可執也彼身有壯熱便秘煩渴氣粗喘脹而痛者此

實痛也若熱微脾倦二便清利衛氣弗充營血失養

而痛者此虛痛也實者宜清虛者宜補不可差也

發癢

升麻 葛根 白芍 甘草 荆芥 防風 薄荷 桑葉 人參 茯苓 梔子 枳實 芍藥 黃芩 知母 地骨皮 丹皮 升麻 牛子 甘草 人參 茯苓 梔子 枳實 芍藥 黃芩 知母 地骨皮 丹皮 升麻 牛子 甘草

經曰諸癢為虛又曰火微則癢此固大要而證每多因

如痘方出而身癢者此因邪氣欲出腠理嚴密其火

流溢往來故不時作癢宜用升麻葛根湯加荆芥防

風淡豆豉灌漿時有因便滑少食漿清平塌作癢者

此脾胃弱氣血虛也以十全大補湯主之有因穢氣

觸厭而暴癢者外燒荆芥紅棗細茶薰解之內服內

托散送毒外出以免內陷或有因感風寒而發癢者

內服祛風兼養血之藥外照上方薰解有因瘡乾而

發癢者宜養血潤燥用四物湯加生者丹皮升麻牛
子甘草如因瘡溼而癢者宜補脾除溼用四君子湯
加荆芥防風生者苡仁牛子至於將斂而作癢者此
膿成毒化營衛和暢不藥有喜矣

一養漿時悶亂靡寧搔癢難禁瘡壞皮脫其毒復陷謂
之癢塌證屬多凶大抵出形而皮肉紅豔起發而皮
嫩多水者後必多成癢塌投藥不可涼散宜用保元
湯倍生者加白芍兼赤白何首烏癢急欲搔用青松
毛拂之抓破流水敗草散苦蕎粉松花粉皆可擦勿

用燒牛糞至瘡覺微癢欲人撫摩精神却爽不見煩躁此常候也

人參 黃芪 甘草 白芍 赤白首烏

一頭面為諸陽之會若癢而抓破則泄氣最速宜六氣煎或十全大補湯加荆芥防風何首烏之類但得復腫復灌而飲食如常方保無虞矣

人參 炙芪 肉桂 白朮 當歸 炙草

寒戰咬牙

羌活 川芎 防風 胆草 炒梔 當歸 甘草 薄荷葉

生地 川芎 赤芍 荆芥 防風 連翹 牛子 紅花 丹皮

寒戰咬牙者森森若寒振振搖動上下牙尖相磨而鳴也初熱時寒戰咬牙者因毒火留於經絡邪正相爭欲出不出所致也宜清熱透表以羌活湯主之如見

點後痘色紫赤大便秘小便澀煩躁口渴者此屬實
 熱是胃熱則咬牙肺熱則寒戰宜用加味四物湯若
 灌膿時漿清便滑身涼不渴者氣虛則寒戰用保元
 湯加丁香而溫陽血虛則咬牙加芎歸以益陰二證
 並見乃氣血兩虛宜用參歸鹿茸湯
人參 黃芪 炙草
 人參 當歸 鹿茸 酒 黃芪 參茸糯米
 葉天士曰方書以六日前寒戰屬肺熱六日後寒戰屬
 氣虛六日前咬牙屬胃熱六日後咬牙屬血虛自成

定論

一痘瘡稠密轉動間身體振搖此因瘡多所困勿作寒