


影印傷寒論

趙開美刻本



傷寒論卷第四

漢 張仲景述 晉 王叔和撰次

宋 林億校正

明 趙開美校刻

沈 琳全校

辨太陽病脉證并治下第七

合三十九法方三十首并見太

陽少陽合病法

結胃項強如柔瘕狀下則和宜大陷胃丸第一

六味前後有結胃藏結病六證

太陽病心中懊懔陽氣內陷心下鞭大陷胃湯

主之第二

傷寒六七日。結胸熱實。脉沈緊。心下痛。大陷胸

湯主之。第三。用前第二方

傷寒十餘日。熱結在裏。往來寒熱者。與大柴胡

湯。第四。七味水結附

太陽病。重發汗。復下之。不大便五六日。舌燥而

渴。潮熱。從心下至少腹滿痛不可近者。大陷胸

湯主之。第五。用前第二方

小結胸病。正在心下。按之痛。脉浮滑者。小陷胸

湯主之。第六。三味。下有太陽病二證。

病在陽。應以汗解。反以水瀝。熱不得去。益煩不
渴。服文蛤散。不差。與五苓散。寒實結胃。無熱證
者。與三物小陷胃湯。白散亦可服。第七。文蛤散
苓散五味。小陷胃湯用
前第六方。白散三味。

太陽少陽併病。頭痛眩冒。心下痞者。刺肺俞。肝
俞。不可發汗。發汗則譫語。譫語不止。當刺期門。
第八。

婦人中風。經水適來。熱除脉遲。脅下滿。譫語。當
刺期門。第九。

婦人中風。七八日。寒熱。經水適斷。血結如瘕。伏。

小柴胡湯主之第十

婦人傷寒。經水適來。讖語。無犯胃氣。及上二焦。自愈。第十一。

傷寒六七日。發熱微惡寒。支節疼。微嘔。心下支結。柴胡桂枝湯主之。第十二。

九味

傷寒五六日。已發汗復下之。胃脅滿。小便不利。渴而不嘔。頭汗出。往來寒熱。心煩。柴胡桂枝乾薑湯主之。第十三。

七味

傷寒五六日。頭汗出。微惡寒。手足冷。心下滿。不欲食。大便鞕。脉細者。為陽微結。非少陰也。可與

小柴胡湯第十四

用前第十方

傷寒五六日。嘔而發熱。以他藥下之。柴胡證仍在。可與柴胡湯。蒸蒸而振。却發熱汗出解。心滿痛者。為結胸。但滿而不痛。為痞。宜半夏瀉心湯。

第十五

七味。下有太陽併病。并氣痞二證。

太陽中風。下利嘔逆。表解乃可攻之。十棗湯主

之第十六

三味。下有太陽一證。

心下痞。按之濡者。大黃黃連瀉心湯主之。第十

七

二味

心下痞。而復惡寒。汗出者。附子瀉心湯主之。第

十八 四味

心下痞。與瀉心湯。不解者。五苓散主之。第十九。

用前第七證方

傷寒汗解後。胃中不和。心下痞。生薑瀉心湯主之。第二十。八味。

傷寒中風。反下之。心下痞。醫復下之。痞益甚。其

草瀉心湯主之。第二十一。六味。

傷寒服藥利不止。心下痞。與理中。利益甚。宜赤

石脂禹餘糧湯。第二十二。二味。下有痞一證。

傷寒發汗若吐下。心下痞。噫不除者。旋復代赭

湯主之。第二十三。

七味

下後不可更行桂枝湯。汗出而喘。無大熱者。可

與麻黃杏子甘草石膏湯。第二十四。

四味

太陽病。外未除。數下之。遂協熱而利。桂枝人參

湯主之。第二十五。

五味

傷寒大下後。復發汗。心下痞惡寒者。不可攻痞。

先解表。表解乃可攻痞。解表宜桂枝湯。攻痞宜

大黃黃連瀉心湯。第二十六。

瀉心湯用前第十七方

傷寒發熱。汗出不解。心中痞。嘔吐下利者。大柴

胡湯主之。第二十七。

用前第四方

病如桂枝證。頭不痛。項不强。寸脉浮。胃中痞。氣

上衝不得息。當吐之。宜瓜蒂散。第二十八。三味。下有

不可與瓜
蒂散證。

病脅下素有痞。連臍。痛引少腹者。此名藏結。第

二十九。

傷寒。若吐下後不解。熱結在裏。惡風大渴。白虎

加人參湯主之。第三十。

五味。下有不
可與白虎證。

傷寒無大熱。口燥渴。背微寒者。白虎加人參湯

主之。第三十一。

用前
方。

傷寒脉浮。發熱無汗。表未解。不可與白虎湯。渴

者。白虎加人參湯主之。第三十二。

用前第三十方

太陽少陽併病。心下鞕。頸項強而眩者。刺大椎肺俞。肝俞。慎勿下之。第三十三。

太陽少陽合病。自下利。黃芩湯。若嘔。黃芩加半

夏生薑湯主之。第三十四。

黃芩湯四味。加半夏生薑湯六味。

傷寒。胃中有熱。胃中有邪氣。腹中痛。欲嘔者。黃

連湯主之。第三十五。

七味

傷寒八九日。風濕相搏。身疼煩。不能轉側。不嘔

不渴。脉浮虛而澁者。桂枝附子湯主之。大便鞕。

一云。臍下更。小便自利者。去桂加白朮湯主之。第

三十六湯並五味。

風濕相搏。骨節疼煩。掣痛不得屈伸。汗出短氣。小便不利。惡風。或身微腫者。甘草附子湯主之。

第三十七。四味

傷寒脉浮滑。此表有熱。裏有寒。白虎湯主之。第

三十八。四味

傷寒脉結代。心動悸。灸甘草湯主之。第三十九。

九味

問曰。病有結胷。有藏結。其狀何如。荅曰。按之痛。寸脉浮。關脉沈。名曰結胷也。

何謂藏結。荅曰。如結胃狀。飲食如故。時時下利。寸脉浮。關脉小細沈緊。名曰藏結。舌上白胎滑者。難治。

藏結無陽證。不往来寒熱。一云寒而不熱。其人反靜。舌上胎滑者。不可攻也。

病發於陽。而反下之。熱入。因作結胃。病發於陰。而反下之。一作汗出。因作痞也。所以成結胃者。以下之太早故也。結胃者。項亦強。如柔痙狀。下之則和。宜大陷胃丸方一。

大黃半斤

葶藶子半升

芒消半升

杏仁尖熬黑。

右四味。擣篩二味。內杏仁芒消。合研如脂。和散。取如彈丸一枚。別擣甘遂末一錢七。白蜜二合。水二升。煮取一升。溫頓服之。一宿乃下。如不下更服。取下為效。禁如藥法。

結胸證。其脉浮大者。不可下。下之則死。

結胸證悉具。煩躁者亦死。

太陽病。脉浮而動數。浮則為風。數則為熱。動則為痛。數則為虛。頭痛發熱。微盜汗出。而反惡寒者。表未解也。醫反下之。動數變遲。膈內拒痛。一云。頭眩。胃

中空虛。客氣動膈。短氣躁煩。心中懊懣。陽氣內陷。心下因鞭。則為結胃。大陷胃湯主之。若不結胃。但頭汗出。餘處無汗。劑頸而還。小便不利。身必發黃。大陷胃湯方二。

大黃

六兩
去皮

芒消

一升

甘遂

一錢
七

右三味。以水六升。先煮大黃取二升。去滓。內芒消。煮一兩沸。內甘遂末。溫服一升。得快利止後服。

傷寒六七日。結胃熱實。脉沈而緊。心下痛。按之石鞭者。大陷胃湯主之。三。用前第二方

傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱者與大柴胡湯。但結胃無大熱者。此為水結在胃脅也。但頭微汗出者。大陷胃湯主之。四。用前第二方。

大柴胡湯方

柴胡 半斤

枳實 四枚

生薑 五兩

黃芩 三兩

芍藥 三兩

半夏 半升

大棗 十二枚

右七味。以水一斗二升。煮取六升。去滓再煎。溫服一升。日三服。一方加大黃二兩。若不加。恐不名大柴胡湯。

太陽病重發汗而復下之不大便五六日。舌上燥而渴。日晡所小有潮熱。一云。日晡所發。心胃大煩。從心下至少腹鞭滿。而痛不可近者。大陷胃湯主之。五。用前第二方。小結胃病。正在心下。按之則痛。脉浮滑者。小陷胃湯主之。方六。

黃連

一兩

半夏

半升。洗。

栝樓實

大者一枚。

右三味。以水六升。先煮栝樓。取三升。去滓。內諸藥。煮取二升。去滓。分溫三服。

太陽病。二三日。不能臥。但欲起。心下必結。脉微弱者。此本有寒分也。反下之。若利止。必作結胃。未止

者。四日復下之。此作協熱利也。

太陽病。下之其脉促。

縱一作

不結胃者。此為欲解也。

脉浮者。必結胃。脉緊者。必咽痛。脉弦者。必兩脅拘急。脉細數者。頭痛未止。脉沈緊者。必欲嘔。脉沈滑者。協熱利。脉浮滑者。必下血。

病在陽。應以汗解之。反以冷水澀之。若灌之。其熱被劫不得去。彌更益煩。肉上粟起。意欲飲水。反不渴者。服文蛤散。若不差者。與五苓散。寒實結胃。無熱證者。與三物小陷胃湯。

用前第六方

白散亦可服。七。

一云與三物小白散。