

傷寒論淺註
卷

四三

亥21
46(3)-1
3



張仲景傷寒論原文淺註卷三

閩長樂陳念祖修固集主

男 蔚古愚

元犀靈石

全叅校

辨太陽病脈證篇

○太陽病當惡寒發熱今

吐傷中氣津液外泄而

自汗出

汗出而外證亦微

不惡寒發熱

脾胃之氣不足而

關上之脈

微

細

虛數者

此非本病

以醫者

吐之

之過也

一二日吐

之者以二日為陽明主氣之期吐之腹中饑胃

能納口不能食三四日吐之者以四日為太陰

則脾傷而胃未傷脾傷則不勝穀故不喜糜粥胃未傷仍欲食

食朝為陽胃為陽土朝食暮為陰脾為陰土

吐所以以醫誤吐之所致也前傷胃而不傷脾

非脾胃兩傷之則證此為小逆

此一節言病由誤吐一時氣逆使然後人擬

用大小半夏湯然却不知仲師無方之妙



述此章凡四節皆言吐之失宜而變證有土

同也

大陽病

不當吐而

吐之但大陽病

原

當惡寒今

反

不惡寒不欲近衣者此為吐之

傷上焦心主之氣陽無所附而

內煩也

此一節言吐之不特傷中焦脾胃之氣亦能

傷上焦心主之氣也

病人脈

一息六七至其名曰數

數為熱證與虛證不同如

數果為熱

熱當消穀而引食而反吐者此非熱以過發

其汗合陽氣外微陽受氣於膈中氣亦虛脈力

數也數為之外來客熱非胃中之不能消穀以胃

中虛冷故吐也

上二節之吐言以吐致吐此節之吐言不以

吐而致吐也

病證在疑似不可定之太陽病既過經不解當

除必求諸病人之情泥於何經之分而不必十有餘日或留於陽心



下溫湯欲吐而胸中病之。以心下。飲胸中。為陽明

之。分。大便反滯。而腹微滿。以大便與腹。為大陰

於心。脾脈又上膈。鬱鬱微煩。然以上諸證。或虛

注心。脾胃不和。故。須審病。先此。十日餘。時自。若得。其病。極吐。極下。適。後。

人之情。意者。實也。胃。胃調胃承氣湯。胃氣和。若爾者。為虛。則不與。

若但欲嘔而無心下胸中痛。而無鬱。空微滯。但微滯。腹滿。

證此。且。非柴胡。言。證。承氣。證。從何處。而得其病情。

者。以其嘔。欲吐。是溫溫。故知。先欲。極吐下也。

平。以。其。嘔。欲。吐。是。溫。溫。故。知。先。欲。極。吐。下。也。

易。其。人。用。之。上。太。易。篇。



此一節言病證在疑似之間而得其欲吐之情為主兼參欲下以定治法甚矣問證之不可不講也

○太陽病六日至七日。正當太陽表證仍在。

脈則宜脈微而沉。是邪不在表而在裏矣。太反。

不結胸。是病不在上。其人發狂者。邪熱內盛。逼

證以熱在下焦。小腹當鞭滿。然小便與血皆居

作鞭。小便自利者。如不開膀胱之氣分而在下。滿者。於濁在之血分。必用藥以



其血乃愈所以然者以太陽之表隨經而瘀熱

在少腹裏故也。以抵當湯主之。

此與桃核承氣證不同彼輕而此重彼為初結膀胱乃太陽肌腠之邪從背脊而下結於膀胱此為瘀熱在裏乃太陽膚表之邪從胸中而下結於少腹也。

抵當湯方

水蛭三十箇熬

蟅蟲三十箇熬去翅桃仁二十箇去皮朱



大黃三兩酒浸

右四味剉如麻豆以水五升煮取三升去滓

溫服一升不下再服

血之與水。以小便之利與不利分之。請再申其說。太陽病。從胸而陷。身黃。

脈沉結。少腹鞭。小便不利者。乃脾氣不能轉。為無

血也。而小便自利。其人如狂者。非水聚。血證諦。

也。必諦審其果是抵當湯主之。姑試也。

此一節申明上文小便自利之義也。喻嘉言

云此條乃法中之法也。見血證為重病，抵當

為重藥。後人辨證不清，不當用而誤用，與

當用而不用，成敗在於反掌。故重申其義也。

內經云：今夫熱病者，皆傷寒之類也。傷寒有熱，至所有之熱，皆少

腹滿，應小便不利。今反利者，血熱歸海，為有血也。血

結陰位，卒難蕩滌，投當緩下之。然又恐藥力大

藥過多，恐傷中氣，故當緩下之。微病根深固難

拔，故應用之藥，不可留餘藥，宜抵當丸。

此一節變湯為丸，分兩極輕連滓而服，又法。

外之法也

抵當丸方

水蛭二十箇 熬

䷗二十箇 熬去翅

桃仁二十箇 去皮尖

大黃三兩 酒浸

右四味杵分為四丸以水一升煮一丸取七

合服之晬時當下血若不下者更服晬時周

雖然辨蓄血者既以小便利為斷矣然不詳審其主證而并辨其兼證恐專執小便利之一證概認為血證亦非辨證之法內經云飲入於胃遊溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調



北京中醫藥大學圖書館藏

水道下輸太陽病。小便利者，以其飲水之多，夫

水多而小便利，則水氣下洩，應無必心下悸。然

心下悸之病矣。若不水氣下洩而上攻，必心下悸。是

水制也。小便少者，施氣不，必苦裏急也。豈獨血

是以張錢塘云上節以小便利不利而辨其血之

有無。此又以小便之多少而驗其水之有無，

并以結前三節之意，以見不可概認為血證，

其章法之精密如此。○問曰：吾聞太陽病，竟有不能出入，內外結胸，陰

陽主開。病竟有而固結於胸，為結胸，陰



傷寒論卷之六

主樞。竟不能樞轉出。藏結。其病狀何如。答曰。有結

入而固結於藏。為正氣。與邪氣。按之則痛。外以傷

共結於胸膈。有邪之問。故關脈沉。此名曰結

主皮寸脈浮。結於胸中。故關脈沉。此名曰結

毛。故寸脈浮。結於胸中。故關脈沉。此名曰結

胸也。張錢塘云。此章論結胸藏結痞氣之證。直至

病脇素有痞。方止。其中有經氣之分。陰陽之

異。生死之殊。學者所當細心體會也。

何謂藏結。答曰。胸雖不結。陰邪如結胸之狀。而

逆於心下。其外如結胸之狀。內而



則發於少陰。不如結胸之。飲食如故。藏氣。故於大陽也。上不涉於胸胃。故

時時下利寸脈浮。為少陰之神。關脈小細。為少

藏氣虛。沉緊。為少陰之藏氣結。名曰藏結。心下

於內也。若此者。名曰藏結。心下

外候。舌上白胎滑者。火衰於上也。病為難治。

其藏結之狀。既明。而藏結之證。不可不講。蓋結發

於少陰。少陰上火下水。木熱標寒。必得君火。陽

熱之化。則無病。今藏結無陽證。少陰主不見往

不得其熱化。則為藏結。無陽證。少陰主不見往

來寒熱。是少陰之陽氣。不能從樞。其人反靜。舌

上胎滑者。為君火衰微。而陰寒氣。不可攻也。

上胎滑者。為君火衰微。而陰寒氣。不可攻也。

上胎滑者。為君火衰微。而陰寒氣。不可攻也。

上胎滑者。為君火衰微。而陰寒氣。不可攻也。



此承上文而言藏結之證也。

少陰上火而下水其氣交會於陽明中土故

脈現於關沉與結胸無異而小細緊云陰

虛寒結證所獨也○按程郊倩云浮為寒傷

表脈沉為邪入於裏脈上節單言沉沉而有

力也此節兼沉小細緊而言脈之分別如此

今詳言結胃之因并病發於太陽太陽主外而

詳其狀而及其治。

反下之則熱虛而人。有結於胸膈因作結胸病發

於少陰

少陰主裏當按其裏

而反下之

邪若結於下則為藏結矣今不結於

藏而結

因而

作痞

痞症發於陰原無下法不

於心下

所以成結胸者以下之太早故也

再

陽證之

所以成結胸者

以下之

太早故也

其

因而更詳其狀

太陽

結胸者

氣結於內遂不

外

之脈上循頭項

今

結胸者

行於經脈以致

經

利其項亦

拘緊

有

如柔痙

反張

氣一則

外之經

和宜

大陷胸丸方

張錢塘云此言結胸藏結之所因而於藏結

之中復又推言痞結以見痞之同發於陰而

不與藏結同者。藏結結於下而痞結結於上。也。結於下者。感下焦陰寒之氣。結於上者。感上焦君火之化也。

大陷胸丸方

大黃

半斤

葶藶

半升

芒硝

半升

杏仁

半升

尖熬黑

去皮

右四味搗篩二味內杏仁芒硝合研如脂和

散取如彈丸一枚別搗甘遂末一錢七白蜜



南京中醫藥大學圖書館藏