

精校
張氏醫通

出版 上海錦章書局

亥 22
4-4



自序

嘗讀仲景書。止言舌白胎滑。並無黃黑刺裂至全鏡錄始集三十六圖。逮後觀舌心法廣至一百三十有七。何後世症變之多若此。宜知傷寒自表傳裏。舌胎必由白滑而變他色。不似伏邪瘟疫等熱毒自內達外之一病。便見黃黑諸胎也。觀仲景論中一見舌白胎滑。即言難治。安有失治而致變者乎。所以仲景止言白胎已見一斑。不煩瑣屑。後人無先聖治未病之能勢。不得不反覆辨論。以啟蒙昧。蓋邪氣入裏。其虛實寒熱之機。必現于舌。非若脈法之隱而不顯也。况陰盛格陽。與邪熱鬱伏。多有假症假脈。惟驗舌上胎色之滑燥厚薄。昭若冰鑑。無所遁形。由是取觀舌心法。正其錯誤。削其繁濶。汰其無預于傷寒者。而參入家大人治按所紀及己所親厯。共得百二十圖。命曰傷寒舌鑑。授之剖劂。以公同志臨症之一助云。

康熙戊申如月誕先張登書於雋永堂

傷寒舌鑑目錄

目錄

白胎舌二十九圖

黃胎舌一十七圖

黑胎舌一十四圖

灰色舌一十一圖

紅色舌二十六圖

紫色舌一十二圖

徽醬色胎舌三圖

藍色胎紋舌二圖

妊娠傷寒舌六圖




北京中醫藥大學圖書館藏所有

長洲張登誕先菴纂

白胎舌總論

傷寒邪在皮毛。初則舌有白沫。次則白涎白滑。再次白屑白庖。有舌中舌尖舌根之不同。是寒邪入經之微甚也。舌乃心之苗。心屬南方火。當赤色。今反見白色者。是火不能制金也。初則寒鬱皮膚。毛竅不得疏通。熱氣不得外泄。故惡寒發熱。在太陽經。則頭痛身熱。項背強。腰脊疼等症。傳至陽明經。則有白屑滿舌。雖症有煩躁。如脈浮緊者。猶當汗之。在少陽經者。則白胎白滑。用小柴胡湯和之。腎虛者。理中湯溫之。如白色少變黃者。大柴胡大小承氣分輕重。下之。白舌亦有死症。不可忽視也。

舌黃心白胎黃白舌	厚滑胎白舌	微滑胎白舌
		
此太陽經初傳陽明府病舌也二三日未曾汗故邪入丹田漸深急宜汗之或太陽與少陽合病有此舌者柴胡桂枝湯主之	病三四日其邪只在太陽故胎純白而厚却不乾燥其症頭疼發熱脈浮而緊鮮表自愈	惡寒舌色微白有津香蘇散羌活湯之類發散之
之		
舌黃邊白胎黃白舌	乾厚白胎白舌	薄白滑胎白舌
		
此太陽經初傳陽明府病舌也若微黃而潤宜再汗待胎燥裏症具則下之若煩躁嘔吐大柴胡湯加減亦有下淡黃水沫無稀糞者大承氣下之	病四五日未經發汗邪熱漸深少有微渴過飲生冷停積胸中營熱胃冷故令發熱煩躁四肢逆冷而胎白乾厚滿口白屑宜四逆散加乾姜者五苓散	小中醫書

舌滑白邊半

胎白滿刺乾舌黑

乾白胎黑心舌

白

乾黑

白

湯。

引脇下痛。而見此舌。小青龍湯。夏月多汗。自利。人參白虎湯。

白胎見於一邊。無論左右。皆屬半表半裡。並宜小柴胡湯。左加葛根。右加茯苓。有欬嗽。

少陽之裏症也。其症不惡。寒反惡熱者。大柴胡加芒硝急下之。然亦危症也。

白胎中生滿乾黑芒刺。乃寒反惡熱者。大柴胡加芒硝急下之。然亦危症也。

如二三日未嘗汙。有此舌必死。

此陽明府兼太陽舌。其胎邊白。中心乾黑者。因汗不出。不惡寒脈沈者可下之。微傳至陽明所致。必微汗出。

舌滑白結藏

胎白滑心黑舌

白滑胎尖灰刺舌

黑黃

白滑

白


或左或右半邊白胎。半邊藏也。黃連湯加附子。結在咽者。不能語言。宜生脈散合四逆湯。可救十中一二。

白胎中黑為表邪入裏之候。大熱讒語。承氣等下之。倘食復而發熱。或利不止者難治。

此陽明府兼少陽舌也。三四日自利脈長者。生弦數者死。如有宿食用大承氣下之。十可全五。




白胎黑斑舌




白胎中有黑小斑點亂生者。乃水來剋火。如無惡候。以涼膈散承氣湯下之。十中可救一二。

白胎黑根舌




舌胎白而根黑。火被水剋之象。雖下亦難見功也。

舌黃雙白胎



此陽明裏症舌也。黃乃土之色。因邪熱上攻致令舌有雙黃。如脈長。惡熱轉失氣煩躁者。大柴胡調胃承氣下之。

舌黑雙白胎




白胎中見黑色兩條。乃太陽少陽之邪入於胃。因土氣衰絕。故手足厥冷。胸中結痛也。理中湯瀉心湯選用。如邪結在舌根咽嗌。而不能言者。死

白尖黃根舌



邪雖入裏。而尖白末黃。不可用承氣。宜大柴胡加減。下後無他症。安卧神清。可生。倘再有變症。多凶。

白胎燥裂舌



所以舌上白胎。因過汗傷營。舌上無津。所以燥裂。內無實熱。故不青黑。宜小柴胡加芒硝微利之。

舌黃變白胎黃舌

黃滑

少陽症罷初見陽明裏症。
故胎變黃色兼失氣者大
柴胡湯下之。

舌紅尖白胎白舌

白
紅

滿舌白滑而尖却鮮紅者。
乃熱邪內盛而復感客寒
入少陽經也小柴胡湯加
減

舌灰雙白胎白舌

灰
白
白

此挾冷食舌也七八日後
見此舌而有津者可治理
中四逆選用無津者不治
如乾厚見裏症則下之得
湯次日灰色去者安

舌根紅尖白

紅
白

古尖胎白邪在半表半裏
也其症寒熱耳聾口苦脇
痛脈弦小柴胡湯和解之

舌白中紅胎白舌

紅
白

此太陽初傳經之舌也無
汗者發汗有汗者鮮肌亦
有少陽經者小柴胡湯加
減

舌黑中紅根白尖白

灰
黑
紅
白

舌尖白而根灰黑少陽邪執
傳府熱極而傷冷飲也如水
停津液固結而渴者五苓散
自汗而渴者白虎湯不利而
渴者解毒湯如白米炒黑根
多中不甚紅者難治

白胎尖灰根黃舌	熟白舌	淡白舌	透明
此大陽濕熱併于陽明也 如根黃色潤目黃小便黃 者茵陳高湯加減	白胎老極如煮熟相似者 心氣絕而肺色乘於上也 始因食瓜果冰水等物陽 氣不得發越所致為必死 之候用枳實理中間有生 者	純熟白	
舌根尖俱黑而中白乃金 水太過火土氣絕于內雖 無凶症亦必死也	胎如積粉		
舌根尖俱黑而中白乃金 水太過火土氣絕于內雖 無凶症亦必死也	加大黃	加柴胡葛根羌活見裏症	此舌乃瘟疫初犯募原也 達原飲見三陽表症隨經

黃胎舌總論

黃胎者裏症也。傷寒初病無此舌。傳至少陽經亦無此舌。直至陽明府實。胃中火盛。火乘上位。故有此胎。要分輕重。瀉之初則微黃。次則深黃有滑。甚則乾黃焦黃也。其症有大熱大渴。便祕。讝語。痞結。自利。或因失汗發黃。或畜血。如狂。皆濕熱太甚。小便不利所致。若目白如金。身黃如橘。宜茵陳蒿湯五苓散。梔子檗皮湯等。如畜血在上。焦犀角地黃湯。中焦桃仁承氣湯。下焦代抵當湯。凡血症見血則愈。切不可與冷水飲之。必死。大抵舌黃症雖重。若脈長者。中土有氣也。下之則安。如脈弦下利。舌胎黃中有黑色者。皆危症也。

純黃微乾舌

黃

舌見黃胎。胃熱之極土色。
見於舌端也。急宜調胃承

氣下之。遲則恐黃老變黑。
為惡候耳。

舌見乾黃。裏熱已極。急下。
勿緩。下後脈靜。身涼者生。
反大熱而喘。脈躁者死。

乾黃

黃乾舌

黃胎黑滑舌

黃舌胎

微黃

舌微黃而不甚燥者。表邪
失汗而初傳裏也。用大柴
胡湯。若身目俱黃者。茵陳
蒿湯。

舌黃而有黑滑者。陽明裏
症。具也。雖不乾燥。亦當下。
之下後。身涼。脈靜者生。
熱脈躁者死。

黑滑


黃胎灰根舌

老黃腐瓣舌

黃胎黑斑舌

灰
黃

黃



治之

舌根灰而尖黃雖比黑
根少輕如再過一二日亦
黑也難治無煩躁直視脈
沈而有力者大柴胡加減
治之

舌黃乾濶而有隔瓣者乃
邪熱入胃毒結已深煩躁
而渴者大承氣湯發黃者
茵陳蒿湯少腹痛者有瘀
血也抵當湯結胸大陷胸
湯

黃胎中亂生黑斑者其症
必大渴譏語身無斑者大
承氣下之如脈濶譏語循
衣摸床身黃斑黑者俱不
治下出稀黑糞者死

黃尖紅根舌

黃尖舌

黃胎中黑通尖舌

紅
黃

紅
黃

黃
黑

舌根紅而尖黃者乃濕熱乘
火位也瘟熱初病多有此
舌涼膈鮮毒等藥消息治
之

舌尖胎黃熱邪初傳胃府
也當用調味承氣湯如脈
浮惡寒表症未盡大柴胡
兩解之

黃胎從中至尖通黑者乃
火土燥而熱毒最深也兩
感傷寒必死惡寒甚者亦
死如不惡寒口燥咽乾而
下利臭水者可用調味承
氣湯下之十中可救四五
口乾齒燥形脫者不治中
氣湯

醫案

約大學圖書館

黃根白六舌



薄蒿湯。


舌根黃尖白。乃表邪少而
裏邪多也。天水散涼膈散
合用。如陽明無汗。小便不
利。心中懊惱者必發黃。茵

黃大脹滿舌

黃

舌黃而脹大者。乃陽明胃
經溫熱也。症必身黃便祕
煩躁。茵陳蒿湯如大便自
利而發黃者。五苓散加茵
陳梔子黃連等治之。

黃尖黑根舌



凡舌黑根多而黃尖少者。
雖無惡症。惡脈誠恐暴變
一時。以胃氣竭絕故耳。

黃根尖灰舌



舌乃火位。今見根黃尖灰
是土來侮火也。不吐不利。
心煩而渴者。乃胃中有鬱
熱也。調胃承氣加黃連。

黃尖白根舌



舌根白尖黃。其色倒見必
是少陽經傳陽明府病。若
陽明症多者。大柴胡湯少
陽症多者。小柴胡湯。如譏
語煩躁者。調胃承氣湯。

黃胎刺舌



舌胎老黃極而中有黑刺
者。皆由失汗所致。毒邪內
陷已深。急用調胃承氣下
之。十中可保一二。

黃根白尖短縮舌

黃赤白

黑胎舌總論

傷寒五七日。舌見黑胎最為危候。表症皆無此舌如兩感一二日間見之必死。若白胎上漸漸中心黑者是傷寒邪熱傳裏之候。紅舌上漸漸黑者乃瘟疫傳變壞症將至也。蓋舌色本赤。今見黑者乃水來剋火。水極似火。火過炭黑之理。然有純黑。有黑暈。有刺。有隔瓣。有瓣底紅。瓣底黑者。大抵尖黑稍輕。根黑最重如全黑者。總神丹亦難救療也。

純黑舌

黑

遍舌黑胎。是火極似水藏氣已絕脈必代結。一二日中必死。切勿用藥。

黑胎紅辦底舌



黃胎久而變黑。實熱亢極之藥。又未經服藥。肆意飲食。而見脈伏目閉口開獨語。諷妄。醫遇此症。必掘開舌胎。視辦底紅者。可用大承氣下之。


舌見根黃尖白而短硬不燥不滑但不能伸出症多



讒妄煩亂此痰挾宿食占據中宮也。大承氣加薑半

主之。




约大学图书馆所有

中黑邊白滑胎舌	刺底黑舌	黑底辯黑舌
		
舌見中黑邊白而滑。表裏俱虛寒也。脈必微弱。症必惡寒。附子理中湯溫之。月過食生冷而見此舌。則宜大順冷香選用。	刺底黑者。言刮去芒刺。下肉色俱黑也。凡見此。不必辨其何經何脈。雖無惡候。必死勿治。	凡見辯底黑者。不可用藥。雖無惡候。脈亦暴絕必死。

滿黑刺底紅舌	黑爛自嚙舌	紅邊中黑滑舌
		
滿舌黑。胎乾燥而生大刺。之觸手而响。掘開刺底。綠色者。心神尚在。雖火過極下之。則生有肥盛多濕熱人。感冒發熱悶亂。唇服一見此舌。急用大陷胸丸攻下。後與小陷胸湯調理。	舌黑爛而頻欲嚙。必瀰至根而死。雖無惡候。怪脈切勿用藥。	舌黑。有津。症見讒語者。必表症時。不曾服藥。不戒飲食。冷物粘滯于胃也。虛人黃龍湯。或枳實理中加大黃。壯者用備急丸。熱下之。夏月中喝。多有此舌。以人參白虎湯主之。

通尖黑乾邊白舌中焙舌中黑中無胎枯瘦舌





兩感一二日間便見中黑邊白厚胎者雖用大羌活湯恐無濟矣
炎甘草湯
傷寒八九日過汗津枯血燥舌無胎而黑瘦大便五六日不行腹不硬滿神昏不得卧或時呢喃歎息者

舌胎中心黑厚而乾為熱盛津枯之候急宜生脉散合黃連解毒湯以解之

舌胎一二日間便見中黑邊白厚胎者雖用大羌活湯恐無濟矣

黑乾舌中黑無胎燥舌中微紅內邊黑



死舌至乾黑而短厥陰熱極已深或食墮中脘腹脹所致急用大劑大承氣下之十中可救一二服後糞黃熱退則生糞黑熱不止者

舌黑無苔而燥津液受傷而虛火用事也急宜生脉散合附子理中主之

舌邊圓黑中有紅暈者邪熱入於心胞之候故有此色宜涼膈合大承氣下之

灰色舌總論

灰色舌有陰陽之異。若直中陰經。則即時舌便灰黑而無積胎。若熱傳三陰。必四五日表症罷。而胎變灰色也。有在根在火在中者。有渾舌俱灰黑者。大抵傳經熱症。則有灰黑乾胎。皆當攻下泄熱。若直中三陰之灰黑無胎者。即當溫經散寒。又有畜血症。其人如狂。或瞑目譟語。亦有不狂不語。不知人事。而面黑舌灰者。當分輕重以攻其血。切勿誤與冷水引領。敗血入心。而致不救也。

灰 中 舌



紅


灰

紅

舌灰色無胎者。直中三陰而夾冷食也。脈必沈細而遲。渴不煩者。附子理中四逆湯救之。次日舌變灰中有微黃色者。生如漸漸

舌根灰色而中紅尖黃。乃腸胃燥熱之症。若大渴譟語。五六日不大便。轉失氣者。下之。如溫病熱病。惡寒脈浮者。涼膈雙解選用。

灰 黑 胎 乾 紋 裂 舌



土邪勝水。而舌見灰黑紋裂。涼膈調胃。皆可下之。十中可救二三。下後渴不止。熱不退者。不治。

灰 根 黃 尖 中 赤 舌

純 灰 中 舌



灰




灰

紅

黃

舌根灰色而中紅尖黃。乃腸胃燥熱之症。若大渴譟語。五六日不大便。轉失氣者。下之。如溫病熱病。惡寒脈浮者。涼膈雙解選用。

灰色重暉舌



熱毒傳內一次舌即灰暉
一層。毒盛故有重暉。最危
之症。急宜涼膈雙解。鮮毒
承氣下之一暉尚輕。二暉
為重。三暉必死。亦有橫紋
二三層者。與此重量不殊。

灰黑尖舌




已經汗解。而見舌尖灰黑。
有宿食未消。或又傷飲食。
邪熱復感之。故調味承氣
湯下之。

灰中墨滑舌




淡淡灰色。中間有滑胎四
五點如墨汁。此熱邪傳裏。
而中有宿食未化也。大柴
胡湯。

灰黑乾刺舌



灰黑舌中又有乾刺。而見
咽乾口燥。喘滿乃邪熱結
於少陰當下之。然必待其
轉失氣者方可下。若下之
早。令人小便難。舌尖灰黑。
有刺而乾是得。病後又加飲食之。故雖症
見耳聾脹痛。發熱口苦。不
得用小柴胡。必大柴胡或
調胃承氣加消導藥。方可
取效。

灰黑乾刺舌



舌灰色而根黃。乃熱傳厥
陰。而胃中復有停滯也。傷
寒六七日不利。便發熱而
利。汗出不止者。死正氣脫

也。

舌根少黃舌



舌灰色而根黃。乃熱傳厥
陰。而胃中復有停滯也。傷
寒六七日不利。便發熱而
利。汗出不止者。死正氣脫