

醫學正傳卷之三目錄

痢門 十七

論

脉法

丹溪方法 凡四十一條

芍藥湯

黃芩芍藥湯

黃連湯

芍藥黃連湯

大黃湯

香連丸

益元散

神効參香散

丹溪活套

祖傳和中飲

經驗三根飲

經驗二防飲

噤口痢法

已試醫驗一條

嘔吐門 十八

論

脉法

丹溪方法 凡十一條

藿香安胃散

和中桔梗湯

木香散

荊黃湯

檳榔散

清鎮丸

白朮湯

金花丸

紫沉丸

小半夏湯

生姜汁半夏湯

藿香平胃散

胃苓湯

黃連六一湯

丁附治中湯



加味二陳湯

丁香安胃湯

茯苓半夏湯

丹溪活套

已試醫驗一條

噎膈門 十九

論

脉法

丹溪方法 凡十條

瓜蒌實丸

寬中進食丸

人參利膈丸

丹溪活套

祖傳潤腸膏

大力奪命丸

又經驗方

已試醫驗二條

飢逆門 二十

論

脉法

丹溪方法 凡六條

陳皮竹茹湯

橘皮半夏生姜湯

六君子湯

丹溪活法

經驗灸飢逆法

吞酸門 二十一

論

脉法

丹溪方法 凡七條

藿香安胃散

加減二陳湯

三因麴朮丸

祖傳治吞酸方



嘈雜暖門 二十二

論

脉法

丹溪方法

凡八條

三聖丸

水蓮丸

軟石膏丸

麴朮丸

痞滿門 二十三

論

脉法

丹溪方法

凡二條

厚朴溫中湯

木香順氣湯

痞挾瘀血方法

七氣湯

大消痞丸

失笑丸

消痞湯

黃連消痞丸

黃芩利膈丸

丹溪活套

已試醫驗一條

腫脹門 二十四

論

脉法

丹溪方法

凡八條

禹餘糧丸

絜矩三和湯

紫蘇子湯

木香順氣湯

中滿分消丸

廣朮潰堅湯

半夏厚朴湯

破滯氣湯

草豈蔻湯



葶藶木香散

白朮木香散

葶藶膏

二氣散

牽牛丸

三花神祐丸

鷄屎醴飲

丹溪活套

祖傳鷄屎醴

又經驗方

經驗桃奴丸

自己試醫驗二條

積聚門二十五

論

脉法

丹溪方法凡六條

三聖膏

琥珀膏

阿魏丸

大溫中丸

小溫中丸

婦人腹中有塊說

一方治婦人血塊

又治婦人血塊如盤

凡痞塊在皮裏膜外方

倒倉法

已上皆丹溪法

廣求潰堅湯

半夏厚朴湯

三因散聚湯

大七氣湯

千金硝石丸

局方妙香丸

導氣枳殼丸

木香三稜丸

草豆蔻丸

肥氣丸

伏梁丸

痞氣丸

息奔丸

奔豚丸

虛損門二十六



醫藥大學圖書館

論

老人調養方

八物湯

大補陰丸

滋陰大補丸

六味地黃丸

補中益氣湯

參附湯

千金延壽丹

祖傳心虛手振方

勞極門 二十七

論

蓮心散

鬼哭飲子

取虫神仙方

脉法

四君子湯

六君子湯

補陰丸

補腎丸

人參固本丸

益胃升陽湯

濟生茯神湯

班龍丸

已試醫驗二條

脉法

青蒿飲子

天靈蓋散

神授散

丹溪方法一條

四物湯

十全大補湯

加味虎潛丸

補天丸

人參膏

濟生芪附湯

補氣湯

桂枝加龍骨牡蠣湯

丹溪方法 凡四條

白鐵塵方法

射香散

禁方無比丸



又取勞虫方

紫河車丹

虛勞柴胡散

治虛勞嗽魚甲散

貫衆丸

治勞嗽輕骨散

治勞嗽哈哂散

治勞熱蛤蚧飲子

古今治驗五蒸湯

丹溪活套

灸勞瘵崔氏四花穴法



醫學正傳卷之三

花溪恆德老人虞搏天氏編集

痢十七

論

內經曰溲而便膿血知氣行而血止也

愚按經文溲字下必缺一澁字溲即尿也溲澁而便膿血者言病因也蓋血因氣滯而大小二便俱不利耳氣行而血止者言治法也故河間闡明其說所謂和氣則後重自除而用木香檳榔枳殼等藥以和之即此意也

河間曰行血則便膿自愈和氣則後重自除又曰後重則宜下腹痛則宜和身重則除濕脈弦則去風膿血稠粘以重藥竭之身冷自汗以熱藥溫之風邪外束宜汗之驚漉為痢宜溫之又曰在表者發之在裏者下之在上者湧之在下者竭之身表熱者內疎之小便澁者分利之又曰盛者和之去者送之過者止之兵法云避其來銳擊其惰歸此之謂也夫古方以瀉痢滾同論治朱紫混淆殊不知瀉屬脾而痢屬腎也丹溪曰先水瀉而後膿血者此脾傳腎賊邪難愈先膿血而後水瀉者此腎傳脾微邪易愈是皆先哲之格言以為後學之繩墨醫者其可不詳究乎

脈法

脈經云腸澼下膿血脈沈小流連者生洪大數身熱者死又曰腸澼筋攣脈小細安靜者生浮大而緊者死

方法

丹溪方法凡四十二條

丹溪曰痢赤屬血自小腸來白屬氣自大腸來

原病式曰痢為溼熱甚於腸胃怫鬱而成其病皆熱證也俗以痢白為寒誤也如熱生瘡癰而出白膿可以白為寒乎陰陽水火一高則一下一盛則一衰若以白為寒赤為熱則兼赤白者乃寒熱俱甚於腸胃之間而為病乎況下迫窘痛小便赤澀而痢白者必多有之為熱明矣世有用辛熱藥而愈者蓋辛甘發散熱主出行故病微者則鬱結開通氣和而愈若病甚者鬱結不開其病轉加而死矣故治痢者必用寒以勝熱苦以燥溼微加辛熱佐之以為發散開通之用如此固無不效者

仲景治痢可下者悉用承氣等湯加減下之大黃之寒其性善走佐以厚朴之溫善行滯氣緩以甘草之甘飲以湯液灌滌腸胃滋潤輕快積行即止局方用飢丹巴陋類聚成丸其氣兇暴其體重滯積氣已行而毒氣未消猶暴賊手持兵刃使之徘徊瞻顧於堂奧之間縱有愈病之功而腸胃清純之氣甯無損傷之患乎可溫者乃用薑



附溫之局方例用熱藥為主滋藥為佐用之於下利清白者猶可其裏急後重經所謂下迫者皆屬火熱所為加以滋熱之劑非殺而何

初得一二日間元氣未虛必推蕩之此通因通用之法用大承氣湯或調胃承氣湯下

後看氣血調理氣用參朮血用四物五日後不可下

此亦大藥言之氣血虛者雖二日亦不可下實者十餘日換

亦有下之而安者

腹痛以白芍藥甘草為君當歸白朮為佐惡寒者加桂惡熱者加黃柏

腹痛因肺金之氣鬱在大腸之間以苦梗發之後用痢藥三云實則可下虛則以苦梗發之初下痢腹痛者用溫藥薑桂之屬切不可驟用參朮縱氣虛胃虛皆不可用

後重者積與氣墜下之故兼升兼消尤當和氣木香檳榔丸保和丸之類

身熱挾外感者不惡寒用小柴胡去人參發熱惡寒身首俱痛此為表證宜微汗和解

加蒼朮川芎陳皮芍藥甘草生薑煎服

愚每以上二方并治痢之挾外感者亦多獲奇效也

發熱不止者屬陰虛用寒涼藥必兼溫藥升藥

大孔痛

肛門痛也

因熱流於下也木香檳榔芩連加炒乾薑

仲景法治大孔痛一日溫之一日清之若久病身冷自汗脈沈小宜溫之暴病身熱脈

洪大宜清之

下血者宜涼血活血當歸黃芩桃仁之類或用朴硝有風邪下陷宜升提之蓋風傷肝肝主血故也有溼傷血宜行溼清熱

溼熱下痢小便澀少煩渴能食脈洪大而緩腹痛後重桂苓甘露飲送下保和丸二三

十粒

濕多熱少脾胃不和食少腹痛後重夜多利下胃苓湯送下保和丸二三十粒
氣虛面色痿黃或枯白色人疲倦痢頻併痛後重不食脈細弱或微汗時出黃芪建中湯送下保和丸二三十粒

溼熱為痢不渴者建中湯加蒼朮茯苓下保和丸

脾胃不和食少腹脹痛後重脈弦緊宜平胃散加芍藥官桂葛根白朮茯苓下保和丸
下痢血氣大虛腹痛頻併後重不食或產後得此證用四君子湯加當歸陳皮下保和丸二三十粒

下痢白積者用芍藥湯加白朮陳皮甘草滑石桃仁

下痢赤積身熱益元散加木通炒芍藥炒陳皮白朮煎湯送下保和丸加黃芩凡
久下痢已數日不能起床不食疲弱之甚者用

人參五分

白朮一錢

黃芪五分

當歸七分

芍藥一錢

甘草

炙三分

御米穀醋炒

地榆五分

木香三分

縮砂五分

陳皮

一錢

升麻三分

白荳蔻仁三分

澤瀉五分

右細切作一服水一盞半煎至一盞去粗溫服

如下墜異常積中有紫黑血而又痛甚者此為死血證用桃仁細研及滑石行之血痢久不愈者屬陰虛四物為主

下痢如荳汁者溼也蓋脾胃為水穀之海無物不受常兼四臟故有如五色之相染當先通利此迎而奪之之義如虛宜審之

古方用厚朴專為行凝滯之氣滯氣稍行則去之枳殼雖少緩亦不宜久服只以陳皮和藥可也

古方多用粟殼治嗽與痢但要先出病根乃收功後藥也

如力倦氣少惡食此為挾虛證宜用白朮當歸身尾甚者加入參陳皮補之虛回而痢自止

如久痢體虛氣弱滑泄不止亦當以瀉藥止之訶子肉豆蔻白礬半夏牡蠣之類擇而

用之然須以陳皮為佐恐太瀉亦能作疼又甚者須灸天樞氣海

取穴法見前霍亂門

如痢已減十之七八穢積已盡糟粕未實用炒芍藥炒白朮炙甘草陳皮茯苓煎湯下

固腸丸二十粒此丸性多燥澁有去濕實腸之功若滯氣未盡除者不可遽用
如痢後糟粕未實或食粥稍多或飢甚方食腹中作疼以白米陳皮二味煎湯和之自安
如氣行血和積少但虛坐努責此為無血證倍用歸身尾芍藥生地黃而以桃仁泥佐
之陳皮和之血生自安

如痢後腳弱漸細小用蒼朮二兩白芍藥龜板各二兩半黃柏五兩粥糊丸以四物湯
加陳皮甘草煎湯送下

噤口痢胃口熱甚故也用黃連人參煎湯終日呷之如吐則再強飲但得一呷下咽便
好又用田螺搗盒臍中以引下其熱胃中熱結當開以降之人不知此多用溫藥甘
味以火濟火以滯益滯也亦有誤服熱毒之藥犯胃者當推明而祛其毒用糞蛆焙
乾為末清米飲調下一錢匕甚效

多有時疫作痢傳染相似宜推明運氣之勝復以治之

小兒痢疾用黃連黃芩大黃甘草煎服赤痢加桃仁紅花白痢加滑石末同煎
一小兒八歲下痢純血作食積治蒼朮白朮黃芩白芍藥滑石茯苓甘草陳皮神麴煎
湯下保和丸

凡下痢純血者如麝腐色者如屋漏水者大孔開如竹筒者唇如硃紅者俱死如魚

腦髓者身熱脈大者俱半死半生經所謂身涼脈細者生身熱脈大者死是亦大槩言之耳不可一途而論也

一方治熱痢血痢用大黃黃連黃芩黃柏枳殼白芍藥川歸滑石甘草桃仁白朮等分神麴糊丸如梧桐子大每服五六十丸白湯下

青六丸治血痢神効

溫六丸治痢及水瀉皆効

已上二方並見泄瀉門

固腸丸治溼熱下痢大便下血去腸胃陳積之後用此以燥下溼而實大腸

樗根白皮

不拘多少細切畧炒

右一味研為細末米糊為丸如梧桐子大每服三五十丸陳米飲送下或用炒芍藥炒白朮炙甘草陳皮茯苓煎湯下

芍藥湯行血則便膿自愈和氣則後重自除此藥是也

白芍藥

二錢

當歸尾

黃連

黃芩

各一錢

大黃

七分

甘草

枳榔

木香

桂心

各五分

右細切作一服水一盞半煎一盞空心服

如初病後重窘迫甚者倍大黃加芒硝一錢如痞滿氣不宣通加枳實一錢如

臟毒下血加黃柏一錢

黃芩芍藥湯治瀉痢腹痛或後重身熱久而不愈脈洪數者及膿血稠粘者

黃芩

芍藥各二錢

甘草一錢

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服腹痛甚加桂二分稍熱服之

黃連湯治大便後下血腹中不痛謂之溼毒下血

黃連

當歸各二錢

右細切作一服水一盞半煎至一盞去粗溫服

芍藥黃連湯治大便後下血腹中痛者謂之熱毒下血

芍藥

川歸

黃連

各一錢五分

大黃三分

桂心

一錢五分

甘草

三分

右細切作一服水一大盞煎七分溫服

大黃湯治痢久不愈膿血稠粘裏急後重日夜無度脈沈實人不甚困倦者或初得腹痛

甚者窘迫不安者

大黃

一兩

右細切作一服用好酒二大盞浸半日煎至一盞半去粗分作二服頓飲之如痢未止再進後服後以芍藥湯和之又再服黃芩芍藥湯以徹其邪此乃蕩滌邪熱之劑



用酒煎者蓋欲其上至頂巔外徹皮毛也

香連丸治下痢膿血赤白相雜裏急後重

黃連

二十兩與吳茱萸十兩二味各以好酒拌溼同炒去茱萸

木香

四兩八錢不見火

右為細末醋調麪糊為丸如梧桐子大每服三五十丸清米飲送下

二方加石蓮

肉半斤治噤口痢尤佳

益元散謂此為治痢之聖藥也其功不能盡述

桂府膩白滑石

六兩

粉甘草

一兩炙

右二味共為極細末每服三錢白水調無時

神効參香散治痢疾日久穢積已少腹中不痛或微痛不後重窘迫但滑溜不止乃收功

之後藥也

粟殼

去穢蒂醋炙一兩二錢

陳皮

三兩

肉豆蔻

剉裹煨四錢

茯苓

去皮

白扁豆

炒各四錢

木香

人參

各二錢

右為細末每服一錢匕清米飲調下食遠

丹溪活套云痢疾乃外感無內傷之候也須分表裡治之在表者必惡寒發熱身首俱痛

宜以小柴胡湯去人參梔子加蒼朮川芎陳皮生芍藥微汗以散之在裡者必後重窘

迫腹痛下積早宜以大小承氣河間酒煎大黃湯之類下之餘邪未盡更以芍藥湯香

連丸之類以徹其邪穢積已盡而更衣未息者此大腸不行收令故也宜以固腸丸參香散之類以止瀉之噤口者須詳證按法調治切不可輕用粟穀肉豆蔻訶子之類必試之殺人於反掌之間也但凡痢證不問輕重若邪氣正盛而以粟穀之類止遏之雖不死亦成休息痢二三年不能愈也又不可輕用巴豆牽牛等熱毒之劑故之蓋病因熱毒又得熱毒之劑以火濟火不死何待

祖傳經驗秘方和中飲治痢疾不分赤白久近服之無有不效者但發熱噤口不食者不可服

陳皮

白朮

茯苓

白芍藥

各一錢

草果仁

七分

甘草

三分

陳倉米

二錢

砂糖

三錢

粟穀

醋炙一錢五分

烏梅

一箇

右細切作一服加生薑三片大棗一枚水二盞煎至一盞去粗溫服

經驗三根飲治休息痢年久不愈者其効如神

五倍木根

蒼耳草根

臭樗木根

刮取白皮

右各等分細切每服七錢重加生薑三片大棗一枚大黑豆三十六粒糯米四十九

粒水二盞煎至一盞去粗溫服

經驗二防飲治痢後不謹感冒寒溼或涉水履霜以致兩足痛痺如刀刺虎咬之狀膝臍

腫大不能行動名鶴膝風此藥神効

人參 白朮

黃芪錢各一

甘草分五

川歸

川芎

芍藥

熟地黃錢各一

防風

防己

羌活

牛膝分七

杜仲薑汁拌炒

草薢錢各一

附子

童子尿浸三日去皮
臍七分冬月一錢

右細切作一服加生薑三片大棗二枚水二盞煎至一盞去粗空心溫服

仁齋云下痢噤口不食者雖曰脾虛蓋亦熱氣閉隔心胸間所致也俗用木香則失之溫

用山藥則失之閉惟真料參苓白朮散加石菖蒲末以道地粳米飲多年陳倉米尤佳溫調下

或人參茯苓石蓮子肉入此少菖蒲為末與之胸次一開自然思食

其參苓白朮散本方該有縮砂或少

入木香見
內傷門

一子年將五十夏秋間得痢疾月餘服藥而少愈穢積已但盡糟粕不食晝夜五六次入

廁無脫肛不安又半月諸藥不効予記祖傳一方用池塘中蟹一箇如法脩事多用生

薑米糯作羹入沙糖一小塊不用鹽醬熟煮吃一二碗三日不登廁大腸自此實矣肛

門亦收而不脫夫此證蓋因脾土受虛致肺與大腸俱失化源之所滋養是故大腸不

行收令也此母能令子虛耳蟹乃介虫屬金而有土性溫能補脾肺又況肺惡寒先得

苓連等寒涼之味已多今用生薑之辛以補肺金用沙糖之甘以補脾土肺氣既實其