

膈丸。用白水陳皮煎湯下。或古黃連丸以瀉肝補脾。清濕
 熱開痞結。久病者黃連消痞丸。如痰火濕熱太甚者方敢
 用。三黃瀉心湯加減量下之。虛者只宜分消上下。與濕同
 治。○七情氣鬱成痞。不思飲食。食之不散者。木香化滯湯
 或順氣中虛如刺痞碍阻。有稟受中虛痞滯不運。如饑如
 飢。有內傷勞役。濁氣犯上。清氣下陷。虛痞者。補中益氣湯加
 黃連枳實芍藥。便閉加大黃。嘔加黃連。生薑陳皮。冬月加
 黃連丁香。香食已心下痞者。平補枳朮丸。停飲中寒者。枳實
 理中丸。○瘀血結成窠囊而心下痞者。用桃仁紅花香附
 大黃等分為末。酒調服利之。或犀角地黃湯。血虛挾水過
 勞則發。心下不快者。四物二陳湯加桔梗。瓜蒌降之。氣血
 俱虛者。枳實消痞丸。王道消補總可安。王道消補。不輕吐下。故古方
 實消痞丸。○半夏辛散。參朮甘苦溫補。茯苓澤瀉淡滲。隨病所在調之。
 ○通用二陳湯為主。肥人多濕痰。加蒼朮砂仁滑石。倍痰
 者。冬半夏瘦人多鬱熱。中焦加枳實黃連乾葛升麻。稟受
 者。前因者。後因者。連清皮厚。枳實者。加一木。山

查麥芽陳皮。誤下陰虛者。去茯苓半夏。加參朮升麻柴胡。
枳實以升胃氣。更合四物湯以濟陰血。飲食積痞。加枳實。
砂仁姜汁炒黃連。食後感寒。加香薷草豆蔻。只黃砂仁。氣
痞痰痞。加木香枳殼。中虛加參朮香附砂仁。瘀血合
四物湯。加
桃仁紅花

泄瀉

五瀉須知溺赤清。

五瀉。濡瀉即濕瀉。腸垢即熱瀉。鴨溏即寒瀉。虛瀉。滑瀉。大要熱者小便赤澀。煩

渴腹中熱。穀或不化而色變青黃。或紅赤黑。身能動作。聲響亮。手足溫。寒者小便清白。不渴腹中冷。完穀色亦不變。

變亦白色。身懶動作。目睛不了了。飲食不下。機要濕瀉身云。暴瀉非陽。久瀉非陰。正如傷寒始寒而終熱也。濕瀉身

重注如傾。

濕瀉如水傾下。腸鳴身重。腹不疼。外濕者胃本湯。白朮茯苓湯。二白丸。風濕相

搏者。麤芍丸。痛甚者。治痛瀉方。協風完穀寒急痛。風瀉惡

或帶清血。即太陰發瀉。反其所食原物。由春傷風寒。夏感
冷濕發動。故其瀉暴。一方長幼相似。不可溫澁。以致變為
痢脹。要知四季脾受風濕。亦名發瀉。春古蒼防湯。蒼芍湯。
夏二香散。秋神術散。冬不換金正氣散。微瀉之。稍久者。三
白湯。麴蘖丸。帶血虛者。胃風湯。寒瀉惡寒身痛腹脹。切
痛。雷鳴。鴨瀉。清冷。完穀不化。甚則脾敗肢冷。理中湯。倍加
茯苓厚朴。治中湯。加砂仁。或大已寒丸。又有一種
臟冷瀉。以熱手按之。則緩者。四柱散。古姜附湯。身熱煩

渴暑分明

暑瀉如水。煩渴尿赤。暴瀉實者。茹苓湯。加黃連。
車前子。或桂苓甘露飲。虛者。六和湯。清暑益氣

湯。有潮熱者。柴苓湯。升麻葛根湯。內傷飲食痛且臭。食積
日久。香連丸。黃連阿膠丸。來復丹。

內傷飲食痛且臭

痛甚

瀉後痛減。臭如抱壞鷄子。噎氣作酸。須先消剋所傷之物。
傷冷食者。感應丸。平胃散。加香附砂仁。草菓山查。麥芽。傷

熱食及酒者。二黃丸。加神麴。傷酒晨瀉者。理中。加生薑乾
葛。或香茸丸。熱者。酒蒸黃連丸。傷麴者。人參養胃湯。加薤

藿。子傷水飲者。五苓散。溫六丸。痞脹不順。屬七情。七情瀉。腹常虛痞。欲去
不去。去不通。泰藿香正

氣散加丁香砂仁良姜或木香勻氣散。痰瀉多少火暴速

七氣湯。古莫連丸。調其氣而瀉自止矣。痰瀉多少火暴速

痰瀉。或瀉不瀉。或多或少。此因痰流肺中。以致大腸不固。

二陳湯加白朮神麴。實者海青丸。虛者六君子湯。○火瀉

實火口渴喜冷。痛一陣瀉一陣。肝門焦痛。其來暴速稠粘。

五苓散去桂加黃連為藥。或黃芩湯加木通。六一散。煎嘔

者加姜汁。又火性急或米穀不化者。姜汁炒黃連為丸服。

虛火氣虛。不能必別水穀者。衛生湯。陰虛火動。不能凝聚

者。三白湯。欽之。虛瀉。汗面多青。虛瀉困倦無力。脾虛飲

者。四君子湯加木香砂仁蓮肉陳糯米為末。砂糖湯調服。

久者只加升麻白芍。或平胃蒜肚丸。有停蓄飲食數日乃

瀉。腹脹者。名瀉瀉。枳朮丸。沒石子丸。煩渴或兼嘔者。錢氏

白朮散。參苓白朮散。食少腸鳴四肢困倦者。并陽除濕湯。

日止夜瀉者。啓脾丸。又脾瀉久傳腎為腸癰。經年不愈者。

調中健脾丸。又老人脾腎虛瀉者。用吳茱萸鹽水浸透。以

漬猪臟頭一截。洗去脂膜。將茱萸入內。札兩頭。蒸爛。搗丸。

菜豆大。每五十丸。米飲下。煖膀胱。清水道。固大腸。進飲食。

此為試讀，需要完整PDF請訪問：www.ertongbook.com

○腎虛色慾所傷。瀉多足冷。久則肉削。五鼓臍下絞痛。或只微響。瀉瀉一次者。古味更散。二神丸。四神丸。陽虛者。三

味安腎丸。金鎖正元丹。養氣丹。陰虛者。腎氣丸。○肝虛忿怒所傷。水尅脾土。門戶不束。厥而面青。當歸厚朴湯。或熟

料五積散去麻黃。汗多者。黃芪建中湯。○凡瀉滑瀉不禁。脉細皮寒。前後瀉利。飲食不入。是謂五虛。不治。滑瀉不禁

氣陷。脫瀉久不止。大孔如竹筒直出。魚禁。氣陷者。升陽補

者。訶子散。沒石子丸。或古莫連丸。罌粟壳煎湯下。氣欲脫者。真人養臟湯加附子。或四柱散。大斷下丸。古寇附丸。香

茸丸。婦人四製香附丸。又有大交腸似痢何由名。交腸瀉

腸滑瀉。小便精出者。萬全丸。便易位而出。此因氣不循故道。清濁混淆所致。當分利陰

陽。使氣順各安其位。胃苓湯。木香勻氣散。腎氣丸。○以痢

非痢。寒熱不調之症。或熱積於中。而以冷物冷藥水之。或冷積於中。而以熱物熱藥壓之。故熱與冷搏而成瀉。或瀉

或瀉。裏急後重者。戊巳丸。香風宜微發寒溫溫。虛補積消

濕滲升

必滑脫不禁然用藥之其間有風勝無以解

表寒勝無以溫中滑脫虛弱補益食積消滯濕則淡

參降則升舉隨症變用又不拘於次序與痢大同且補虛

不可純用甘溫太甘則生濕清熱亦不大苦苦則傷脾每

兼淡劑利竅為妙○抑考難經云胃泄飲食不化色黃脾

泄腹脹嘔逆言瀉也○大腸泄食已窘迫色白腸鳴切痛小

腸泄澀而便膿血小腹痛大腹泄裏急後重數至圓而不

能便空腹痛而溺澀言痢也○觀此瀉與痢亦惟膿血與糞

之異除傷寒三陽三陰傳變自利雜病濕熱食積之根皆

責腸胃蓋世瀉瘡痢同由暑月飲食所致輕者便作世瀉

重者停為瘡痢痰鶴胸脇則為瘡積滯腸胃則為痢局方

有分難經五瀉者

不免失之牽強

吞酸

吞酸吐酸皆濕熱

經云諸壅滯皆屬於熱又云少陽之勝

則肝木自甚為酸。譬之飲食熱則酸。但吐酸乃平時津液
上升之氣。鬱為痰火。留飲不化。酸為酸水。吐出吞酸乃濕
熱伏於脾胃。咯不得上。熱不得下。宿食鬱遏而作。其因治
一也。惟濕多則吞而便利。熱多則吐而便閉。東垣言寒者
論其標耳。大要初起宜反折。素有濕熱。因外感風寒。則內熱愈
吐。胸中無奈。或得熱湯暫解。蓋風寒鬱在肌表。得煖則痰
理開泄。譬之傷寒表熱。以麻黃熱藥發表而愈。不問外感
風寒。內傷生冷。初起俱宜生薑汁半復湯。或二陳湯加丁
香木香肉桂乾姜砂仁姜棗煎服。暫與開豁。反佐之藥。
非正治也。中病即止。如中寒停水者。神麴丸。上膈寒者。三
味參更湯。上熱下寒者。黃連一兩。附子七錢。神麴糊丸。淡
姜湯下。
又消食積降火痰。久則鬱熱。宜以寒藥調之。下之。結
素食者。恐滯氣也。宿食通用二陳湯。或生料平胃散加
香附砂仁神麴山查麥芽山梔仁黃連。或枳不丸。宿食留
飲。酸蜚心痛。牙齒亦酸者。神麴丸。專吐清水者。用蒼朮
冬滑石白朮陳皮水煎服。無噎難者。保和丸。痰火停食

一日半日。腐化酸水。吐出黃臭。或酸心不安。通用二陳湯。加山查。神麯。枳。檳。南星。枇杷。葉。黃連。竹。葉。姜。煎。臨。熟。入。姜。汁。一匙。調服。或九味黃連丸。挾瘀血者。四味黃連丸。燕。嚙。糲。者。清。痰。丸。○通用大便閉者。透膈湯。大便自利者。用六一散。七兩。加吳。黃。一兩。飯。丸。服。陰。虛。暮。劇。須。養。血。朝。食。甘。麥。至。嘔。心。腹。刺。四。物。湯。加。陳。皮。黃。連。黃。芩。桃。仁。紅。花。麻。仁。甘。草。便。閉。結。者。更。加。大。黃。氣。虛。者。更。合。四。君。子。湯。

黃疸

黃疸須知有濕乾

發黃譬如會麯。五疸同歸濕熱。蓋濕熱

體俱黃。黃即疸也。乾黃熱勝。色黃而明。大便燥結。濕黃濕勝。色黃而晦。大便潤利。又濕病與黃病相似。但濕病在表。

一身盡痛。黃病渴多喘滿。治之難。凡疸以外。入腹喘滿渴多。在裏。一身不痛。

面黑者死。要知疸兼雜症最多。脾胃稍汗溺俱黃。身體腫實。更覺厚味可治。酒色傷。恣口腹者難。

黃疸因暴熱用冷水洗浴熱留胃中故食已善饑安卧懶動宜茵陳三物湯加木通瓜蒌仁石羔或單桃根煎湯服

之頭眩懊懣發赤斑。食已頭眩腹脹曰穀疸。因胃熱大饑過食停滯胸膈宜小柴胡湯加穀芽。

枳實山揔。或穀疸丸。紅丸子。傷冷食肢厥者。四逆湯加薑
陳○心胸懊懣。噉不食。腹如水狀。足心熱。脛滿面發赤。

斑。眼黃鼻癰。曰酒疸。因大醉當風入水。酒毒留於清道。物起令病人先含水。後以成蒂末一字搗鼻。吐出黃水。次服

葛朮湯。探吐亦可。熱者小柴胡湯加茵陳白朮豆豉乾葛。黃連澤瀉。便閉者。梔鼓枳實湯加大黃。或酒蒸黃連丸。如

酒後犯房。瘀熱入心。成痘者。妙香散。痰火入肺。甚則額黑。成痘。咳嗽見血。喉腥。及婦人血崩。龍腦雞蘊丸。

小腹滿。額上黑微汗。手足心熱。薄暮即發。膀胱小便不利。曰大勞瘵。因大熱。但房入水。腎虛從脾。氣上行。

者四白湯。去九飲。去小兒經陰。經嘔吐。陽熱集。諸病發。

小半夏湯發於陽經必有虛勞口淡脚軟弱內虛發黃口

寒熱小柴胡湯加山梔脚軟微寒發熱白濁氣虛四君子湯血虛四物湯合四苓

散加茵陳麥門冬氣血俱虛入參養榮湯八味丸如飲食

勞役失節中寒生黃者黃芪建中外感瘧血詳傷寒行感

湯理中湯食積者二陳湯加砂仁要時疫瘡痢發黃瘡疽九風症色黃帶青小柴胡湯加茵

陳寒症色黃帶黯理中湯加茵陳青皮枳實魚汗者用麻

黃三錢酒煎溫服以汗之暑濕症色黃帶赤五苓散加茵

陳最妙。瘧血發黃喜治分表裏滲為妙。治疸表症小柴

在喜忘便黑詳傷寒少裏多者茵陳五苓散滲之半表裏者梔子白皮湯茵陳

三物湯一清飲子和之裏急者茵陳湯下之就中尤以滲

嘔噦重則喘滿。又酒疸下之則成黑疸。不渴便利者俱宜六君子湯加茵陳。蒼朮山藥以溫中。甚者小溫中丸。大溫中丸。退黃丸。若虛損。猶宜滋補肝腎。真陽之精一升而和。火自斂。若必用茵陳。陳強利小便。耗竭肝津。腎水則疽病幸痊。而雀目腫脹。又作慎之。

水腫

水腫上下陰陽微。陽水多外。因涉水冒雨。或兼風寒暑氣。而見陽症。陰水多內。因飲水及茶酒過

多。或饑飽勞役房慾。而見陰症。陽水先腫上體。肩背手肘。手三陽經。陰水先腫下體。腰腹脛跗足三陰經。故男從脚

下腫起。女從頭上腫起。濕熱變化總屬脾。人身真水真火。者為逆。陰陽微妙如以。

生。脾病水流為濕。火炎為熱。久則濕熱鬱滯。經絡盡皆濁腐之氣。津液與血亦化為水。初起目下微腫。如卧蠶。及至

水浮膜外。則為膚脹。流下焦則為臃腫。手按隨手而起。如累水之狀。以指畫之。成字者名濕水。不成字者名濕水。有

按之作水聲者。乃氣虛不能宣泄。久成水瘕。

下注腎經陰附腫

腎主水也。惟脾病則不化飲食。

滋真水。非惟腎精損削。而濕熱下注。陰附獨腫者有之。其則泛濫遍體。魚歸必土實而後足以收攝和氣。腎氣歸元。

上升氣喘肺孤危

金生水也。惟脾病則肺金失養。非惟肺氣孤危。而失降下之令。滲道不通。且濕

熱濁氣上升為喘。為咳。必土實而後肺金清肅。以滋化源。或曰獨魚寒濕者乎。寒則土堅水清。間有亦更易治。陽

水熱渴二便閉汗下分消要得宜

經曰諸附腫疼酸皆屬於水。又曰結陽肢腫是

也。治與水症濕症大同。大法腰已上腫宜汗。腰已下腫宜下。表症喘咳。小青龍湯。越婢湯。古麻甘湯。桂枝香酒湯。

裏症腹腫脇硬。千棗湯。澤瀉湯。澤瀉牡蠣湯。瀉水丸。三花神祐丸。澤川丸。布海丸。然症雖可下。又當權其輕重。若年

衰久病及虛者。黃米丸。初起只宜上下分消其濕。五苓散。用桂枝。合六一散。加橘皮。木香。檳榔。生薑煎服。或單山苑

丸。木香白朮煎湯下。兼陰水身涼大便利。補中行濕。或升

黃耆。茵陳。五苓散。參之。

提經曰。陰蓄於內。水氣脹滿。是也。○治宜補脾土以復運

此補中行濕。魚全。虛而有濕熱者。最宜。若中寒者。溫補則

氣煖而小便自通。氣陷者。升提則陽舉而陰自降。故曰行

濕非五苓神祐之謂也。○補中氣。六君子湯加木香。瀉者

參苓白朮散。升陽除濕。防風湯。嘔者。赤茯苓湯。中寒者。玄

武湯。實脾散。校食積者。噤皮丸。千金養脾丸。按濕熱者。中

滿分消湯。九濕甚者。退黃丸。○虛甚氣陷。口魚味者。六君

子湯加升麻。柴胡以提之。復元丹。切忌淡滲。○腎虛腰重

脚腫。濕熱者。加味八味丸。滋腎丸。陽虛小便不利者。古沉

陰多久病或產後

服久病喘咳瘡痢。或誤

水附湯。復元丹。症也。俱宜補脾為主。大槩快喘者。分氣紫蘇飲。五皮散。寧

蘇丸。久痢加味八味丸。久瘧退黃丸。○產後腫必大補氣

血。使水自降。八物湯加蒼朮。陳皮半。夏香附。有熱加麥門

冬。黃芩。氣不順。加水香砂仁。懷胎氣渴。水道腫者。去半夏

加紫蘇。大腹皮。飲食魚阻。阻。蜜食毒與瘡癰。食積。香平丸

着。雖不藥而既產自消矣。阻。蜜食毒與瘡癰。食積。香平丸

小雞丸。飲毒水而腫者。名水毒。泰雄丸。不飲水。土乾。瘡洗浴。水氣入腹者。赤小豆湯。瘡久倦怠。嗜卧腫者。五苓散。加橘皮。木香。檳榔。滑石。甘草。枳壳。大腹皮。破七。姜煎服。風腫走注皮麻木。惟腸。水陰水腫外。又有風腫。氣腫。血腫。痛風腫者。腫面多風熱。腫脚多風濕。關脉浮。烘弦者。風熱濕三氣。鬱而為腫。因脾土不足。木火太盛。胃中結。是風氣所以清氣不升。腹作脹。濁氣不降。大便閉。經司中滿。所以之內者。是也。外症走注疼痛。面皮。麻木不仁。先服三和散。次服小續命湯。大便閉。去附子。加檳榔。牽牛。日久者。金用。風從汗散故也。虛弱不敢汗者。四君子湯。加升麻。柴胡。蒼朮。防風。汗多者。防已黃芪湯。氣腫隨氣消長之。七情停滯。鬱為濕熱。腹脇膨脹。與水氣相似。但以手按之。成凹。不即起者。濕也。按之皮厚。不成凹者。氣也。六君子湯。加水香。木通。喘者。木香。流氣飲。大便閉者。三和散。六磨湯。木香。檳榔丸。小便閉者。分心氣飲。嘔滿者。四炒枳壳丸。瀉者。車香附丸。按痰腹

張滿者。加味枳。痰血之腫如何識。皮間赤縷血痕兒。湯加

挑仁紅花。或續斷飲。加味八味丸。婦人經閉。敗。莖囊。又有

陰陽候。王莖腫脹健裂不休者。紫青瀉肝湯。濕熱下流者。

四苓散。加山梔。木通。金鈴子。莖囊腫大。通明者。木香。泥氣

肝湯。膀胱熱甚。囊腫二便不通者。三白散。八正散。腫痛者

陰寒。濕腫。痿弱者。五苓散。加茴香。或八味丸。腎大如斗者

按者。用馬鞭草。搗爛塗之。或乾地龍為末。鷄子。通治忌甘

與刺皮。凡陽水宜辛寒散結。行氣。苦寒。瀉火。燥濕。陰水宜

針刺。犯之。流水而死。○通用二陳湯。去甘草。加蒼朮。白朮

為君。佐以猪苓。澤瀉。山梔。消濕。熱。麥門冬。黃芩。為使。清肺

制肝。腹脹加香附。食積加山查。麥芽。陽水便閉加甘遂。少許。陰
氣壅加。水氣弱加人參。風腫加羌活。防風。白芷。夏月加香薷。寒加
姜桂。氣腫加羅蔔子。枳壳。血加歸芍。痰加貝母。上腫加紫
蘗。下腫加防己。木底。陰囊腫加小茴木香。外腎如石引脇
痛。加巴戟。又太陽腫症加藁本。赤小豆。少陽加羌花雄
黃。木通。陽明加茯苓。椒目。太陰加甘遂。葶藶。少陰加澤瀉
連翹。巴戟。厥陰加大戟。吳萸。此推廣占法。不可妄用。蓋甘
遂大戟。先花。損氣破血。巴豆損腎。陰氣。輕粉傷齒。毒留腸
胃。土狗劫奪。消而復腫。慎之。凡先腫腹而後散於四肢
者。可治。先腫四肢而後歸於腹者。難治。若肌肉崩潰。足脛
流水。唇黑耳焦。缺盆平。臍凸背平。手足掌平。肉硬。腹多青
筋。大便滑泄者。不治。又面黑者。肝死。兩手無紋者。心
死。臍凸者。脾死。兩肩凸者。肺死。平注。脚腫者。腎死。

鼓脹

與喘
參看

鼓脹虛軟實則堅

鼓脹中空外堅。有似於鼓。又曰。蠱者。若
虫侵蝕之。蠱。腹陰寒。為邪。吐利不食。