

痘疹正宗卷下

痘

疹

正

宗

卷

下

痘疹正宗下卷

疹症附錄

發熱論

痘曰毒必定是火一萌動而發即發熱故兆其先也
毒自內尋竅而出故其毛竅聳簇肌肉稠惕唇口濡
跳筋脉抽掣有似驚意旁觀者不知懷抱者自覺之
邪火干胃則嘔吐清氣爲邪所閉眼必昏沉氣必腥
穢此皆痘之象也唯風熱症宛似之但風熱作熱早
輕而晚重此則日夜一律也有謂中指獨冷者有謂

耳後紅筋輕而紫筋重者有謂耳後髑骨冷者皆不
准驗。不如合前象爲準。此因邪陽感觸時氣傳染自
然而萌動者。其象如斯。有兼內傷外感者。不在此例。
痘症多端。皆不離熱。痘雖未形。吉凶已可預卜。如熱
勢和潤。日重一日。身不燥而口不膩。寢食如常。容不
改色。三四日而始見點。一見點而熱漸退。日輕一日。
將來出痘必順。如壯熱煩渴。大便瀉而小水赤。不耐
衣衾。不時驚惕。目眊。嘔吐。越二日而不報點。出痘雖

險而猶順。至於熱如火熾。大渴不止。口熱如爐。鼻燥唇焦。目紅頰赤。大便閉而小便痛。或大便傾注而兼滯。小水短縮而如油。或身燔肢冷。或頭汗如蒸。靜燥不常。其痘必險。而險乃有熱盛難支。唇口焦裂。舌起芒刺。睫毛倒豎。鼻衄溺血。骨節煩痛。筋脉抽惕。足擲于揚。昏瞶直視。叫喊不已。天柱傾側。忽靜忽燥。兩目徬徨。其痘必險。而逆有一熱。卽見點於身。神情如常。飲食如故。次日熱亦不甚。三日漸重。面不見點。僅及

頷下將及四日。忽然大熱煩燥。諸惡象皆見。頭面細
碎平鋪。此謂倒出卽逆也。十無一生。至於面顏青慘。
哭聲不出。手足擦亂。搖頭鼓頷。此屬悶痘。斃不終朝
矣。故熱雖發。始之症而熱之輕重緩急。隱見不可不
知。輕者不治而自愈。重者乘時而急圖。隱者速於攻
發。見者急於涼解。審量旣真。乘痘未見毒火。雖烈氣
血未及受傷。此誠轉危就安之機。起死回生之會也。
使必待察形驗色而始治之。輕者猶可緩圖。重而急

者氣遇之而滯。血遇之而淤。氣血一傷。藥卽刀圭。無及矣。

內傷

出這有適值內傷者。口中噯酸氣。腹脹如鼓。胸膈與悶。以手按之。必手足自起。大便結燥。下轉酸臭。亦有吐瀉交加。不時長吁。此飲食停滯也。停滯則中氣不行。氣不行則血不通。氣血不動。何以領載而出也。痘之輕者。亦爲淹滯。况重者乎。傷之輕者。以神曲麥芽。

青皮山查消導之重必大黃枳實前胡青皮山查以推之宿食一消中宮自快氣血自行矣

外感風寒

肌表係痘之門戶。若有感冒。毛竅爲之閉塞。榮衛不和。則痘自爲之阻滯而不得暢達矣。若感風寒。則面顏慘淡。鼻流清涕。翁翁發熱。淅淅惡寒。以蜜炒黑麻黃少許。或撫芎。或羌活。荆防先。疏散之。表邪一清。榮衛自和。痘必暢快矣。

風熱

感風熱則面赤聲重涕唾稠粘氣粗鼻塞而氣熱太陽筋惕身有微汗以前胡葛根荊防先清徹之使表無阻滯再用應服之藥痘自發皇矣。

驚恐

若受驚則面有青氣却不惡寒手足競跳而不拘縮卒然叫啼而若有所見神情恍惚如人捕捉有頭汗如淋者有土竄反張者緊抱猶可稍動卽驚以歸宗

湯加羌活、鈞藤、薄荷，以利其關節而疏通之，使氣血得以振作，而痘自旁達矣。

升發權宜

升者，提清氣以上達也。發者，開百竅以四播也。世人但知以提爲升，以疏爲發。若果虛寒，升之而自起，真有客邪散之而自透。若毒火太盛，氣血皆爲阻滯，而不得伸其領，載之權故淹滯不起也。毒火阻滯氣血，是氣血之中皆毒。火用事一見升提，引毒火而愈熾。

毒火熾而氣血愈受制矣。是欲助之而適以害之也。
痘既賴氣血以始終其功。則以調和氣血爲至。亟其
寡清其火。卽所爲調和也。存心此道者。當隨症權宜。
不執成見。何痘宜升。何痘宜發。何痘宜疏表。何痘宜
達裡。何痘宜清徹。何痘以不升爲升。何痘以不發爲
發。總令氣血得以直達。不爲毒鏹。不爲火蝕。不爲邪
鬱。不爲穢閉。不使窒礙。不令消沮。得以伸其領載之
權。而成其尊附之功。庶乎其得之矣。

放點三日症治

痘之形成於氣色根乎血。如氣能領毒痘雖密而能
定其位。不細碎攢簇顆粒勻朗。眼周淨頂得綻矣。
裏得蒼老。此氣得其正也。血能載毒痘雖密而能安
其位。盤暈鬆和歸附饒厚。雖紅不乾不嬌不白淡黃
其色。此血得其正也。不然氣血反受毒火所制可知
矣。氣血既受制。自當攻其毒火。以維氣血。痘先天之
所秉受。一定之毒也。但於出痘之始。唯慮毒火有以

害氣血故卽思所以維護之或透毒或清火涼血或
破氣破淤或疏裏達表熱太盛者卽用寒涼以撲滅
之而升發之味毫不與焉務使氣血不爲逼於氣血
得其和而痘出自快及出齊亦可變逆爲險變險爲
順矣大抵放點先見於頭面隨出隨長者皆順症也
亦有先見點於面平板點紅累日不鬆再見者多出
於身面出不快者却多逆症痘出千態萬狀症治之
法究不出形色症狀之外與夫後成色論之中潛心

玩之神而明之無遺蘊矣。

四日至六日症治

痘至四日出齊熱卽退亦有不退者清之立止否則亦務使之熱退而神爽然熱旣退則寒涼之味當撤何也火燄一殺當重活其血兼之行氣若寒涼太重恐血凝而不能卽透故暫去之待其血勻伏火透而身復熱然後又用之亦有身熱稍退血色艷紅或紫艷不終朝而身復熱者此血熱極而火之發揚者也

卽當重用寒涼。防變焦紫。以成外剝。又不可以此例
執之也。或曰。氣行而血後隨。何以不急於氣。而急於
血耶。蓋氣輕清者也。踴透之而卽起。血重濁而有迹
象者也。必調和以變化其體。以待其自透。非二三日
之功不可。根暈一活。邪靡自脹。未有血不活而痘能
脹者也。亦未有血旣活而痘不綻者也。故治痘之法。
以活血爲要。使不權其營務之急。見痘不脹。唯以蟬
蛻。蜂房。紫草茸。以發之。或用升麻。川芎。以提之。未有

不衝水泡者。故痘於四日後。先觀其血色透與未透。先自口旁漸及兩頤。淡紅而未榮者。紅花以活之。深而老者。紫草以行之。乾紫與白者。多加大黃。紫草點白者。更加歸尾。桃仁以破之。嫩紅而油光者。更加青皮。氣血兼破之。務使五日自上而下。血透過面。何以爲透。根有盤暈而活潑也。六白血勻。周身盤暈鬆活。正面放點。通身起脹。或有板者。多加青皮以透其氣。身又漸熱。四日以前之熱。痘出之熱也。此以後之熱。

以毒在血中。血透毒。卽透毒透而火亦透矣。此痘候之大概也。如不應期。審其在氣在血而急追之。務使其應候。乃爲到家。治法亦詳於形色症。加減之例。此不多贅。

七日至九日症治

痘至七日。血無不活。卽當去行血之藥。身漸熱而色漸紅。是火燄將發矣。卽量加涼血之藥。以預制其燄。恐血被煎熬膠滯而不能化漿也。若至七日。色淡而身不熱。形微板而淹滯不甚。鬆是爲詐虛。治法見痘症中。若