

S2651-7

883

婦人方

補益月水不通
月水不調

赤白帶下
崩中漏下

千金方衍義五



孫真人千金方衍義卷四

長洲張璐

路玉著

南沙席世臣到客校

婦人方下 凡四類

補益第十八 論一首 方十四首

論曰凡婦人欲求美色肥白罕比年至七十與少不殊者勿服紫石英令人色黑當服鍾乳澤蘭丸也

柏子仁圓 治婦人五勞七傷羸冷瘦削面無顏

色飲食減少貌失光澤及產後斷緒無子能久服令人肥白補益方



柏子仁

黃蓍

乾薑

鍾乳

白石英

紫石英
各兩

蜀椒

一兩半

杜仲

當歸

甘州

芎藭

各四十
二銖

厚朴

桂心

桔梗

赤石脂

菴蓉

五味子

白朮

細辛

獨活

人參

石斛

白芷

芍藥

各一兩

澤蘭

二兩
六銖

藁本

蕪黃

各十
八銖

乾地黄

烏頭

一方作
牛膝

防風

各三
十銖



右三十味爲末蜜和酒服二十九如梧子不知加

至三十丸

千金翼無烏頭有龍骨防葵茯苓秦芫各半兩并治產後半身枯悴

衍義

千金立方之義專以方下所主之證爲主此方主

治總以羸冷二字爲之綱旨故用鍾乳紫白

赤石脂爲峻溫藏氣之專藥較大五石澤蘭丸中

所用石藥祇少禹糧石膏較小五石澤蘭丸祇少

陽起石石膏蓋禹餘糧主腹中雷鳴陽起石專主

冷勞虛損小五石中以有礬石大五石中以有龍

骨故用石膏以清解二藥之瀉滯此方專主羸冷

羸之與勞輕重懸殊旣無藉於斂瀉亦無庸於清

解其立方本意全在崩中經漏崩中經漏係衝脉
所主衝脉附肝而行原非脾腎之病故無藉黃耆
陽起石也石性重著故須薑棗辛烏等雄悍以發
之然用溫補必兼辛散而厚朴爲疏通裏氣之藥
藥如局方消風散旣用人參助風之勢又以厚朴
疎裏氣之壅不出此方之成則耳然用厚朴之義
有二一輔白朮健運中氣一統蕪荑清理濁帶以
婦人經行時風入胞門而患濁帶者多故用防風
藁本白芷獨活等風藥協力祛之所謂治病必求
其本也所以大小五石澤蘭丸大小澤蘭丸三石

澤蘭丸鍾乳澤蘭丸增損澤蘭丸澤蘭散諸方無

不用等味爲補中寓瀉之法諸方之下雖不言瀉

帶而崩淋漏下無不起於濁帶也且防風能助黃

耆白朮甘艸固密腠理兼有川芎杜仲地黃芍藥

菴蓉五味人參滋補氣血胡慮面顏之不光澤也

其用柏子仁桔梗石斛澤蘭者取其清潤以制諸

藥之燥烈而獨以柏子仁名方者以其能達心包

保護君主也其桔梗開提肺氣石斛專司清胃不

使熱藥之性上于肺胃也觀大小五石復以澤蘭

名方者爲其專於調經故總不出等味爲石藥之

監制耳 前云服紫石英令人色黑當服鍾乳
蘭丸以紫石英性專溫血血溫色必緇黑此方原
以鍾乳澤蘭益氣調經為主雖有紫石英不專溫
血故服之令人肥白也

大五石澤蘭圓 治婦人風虛寒中腹內雷鳴緩

急風頭痛寒熱月經不調繞臍惻惻痛或心腹
痞堅害飲食手足冷多夢身體痺痛營衛不和
虛弱不能動及產後虛損並宜服方

鍾乳

禹餘糧

紫石英

甘艸

黃耆

各二兩半

石膏

白石英

蜀椒

乾薑
各二兩

澤瀉
二兩六銖

當歸

桂心

芍藥

厚朴

柏子仁

乾地黄

細辛

茯苓

五味子

龍骨
各一兩半

石斛

遠志

人參

續斷

白朮

防風

烏頭
各三銖

山茱萸

紫苑
各一兩

白芷

藁本

蕪荑
各十銖

右三十二味爲末蜜丸梧子大酒服二十九加至



三十九 千金翼有陽起石二兩

小五石澤蘭圓 治婦人勞冷虛損飲食減少面

無光色腹中冷痛經候不調吸吸少氣無力補

益溫中方

鍾乳

紫石英

礬石 各一兩半

白石英

赤石脂

當歸

甘艸 各四十兩二銖

石膏

陽起石

乾薑 各一兩

澤蘭 二兩六銖

菰蓉

龍骨

桂心 各二兩半

白朮

芍藥

厚朴

人參



蜀椒

山茱萸 各三
十銖

柏子仁

藥本

各一
兩

蕪荑

十八
銖

右二十三味為末蜜和丸如梧子大酒服二

加至三十九日三

衍義

大五石澤蘭圓專主風虛寒中以寒積子藏繞臍

惻惻痛非諸辛燥石藥不能溫之風入胞門而腹

內雷鳴非防芷等風藥不能透之與柏子仁丸之

大端不殊丹方一味白芷為都梁九總取祛風之

義此方即於柏子仁丸中除去石脂諸味配入禹

餘糧等以實脾收津為務非若柏子仁丸杜風固



經之北按赤脂禹糧仲景治下焦利不止並用
湯專於固脫攷之本經赤石脂主女子崩中漏下
禹餘糧治欬逆寒熱大五石方下原有寒熱等證
用禹餘糧最為合宜小五石方下全無風證故去
烏頭細辛防風芎芷等藥但加陽起礬石石脂等
味專行固脫扶陽故所加之味尤為必需上方
皆鍾乳與木並用專取相對激其成功拘於繩墨
者不可與言至巧也

增損澤蘭圓

治產後百病理血氣補虛勞方

澤蘭

甘艸

當歸

芎藭 各四十
二銖

附子

乾薑

白朮

白芷

桂心

細辛

各二
兩

防風

人參

牛膝

各三
銖

柏子仁

乾地黃

石斛

各三十
銖

厚朴

藁本

蕪荑

各半
兩

麥門冬 一兩

右二十味為末蜜丸如梧子大空心酒下十五丸

至二十九

義

增損者增附子門冬牛膝損諸石龍骨等鎮固重

劑也方下所主本經原無藉於等味產後厥陰用



事風藥良不可缺但不必烏頭之峻攻而易附
溫經爲當用門冬者卽金匱溫經湯之成法
以清理惡露爲主一切固瀉咸爲切禁故用
之類潤下佐澤蘭爲引導也

大補益當歸圓 治產後虛羸不足胸中少氣股
中拘急疼痛或引腰背痛或所下過多血不止
虛極乏氣晝夜不得眠及崩中面目脫色唇乾
口燥亦治男子傷絕或從高墮下內有所傷藏
虛吐血及金瘡傷犯皮肉方

當歸

芎藭

續斷



乾薑

阿膠

附子

白朮

吳茱萸

芍藥

各二兩

白芷

各三兩

桂心

乾地黃

十兩

右十三味爲末蜜和丸如梧子大酒服二十九日

二夜一不知加至五十九丸若有真蒲黃加一升絕

妙

白芷圓

治產後所下過多及崩中傷損虛竭少

氣面目脫色腹中痛方

白芷

五兩

乾地黃

四兩

續斷



乾薑

當歸

阿膠

各二兩

附子 一兩

右七味爲末蜜丸如梧子大酒服二十九日四服無當歸芍藥代入蒲黃一兩炒無續斷大薊根代

衍義

大補益當歸圓與前三卷中大補中當歸湯相類專主產後崩中不止卽於增損澤蘭圓中又行增損損去澤蘭柏仁人參冬斛辛防胡藁牛膝蕪荑加入阿膠茺莢芍藥續斷專力溫經經得溫則流行無治正得補而行止有常縱有墮墜損傷交可



中國醫藥大學圖書館藏

藉以溫散可無積滯之虞矣至白芷圓主治相類而損之又損并去地黃芩桂甘朮芍藥僅存七味藥愈損而功愈增百練精金其斯之謂歟

紫石英柏子仁圓 治女子遇冬天時行溫風子

紫石英

柏子仁

各三兩

烏頭

桂心

當歸

山茱萸

澤瀉

芎藭

石斛

遠志

寄生

菴蓉

乾薑

甘艸 各二兩

蜀椒

杜衡 一作杜仲

玄胡 各一兩

細辛 一兩半

右十八味蜜和丸如梧子酒服二十九漸加至

十九日三服 一方用杜蠟一兩

〔衍義〕

檢先哲方如參尊宿公案非心心相印何以體此

此方治女子遇冬天時行溫風至春夏病熱頭痛

熱毒風虛等證而所用諸藥渾是溫養血氣之味

天冬時溫風久伏至春夏而發溫熱頭痛豈辛溫

助火重著補虛之品所可治乎逆推病情惟熱毒

風虛四字為致病之大綱惟其虛故風得久藏而

