

冷一盧醫案

下四車



南京中醫大學  
南京中醫藥大學圖書館版權所有

冷廬醫話卷三

桐鄉 陸以湉 定圃氏著

形體



鼻之下口之上爲水溝穴名爲人中其說有二一謂自此而上目耳鼻皆雙竅自此而下口及二竅皆單竅上三畫陰下三畫陽合成泰卦也一則謂天氣運於鼻地氣通於口天食人以五氣鼻受之地食人以五味口受之穴居其中故名之曰人中見程雲來醫暇卮言膀胱或謂有上口無下口或謂有下口無上口張景岳李士材亦主此說人皆信之而不知其非也若無上下



南京中医药大学图书馆版权所有

口何以有交腸之病乎吳縣沈實夫果之獨謂上下皆有口而上口常閉水之入於膀胱仍是三焦化入而非從上口以入若腑氣大虛則力乏而竅不能閉或邪熱傷腑則主開泄而竅亦不能閉甚至有交腸之病難從小腸下口入膀胱上口並隨小便而出譬如人身之外竊臍孔與兩耳兩乳亦常閉而不開有故則或出膾血或通乳汁膀胱之上口亦可以類推矣此論最爲近似余按唐與正治吳巡按病不得溲臥則微通立則不能涓滴詢知常服黑錫丹因悟結砂時鉛不死硫黃飛去鉛沙入膀胱臥則偏重猶可溲立則正塞水道以故不

能通令取金液丹三百粒分爲十服煎瞿麥湯下之膀胱得硫黃積鉛成灰從水道下猶累累如細砂病遂愈觀此益可證膀胱之有上下口也

### 中風

中風最宜辨閉脫二症閉症口噤目張兩手握固痰氣壅塞語言蹇澀宜用開竅通絡清火豁痰之劑如稀涎散至寶丹之類脫症口張目合手撒遺尿身僵神昏宜用大補之劑如參附湯地黃飲子之類然閉症亦有目合遺尿身僵神昏者惟當察其口噤手拳面赤氣粗脈大以爲別脫症亦有痰鳴不語者惟當辨其脈虛大以



爲別。至於閉症氣塞亦有六脈俱絕者。不得以其無脈而遂謂是脫症也。

傷寒

徐靈胎傷寒類方白頭翁湯注云：凡下重者皆屬於熱。按金匱要略云：小腸有寒者，其人下重便血，是則下不專屬於熱矣。特熱症較多，當察脈症治之，不可執一陽明主闔，故其病爲胃家實太陰主開，故其病爲自利。胃家實者，是胃液燥竭也，故必渴藥用梔豉白虎、人參竹葉石膏等以存津爲主。自利者，是脾臟寒濕也，故不渴藥用理中四逆等溫中爲主。

傷寒論桃花湯症或以爲寒或以爲熱或以爲寒熱不  
調或以爲先熱後寒持論不一獨沈棣懷醫學三書論  
至爲詳確備錄之陽病下利便膿血協熱也陰病下利  
便膿血下焦不約而裏熱也與桃花湯固下散寒成氏  
此注深合仲景之旨蓋少陰傳經熱病病於少陰之經  
實結於胃少陰直中之寒症病在本藏下焦虛寒矢閉  
藏之職故用溫補以散裏寒而固腸胃準繩反以成氏  
釋裏寒爲非豈不思熱而用固腸收滯之劑則熱何由  
去耶吳緩謂此症三陽傳來純是熱病赤石脂性寒假  
乾薑以從治之彼蓋見血爲熱不知有形之血必賴無



形之氣以固之下焦虛寒不能固血非溫補不能助陽。以攝陰何必陽病熱而始便膿血哉。赤石脂性溫丹溪東垣皆云然吳緩何據而謂其寒喻昌頗知仲景救陽之意而於此條亦以爲熱症乃云滑脫卽不可用寒藥何以仲景於自下利者多用黃芩黃連耶白頭翁又何爲耶其注支離矛盾學者當細詳之以沿按下利熱多利之法汪苓友傷寒辨症廣注言之最悉附錄於此少陰裏寒便膿血色必黯而不鮮乃腎受寒濕之邪水穀之津液爲其凝泣醞醕於腸胃之中而爲膿血非若火性急速而色鮮明蓋冰伏已久其色黯黑其氣必臭其脈必微細但神氣靜而腹痛乃止

陰證陽證

病症陰陽疑似最難辨別卽如厥有陰陽二症李士林

謂陰厥脈沈弱指甲青而冷陽厥脈沈滑指甲紅而溫

以此爲辨蒲城王竹坪先生

夢祖傷寒撮要採之以爲

此說最精留心體驗之百不一失然觀續名醫類案疫

門載施幼升六月患時疫口燥舌乾苔刺如鋒咽喉腫

痛心腹脹滿按之痛甚渴思冰水小便赤澁得涓滴則

痛甚此當急下之症也惟通身肌表如冰指甲青黑六

脈如絲尋之則有按之則無醫者引陶氏全生集以爲

陽症但手足厥逆若冷過肘膝便是陰症況通身微冷

平又陶氏謂陰陽二症全在脈之有力無力中分今已

COLLEGE OF CHINESE MEDICINE

南京中醫藥大學

1951

南京中医药大学图书馆版权所有

脈微欲絕按之如無比無力更甚遂進附子湯煩燥之極不渝時竟殞觀此知陰症似陽又未可以脈沈弱指甲青冷爲憑余按成無已曰凡厥若始得之手足便厥而不溫者是陰經受邪陽氣不足可用四逆湯若手足自熱而至溫從四逆而至厥者傳經之邪也四逆散主之此說辨別至爲精審又凡六氣之感異於傷寒之傳經者惟舌較爲可憑陰症亦有黑胎焦黃胎然其胎必浮胖或滑潤而不枯此等處非細心體察鮮不致誤海上王協中敬義疫瘡湖源載吳門汪姓患疫症適當盛暑體厥四肢冷極脈虛醫用參附并四逆等藥遂至危殆及延余診見其咬碎脣舌周身赤斑成片形倦而口中  
語安不成語向脈參伍極亂已無下手處矣以此合魏

案覩之知陽症陰脈誤投  
溫熱必至殺人可不懼哉

右所述通身肌表如冷指甲青黑六脈如絲進附子湯而殞此陽症似陰誤作陰症治而死也亦有陰症似陽誤作陽症治而死者黃退庵症治指要云一婦小產後身作大熱舌黃脈大口乾大便多日不解醫者不辨其假而用白虎湯一服便通熱繼病家大悅余診之謂此乃格陽於上其方不可再服必當溫補問既係虛症何昨日服藥大便通熱勢解耶余曰此大便之結如寒月水澤腹堅其通者幾微元陽爲寒涼所逼而出其熱勢減者亦因寒涼灌濯暫爲退舍脈象浮大軟如絲絮急



南京中醫藥大學  
南京中医药大学图书馆版权所有

服八珍湯尙恐無及其家不信醫來復診見有應效仍用前方加麥冬五味子服後兩目直視循衣摸牀一晝夜而終悔無及矣余按凡寒在內而格陽於外寒在下而格陽於上此爲無根之火症見煩躁欲裸形或欲坐臥泥水中舌苔淡黃口燥齒浮面赤如微酣是爲戴陽或兩顧淺紅游移不定異實熱症之盡面通紅者葉天士謂戴陽之紅紅而嬌嫩帶白言語無力納少胸悶渴欲飲水或咽喉痛而索水至前復不能飲肌表雖大熱而重按則不熱或反覺冷或身熱反欲得衣且兩足必冷小便清白下利清穀亦有大便燥結者脈沈細或浮數按之欲散亦有浮大滿指而按之則必無

力是宣溫熱之劑如八味丸等藥須涼服從其類以求之也

## 暑

陸麗京醫林新論謂人之游於暑月而清明在躬者恃有元氣以勝之世俗夏月輒服香薷飲不知香薷性味辛溫走散真氣厚朴氣力辛猛摧陷元陽招暑引邪無過於此更有服六一散者不知甘草性雖和平而向有中滿喘脹及胸多積滯者亦不宜概用滑石利竅表虛者服之則衛氣不固遺滑者投之則精闢不守此又不可不審也孫真人以爲虛弱之人暑月當服生脈散又



南京中医大學  
南京中医药大学图书馆版权所有

云夏月常服五味子以補五臟之氣余則以爲尋常湯飲須用烏梅沙糖湯尋常水飲須用梅漿水此旣補元又能消暑況兼爽口者可以通行又見有夏月施茶茗者其性寒涼消尅暑月之人元氣已自摧殘而勞傷困憊正藉資扶乃更飲茶茗重虛其虛冷飲則腹痛泄瀉熱飲則散表出汗胃氣一虛不覺暑氣透入忽而長途昏倒痧悶叢來變生俄頃皆此地之爲而人未之知也此後有施湯飲者熱湯宜調入砂糖少許冷水宜調入梅漿少許如有梅漿亦可入砂糖少許收斂真氣大助元神旣飲之後兩目神明頓爽兩足精力湧出飢卽

暫飽渴亦生津此可驗也不則寧用白滾湯或白小丹  
溪云淡食能多補況太羹元酒以無味爲至味故當知  
其利益耳吾賴世之爲善人長者之行者其亟改而廣傳  
之余謂香薷飲決不可服六一散若於暑路遠涉之後  
胸痞惡食飲之以解暑氣往往獲驗特非常服之品沙  
糖梅堯誠遠勝於茶若然既受暑氣之後服之病必增  
劇以此施捨安得徧執途人而問之竊謂養生家之服  
食當效其法若欲施之行路轉不如白滾湯之有利無  
弊按章古雲飲食辨云暑月力作及注夏之人常飲糯  
米湯亦妙米代茶能保肺氣固衛陽此卻人人可用勝於



南京中医药大学图书馆版权所有

沙糖梅漿也

方書有云暑月中熱卒死薑湯童便乘熱皆可灌之切勿飲以冷水及令臥冷地卽至不救今按暑症忌薑嘗有中暑而患乾霍亂者飲薑湯一錢卽斃治中熱卒死古方蒜泥井水法最良吾里孔雅六學博采言嘗於酷暑中見一老嫗倒地口眼盡閉鼻無氣息急令人以蒜頭二顆研爛取路上熱土晒處淨土是新汲井水一椀調勻以箸啟其齒灌之五七匙後始受而作嘔灌盡大吐有聲息手足亦漸舒動至黃昏後方甦自云烈日中行十餘里心煩口燥啖麥餅量悶而絕不自知也投

以此方暑食俱得吐去而人乃蘇後屢治中暑者

### 暑風

表弟周克庵學正

上燬

熟精醫道光丙午夏暑風甚

劇時疫大作俱兼喉痛亡者接踵皆束手克庵家病

者甚眾親自療治獲痊憫世醫之寡識爲作論曰暑風

由口鼻而入時冷穢氣亦由口鼻而入先傷上焦手太

陰肺經其始兒症也或喉痛而腐或不腐酒洒惡寒蒸

蒸發熱有汗不解遍體現紅暈舌白膩首用辛涼平劑

連翹薄荷荆芥穗銀花淡豆豉牛蒡子苦桔梗杏仁元

參紫馬勃瓜蔓皮白茅根竹葉可隨症選用以表泄表



南京中醫藥大學  
南京中医药大学图书馆版权所有

風兼宣穢濁其繼也。但熱不寒喉痛仍在。痰涎稠膩口  
紅多眵。舌絳無苔。紅痾雜以白疹。煩渴。脅悶燥擾不安。  
寐則自語。醒則神清。狀類犀角地黃及白虎湯證。不知  
肺衛與心營甚近。此係肺熱侵逼包絡。未嘗竟入營分。  
以神不昏昧辨之。此時遽與犀角是開門揖盜也。或識  
蒙竊阻犀角並牛黃清心丸至寶丹亦不在禁例。至白  
虎證脈洪大。自汗不止。口渴無度。遵古法服之。誠無誤。  
倘用不合法。恐肺經之邪熱無出路。致下迫大腸而爲  
痢也。宜用川鬱金。黑山梔。瓜蔓皮。蘆根。竹葉。桑葉。池菊  
之類。以廓清熱邪。開泄穢氣。如毒重者。甘草人中黃大