

景岳全書卷之五十八宙集

古方八陣

會稽 張介賓 會卿著

會稽 魯 超 謙菴訂

# 熱陣

仲景理中丸一

即名人參理中湯○治太陰即病自利不渴陰

寒腹痛短氣欬嗽霍亂嘔吐飲食難化胸膈噎塞或瘧疾瘴  
氣癰疫中氣虛損久不能愈或中虛生痰等症

人參

白朮炒

乾薑炒

炙甘草

各三兩

右四味搗篩爲末蜜丸雞黃大以沸湯數合和一丸研碎溫服之日三四夜二服腹中未熱益至三四丸然不及湯湯法以四物依數切用水八升煮取三升去渣溫服一升日三服○原論加減法詳在霍亂門述古條中賓按右方兩數乃漢時權度今後世所用惟每味數錢而甘草半之酌宜可也

附子理中湯二 治證如前而中氣虛寒腹痛甚者又或入房

腹痛手足厥冷或食冷犯寒等症

卽前方加制附子一二三錢隨宜用之其有寒甚勢急者不妨生用或炮用亦可○外科附子理中湯有芍藥茯苓

無甘草乾薑

附子理中丸 三

治陰寒腎氣動者

即前附子理中湯去白朮煉蜜丸服

理中加丁香湯 四

治中脘停寒喜辛物人口即吐即噦

即前理中湯加丁香十粒甚或兼痛者可加至一二錢○

若以理中加木香即名木香理中湯

加味理中湯 五

治脾肺俱虛欬嗽不已

人參

白朮

茯苓

炙甘草

陳皮

半夏

乾薑

細辛

北五味 等分

右咀每服三錢薑三片棗一枚煎七分食遠服

局方胡椒理中湯六

治肺胃虛寒氣不宣通欬喘逆氣虛痞噎

悶脇腹滿痛短氣不能飲食嘔吐痰水不止

白朮 五兩

乾薑

炙甘草

胡椒

良薑

葶撥

陳皮

細辛

欬冬花

去梗各四兩

右咬咀每服五七錢水一鍾半煎七分食遠溫服○或煉蜜

丸桐子大每服三五十丸白湯溫酒米飲任下無時每日二

服

選方 八味理中丸 七

治脾胃虛寒飲食不化胸膈痞悶或嘔吐

泄瀉

人參

乾薑

炒各一兩

白朮

四兩炒

白茯苓

麥芽

炒二兩

甘草

炙

神麴

炒

砂仁

炒各一兩半

右為細末煉蜜為丸每丸重一錢空心服一九薑湯嚼下

枳實理中丸 八

治傷寒寒實結胸

人參

白朮

茯苓

甘草

乾薑

各二兩

枳實

十六片

全書卷五十八

古方

熱陣

三

右為細末煉蜜丸雞子黃大每服一九熱湯化下連進二三服

理中化痰丸九 治脾胃虛寒痰涎內停嘔吐少食或大便不

實飲食難化欬唾痰涎此中氣虛弱不能統涎歸源也

人參

白朮炒

乾薑炮

茯苓各二兩

炙甘草一兩 半夏制三兩

薑湯煮麪糊丸桐子大每服四五十九白湯送下

治中湯十 治脾胃不和嘔逆霍亂中滿虛痞或泄瀉○此即

理中湯加青皮陳皮也

人參

白朮

乾薑炮

炙甘草

青皮

陳皮等分

右每服五錢水煎服如嘔加半夏

丁香温中湯十一

治同前

即前治中湯加丁香去半夏

長方温胃湯十二

治憂思結聚脾肺氣凝元陽受損大腸與胃

氣不平脹滿上衝飲食不下脉虛而緊滿

附子制

厚朴

當歸

白芍藥

人參

甘草炙

陳皮

各一錢

乾薑

炮一錢

川椒 去合口炒出汗三分

水一鍾半薑三片煎一鍾食遠服

東垣溫胃湯 十三

治服寒藥多致脾胃虛弱胃脘痛

白豆蔻

人參

澤瀉 各三分

益智

砂仁

厚朴

甘草

乾薑

薑黃 各四分

黃芪

陳皮 各七分

右為細末每服三錢水一盞煎至半盞食前溫服

仲景四逆湯 十四

又名通脈四逆湯 ○治傷寒陰症自利裏寒

外熱脈沈身痛而厥



甘草 炙二兩  
乾薑 炮三兩  
附子 一枚破八片生用

右咬咀以水三升煮取一升二合分二次溫服其脈即出者  
愈○面色赤者加葱九莖○腹中痛者去葱加芍藥二兩○  
嘔者加生薑二兩○咽痛者加桔梗一兩○利止脈不出者  
加人參一兩

仲景 四逆加入人參湯 十五  
治傷寒惡寒脈微而後利

即於前方內加入人參一兩

仲景 四逆加豬膽汁湯 十六  
治傷寒吐下後汗出而厥四肢拘

急脈微欲絕者

即於四逆湯內加入豬膽汁半合

仲景 茯苓四逆湯 十七

治傷寒汗下後病仍不解煩躁者

一茯苓 六兩

人參 一兩

甘草 炙二兩

乾薑 一兩半

附子 一枚庄用去皮切八片

右五味以水五升煮取三升去渣溫服七合日三服

茱萸四逆湯 十八

治厥陰中寒小腹痛甚

吳茱萸 湯泡

附子 炮

乾薑 各二錢

炙甘草 錢半

水一鍾半煎七分熱服

韓氏 茵陳四逆湯 十九

治發黃脉沈細遲肢體逆冷腰已上自

汗

茵陳 二兩

炙甘草 一兩

乾薑 炮兩半

附子 一個炮作八片

右分四貼水煎服

仲景當歸四逆湯 二十

治傷寒手足厥寒脉細欲絕者或下利

脉大腸鳴者虛也及其人內有久虛者宜當歸四逆加吳茱萸生薑湯主之

當歸

桂枝

芍藥

細辛 各三兩

甘草

通草 各二兩

大棗 二十五枚擘

右七味以水八升煮取三升去滓温服一升日三服

三書卷之八

熱痺

下

四逆散 二一

方在散陣二八

治陽邪亢熱血脈不通四肢厥逆

仲景附子湯 二二

治少陰病得之一二日口中和其背惡寒者

當灸之附子湯主之并治少陰病身體痛手足寒骨節痛脈

沉者

附子 二枚去皮 破八片

人參 二兩

白朮 四兩

芍藥

茯苓 各三兩

右五味以水八升煮取三升去渣溫服一升日三服

三因附子湯 二三

治風寒濕痺骨節疼痛皮膚不仁肌肉重著

四肢緩縱

附子 生

白芍藥

桂心

甘草

白茯苓

人參

乾薑 各三兩

白朮 一兩

右咬咀每服四錢水煎服

生附湯 二四

治寒濕腰痛

附子 生用

白朮

茯苓

牛膝

厚朴

乾薑

炙甘草 各一錢

蒼朮

杜仲 薑炒各二錢

水二鍾生薑三片紅棗二枚煎八分食前服

參附湯 二五

方在補陣三八

治元陽不足喘急呃逆嘔惡厥冷等證

仲景 朮附湯 二六

方在補陣四二

治中寒中氣不足逆冷痰盛口噤等證

芪附湯 二七

方在補陣四四

治氣虛陽弱虛汗倦怠

濟生 朮附湯 二八

方在補陣四三

治寒濕腰冷重痛小便自利

金匱 桂枝附子湯 二九

治傷寒八九日風濕相搏身體疼煩不

能轉側不嘔不渴脉浮虛而澁者

桂枝

四兩去皮

生薑

三兩切

附子

三枚炮去皮各破八片

甘草

三兩炙

大棗

十二枚擘

右五味以水六升煮取二升去渣分温三服

金匱

白朮附子湯

三十

治傷寒八九日風濕相搏身體疼煩不

能轉側不嘔不渴脉虛浮而澁若大便堅小便自利者去桂

枝此方主之

白朮

二兩

附子

一枚泡去皮

甘草

炙一兩

生薑

一兩半切

大棗

六枚

右五味以水三升煮取一升去滓分溫三服一服覺身痺半日許再服三服都盡其人如冒狀勿怪卽是朮附並走皮中逐水氣未得除故耳

金匱甘草附子湯 三一

治風濕相搏骨節疼煩掣痛不得屈伸

近之則痛劇汗出短氣小便不利大便反快惡風不欲去衣或身微腫者此主之

甘草 炙

白朮

各二兩

附子

二枚炮去皮

桂枝

四兩去皮

右四味以水六升煮取三升去渣溫服一升日三服初服得

微汗則解能食汗後復煩者服五合恐一升多者服六七合



為妙

良方薑附湯 三二

治霍亂轉筋手足厥冷或吐逆身冷脉微急

用此藥救之

此即仲景乾薑附子湯

乾薑 一兩

附子 一個生用

右每服半兩水煎

外科薑附湯有人參白朮

生薑附子湯 三三

治嶺南瘴厲內虛發熱或寒熱往來嘔痰

吐逆頭疼身痛或汗多煩躁引飲或自利小便赤兼主卒中

風

附子 一枚如法製分四服

熱陣